



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2562



สรุปรายงานการป่วย พ.ศ. 2562

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชัยพร	สุชาติสุนทร	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายแพทย์ธเนศ	ดุสิตสุนทรกุล	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
นายแพทย์นเรศ	มณีเทศ	รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะผู้จัดทำ

นางเดือนเพ็ญ	โยเฮือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางเบญญาภา	ศิริรัตน์	เจ้าพนักงานเวชสถิติอาวุโส
นางสาวกคพร	สังข์ทอง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นางสาวศรสวรรค์	คงเจริญ	นักวิชาการสถิติ
นางสาวจิราภรณ์	สุ่มดีบ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนาธิปกรณ	เพียรทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายบัณฑิต	นวนเนตร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย



กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2590 1497

โทรสาร 0 2591 8565

คำนำ

สรุปรายงานการป่วย ปี พ.ศ. 2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้วิเคราะห์ข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชน ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลรายบุคคลจากฐานข้อมูลหลายแหล่ง ประกอบด้วย ฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จากคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) ซึ่งรับข้อมูลจากหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ) นำเสนอข้อมูลสุขภาพ เกี่ยวกับความชุก (Prevalence) ของการมารับบริการจำนวนและอัตราตามสาเหตุการป่วยรายกลุ่มโรค จำนวนและอัตราตามสาเหตุภายนอก โดยอภิปรายผลในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด จำแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอขอบคุณข้อมูลสุขภาพที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง ที่บันทึกและรายงานผลการให้บริการด้วยความครบถ้วน สมบูรณ์ ดังแสดงในสรุปรายงานการป่วยฉบับนี้ หากการวิเคราะห์ และอภิปรายข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใด กองยุทธศาสตร์และแผนงานต้องขออภัย มา ณ โอกาสนี้ และยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้เอกสารมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กันยายน 2563

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทนำ..... 1

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

 สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยนอก..... 7

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน

 สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน..... 16

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน รายเขตสุขภาพ 20

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 28

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน เด็กกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี 30

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 5 - 14 ปี..... 31

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 24 ปี..... 32

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 59 ปี..... 34

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป..... 35

 - ภาพรวมของสถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก 37

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด - 14 ปี 40

 - สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป..... 41

 - สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล..... 43

 - จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน..... 45

 - จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล 46

 - ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน..... 47

ส่วนที่ 2 รายงานเพิ่มเติม

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

 สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยนอก..... 227

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน	246
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน รายภาค	249
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน รายเขตสุขภาพ	252
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน รายจังหวัด	266
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มอายุ	269
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก	271
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน เด็กกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก	272
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 5 - 14 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก	274
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก	275
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 59 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก	277
- สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามการวินิจฉัยโรคหลัก	279

ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 ตารางสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (ผู้ป่วยนอก)	282
- ภาคผนวก 2 ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค	285
- ภาคผนวก 3 ตารางสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ 35 กลุ่มสาเหตุ	307

สารบัญตาราง

หน้า

[illegible]

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 16	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2562	25
ตารางที่ 17	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ. 2562	25
ตารางที่ 18	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 13 ปี พ.ศ. 2562	26
ตารางที่ 19	อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 – 2561.....	27
ตารางที่ 20	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	28
ตารางที่ 21	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562.....	30
ตารางที่ 22	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562.....	31
ตารางที่ 23	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	32
ตารางที่ 24	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	34
ตารางที่ 25	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562.....	35
ตารางที่ 26	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก 10 อันดับแรก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	38
ตารางที่ 27	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุแรกเกิด - 14 ปี จากสาเหตุภายนอก ปี พ.ศ. 2562	40
ตารางที่ 28	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	41
ตารางที่ 29	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	42

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 30	จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562.....	45
ตารางที่ 31	จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562	46
ตารางที่ 32	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562.....	47
ตารางที่ 33	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายการ กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562.....	49
ตารางที่ 34	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายการ กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562	102
ตารางที่ 35	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค).....	155
ตารางที่ 36	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค)	187
ตารางที่ 37	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายการ กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ (ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562.....	219

สารบัญตาราง
(ส่วนที่ 2 รายงานเพิ่มเติม)

หน้า

[illegible]

(ส่วนที่ 2 รายงานเพิ่มเติม)

หน้า

[illegible]

สารบัญตาราง (ต่อ)
(ส่วนที่ 2 รายงานเพิ่มเติม)

หน้า

ตารางที่ 29	10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 13.....	265
ตารางที่ 30	จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกรายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562	266
ตารางที่ 31	10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	271
ตารางที่ 32	10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	272
ตารางที่ 33	10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	274
ตารางที่ 34	10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	275
ตารางที่ 35	10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	277
ตารางที่ 36	10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	279

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1	อัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน ปี พ.ศ. 2558 – 2562	7
ภาพที่ 2	อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	16
ภาพที่ 3	อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562	16
ภาพที่ 4	อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2558 – 2562	17
ภาพที่ 5	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี พ.ศ. 2562	17
ภาพที่ 6	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ปี พ.ศ. 2558 – 2562	28
ภาพที่ 7	อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2558 – 2562	37
ภาพที่ 8	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก รายภาค และกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562	38
ภาพที่ 9	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี พ.ศ. 2562	39
ภาพที่ 10	สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2562	43

สารบัญภาพ (ส่วนที่ 2 รายงานเพิ่มเติม)

หน้า

ภาพที่ 1	อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ. 2558 – 2562	227
ภาพที่ 2	อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาค	228
ภาพที่ 3	อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562	228
ภาพที่ 4	10 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน สูงและต่ำที่สุด ปี พ.ศ.2562	241
ภาพที่ 5	อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี พ.ศ. 2562	245
ภาพที่ 6	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562.....	246
ภาพที่ 7	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ภาพรวมทั้งประเทศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และจำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562	249
ภาพที่ 8	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) เพศชาย จำแนกรายภาค กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562.....	249
ภาพที่ 9	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) เพศหญิง จำแนกรายภาค กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562.....	250
ภาพที่ 10	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562....	252
ภาพที่ 11	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2562.....	269
ภาพที่ 12	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามกลุ่มอายุ เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 – 2562.....	269
ภาพที่ 13	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2558 – 2562.....	270
ภาพที่ 14	อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ปี พ.ศ. 2558 - 2562	280

บทนำ

ความเป็นมา

รายงานการป่วย เป็นรายงานที่แสดงความชุกของโรคต่าง ๆ ตามที่มีผู้มารับบริการรักษาพยาบาล ในหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับ ในอดีตได้รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก (รง.504) ตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) แบบรายงานผู้ป่วยในรายโรค (รง.505) ตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค) ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เมื่อมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลเพื่อใช้ทดแทนระบบระเบียบรายงานแบบเดิม รายงานการป่วยจึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลเพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแทนระบบ ระเบียบรายงานเดิมเช่นเดียวกัน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก ยังคงใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล ที่ปรับตามรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน และในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา จะใช้ ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)

ในส่วน of ข้อมูลการป่วยผู้ป่วยใน รวบรวมข้อมูลการป่วยจากระบบประกันสุขภาพ ประกอบด้วยระบบ ฐานข้อมูลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และระบบฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักสารสนเทศ บริการสุขภาพ)

รายงานการป่วยฉบับนี้ นำเสนอข้อมูลรายงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 รายงานการป่วยที่นำเสนอตามประเภทของผู้ป่วย ประกอบด้วย

1) ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลตามรูปแบบ โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) โดยนำเสนอสถานการณ์ และอัตราผู้ป่วยนอก ตามกลุ่มสาเหตุการป่วยเปรียบเทียบข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยภาพรวมประเทศ และรายภาค โดยจัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตามลำดับโรคที่พบมากที่สุดตามลำดับ

2) ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายบุคคลของระบบประกันสุขภาพ นำเสนอสถานการณ์และข้อมูลการป่วย (อัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน) จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

2.1) จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน รวมทุกการวินิจฉัยโรค (นับทุกการวินิจฉัยโรค ในการมา รับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง) นำเสนอสถานการณ์การป่วยในภาพรวมประเทศ และรายภาค จัดเรียงและวิเคราะห์ ข้อมูลเปรียบเทียบตามลำดับโรคที่พบมากที่สุด โดยจำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ และสาเหตุการป่วย (298 โรค/กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10)

2.2) จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก (นับการวินิจฉัยโรคหลักเพียง 1 โรค ในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง) โดยนำเสนอสถานการณ์การป่วยในภาพรวมประเทศ และรายภาค จัดเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตามลำดับโรคที่พบมากที่สุด โดยจำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ และสาเหตุการป่วย (298 โรค/ กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10)

2.3) จำนวนและอัตราผู้ป่วยใน จากสาเหตุภายนอก (นับการวินิจฉัยโรคจากสาเหตุภายนอกเพียง 1 สาเหตุ ในการมารับบริการรักษาพยาบาล 1 ครั้ง) นำเสนอจำนวนและอัตราผู้ป่วยใน ภาพรวมประเทศ และรายภาค โดยจำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ และกลุ่มสาเหตุภายนอก (35 กลุ่มสาเหตุ) จัดเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบตาม อันดับสาเหตุที่พบ

ส่วนที่ 2 รายงานการป่วยที่นำเสนอข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลวันนอนเฉลี่ยของการมารับบริการต่อปี สัดส่วนการนอนโรงพยาบาล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ๆ ทั้งนี้ รายงานการป่วย ปี พ.ศ. 2562 คณะทำงานได้เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลการป่วย ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยจำแนกเป็นรายเขตสุขภาพนำเสนอเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มการนำเสนอข้อมูลรายงานในปัจจุบันเป็นรายจังหวัด ทั้งในรูปแบบตารางวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ Info Graphic เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล

1. การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล ใช้ชุดข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) นำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามปีปฏิทิน เพื่อจัดทำรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรคสำคัญ โดยฐานข้อมูลดังกล่าว รวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก จากหน่วยบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งจัดส่งผ่าน Health Data Center ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน

ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล ปี พ.ศ. 2562 รวบรวมจากฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ผ่านสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ: สกส.) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และประมวลผลค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารกองทุนประกันสุขภาพต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ โดยรับข้อมูลผู้ป่วยใน ครบคลุมสถานบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการนั้น ๆ ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคล จะแสดงรายละเอียดข้อมูลรายบุคคลและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับบริการ ตามเงื่อนไขและระเบียบของกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ต่างกัน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอเฉพาะรายการข้อมูลสุขภาพ เพื่อการบริหารงานสาธารณสุขเท่านั้น

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

1) ตรวจสอบข้อมูลราย Record โดยตรวจสอบความครบถ้วนของรายการข้อมูลสำคัญ ๆ เช่น วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีที่มีารับบริการ ความถูกต้องของรหัสโรค ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของรหัสโรคกับเพศ อายุ ความถูกต้องของข้อมูลการให้รหัสโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น ไข้ทรพิษ กาฬโรค เป็นต้น

2) การให้รหัสสาเหตุภายนอก ซึ่งต้องใช้ร่วมกับรหัสการบาดเจ็บ

การประมวลผล

1. ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก ประมวลผลรายปี ปีปฏิทินละ 1 ครั้ง

1) จำนวน และอัตราผู้ป่วยนอก ต่อประชากร 1,000 คน ภาพรวมประเทศ จำแนกรายภาค เขตสุขภาพ และจังหวัด

- 2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามแบบรายงานผู้ป่วยนอก (21 กลุ่มโรค) หน่วยนับเป็น “รายโรค” โดยนับทุกการวินิจฉัยโรคที่ผู้ป่วยมารับบริการในครั้งนั้น

2. ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน ประมวลผลรายปี ปีปฏิทินละ 1 ครั้ง

- 1) จำนวน และอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ รายการเขตสุขภาพ จังหวัด และจำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ ของผู้ป่วย
- 2) สาเหตุการป่วย โรค/กลุ่มโรค จัดกลุ่มตามตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) ของบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10) นำเสนอเป็น 298 โรค/กลุ่มโรค แสดงหน่วยนับเป็น “ราย” สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคหลัก และหน่วยนับเป็น “รายโรค” สำหรับการนับโรคจากการวินิจฉัยโรคของการมารับบริการในครั้งนั้น
- 3) จำนวน และอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ภาพรวมประเทศ รายการเขตสุขภาพ จังหวัด และจำแนกตามเพศ และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ (35 กลุ่มสาเหตุ) หน่วยนับเป็น “ราย”

หมายเหตุ:

1. รายงานผู้ป่วยนอก ไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มาจัดอันดับโรค
 - อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99)
 - สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย (W00-W99, X00-X39, X50-X59, X70-X74, X91-X99, Y00-Y84, Y86-Y89)
2. รายงานผู้ป่วยใน ไม่นำกลุ่มโรคดังต่อไปนี้มาจัดอันดับโรค
 - การคลอดของครรภ์เดียว (O80)
 - อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการฯ (R00-R99)
 - กลุ่มบุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและการชันสูตร (Z00-Z99)
3. ใช้จากไวรัสที่นำโดยแมลง และใช้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90-A94, A96-A99) ในประเทศไทย หมายถึง โรคไข้เลือดออก
4. รหัสการวินิจฉัยโรค J09 ไม่นำมารวมในกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย ฉบับปี 2016 (ICD – 10 – TM) นับเฉพาะรหัส J10-J11
5. ปรับปรุงรหัสโรคเพิ่มเติม
 - 5.1 โรคติดเชื้อดงหวาร เพิ่มรหัสการวินิจฉัยโรค K64 ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย ฉบับปี 2016 (ICD – 10 – TM)
 - 5.2 โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง ใช้รหัสการวินิจฉัยโรค K52-K55, K58-K63, K65-K67 ไม่รวม K64

การคำนวณอัตราป่วย

ในการคำนวณอัตราป่วย นำจำนวนประชากรกลางปีปฏิทินของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาใช้ในการคำนวณอัตราผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ส่วนการคำนวณวันนอนเฉลี่ย จำนวนโรคเฉลี่ย และค่าใช้จ่ายเฉลี่ย จะใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

สูตรในการคำนวณมีดังนี้

Formula 01	อัตราผู้ป่วยนอก	= $\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกช่วงปีหนึ่ง} \times 1,000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$
Formula 02	อัตราผู้ป่วยใน	= $\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยในช่วงปีหนึ่ง} \times 100,000}{\text{ประชากรกลางปีในปีเดียวกัน}}$
Formula 03	จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล	= $\frac{\text{จำนวนวันที่ผู้ป่วยจำหน่ายทุกคนอยู่รักษาในโรงพยาบาล}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}}$
Formula 04	จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล	= $\frac{\text{จำนวนโรคที่ได้รับการวินิจฉัยในแต่ละครั้งที่มารับบริการของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}}$
Formula 05	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการนอนโรงพยาบาล	= $\frac{\text{ค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้งของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน}}$

คำจำกัดความ

จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล¹ (วันนอนเฉลี่ย) (average length of stay) หมายถึง จำนวนวันโดยเฉลี่ยต่อผู้ป่วยใน 1 คน ที่อยู่รักษาในโรงพยาบาล จนจำหน่ายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยจากจำนวนวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน ต่อจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

จำนวนวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายทุกคน¹ (discharge patient day) หมายถึง จำนวนวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายแต่ละคน (Length of stay) รวมกันในช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้ป่วยใน¹ (in - patient) หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล โดยแพทย์สั่งให้รับไว้เพื่ออยู่รักษาในสถานพยาบาล และลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งจะต้องผ่านการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยนอกมาแล้ว

จำนวนวันอยู่ของผู้ป่วยจำหน่ายแต่ละคน¹ (length of stay) หมายถึง จำนวนวันที่อยู่รักษาในสถานพยาบาลของผู้ป่วยจำหน่ายแต่ละคน การนับวันให้นับตั้งแต่วันที่รับไว้ ไม่นับวันจำหน่าย ยกเว้น รับไว้และจำหน่ายในวันเดียวกันให้นับเป็น 1 วัน โดยใช้ 0.00 น. แบ่งวัน

¹ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, ศัพทานุกรมข้อมูลสุขภาพ, 2547, โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, กรุงเทพฯ

ผู้ป่วยนอก¹ (out - patient) หมายถึง ผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยและได้ลงทะเบียนไว้ที่แผนกผู้ป่วยนอก

ราย หมายถึง จำนวนครั้งของการมารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน สำหรับในรายงานนี้รวบรวมการวินิจฉัยโรคหลักผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง

รายโรค หมายถึง จำนวนของโรคที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคนั้น ๆ ในแต่ละครั้งที่มาใช้บริการ สำหรับในรายงานนี้ รวบรวมจากการวินิจฉัยโรคของผู้มารับบริการในแต่ละครั้ง

การวินิจฉัยโรคหลัก หมายถึง การวินิจฉัยโรคหลักที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษาพยาบาลไม่นับรวมการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ที่เป็นโรคร่วมด้วยในครั้งนั้น

รวมทุกการวินิจฉัยโรค หมายถึง การวินิจฉัยโรคทั้งหมดที่ผู้ป่วยต้องมารับบริการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ได้แก่ การวินิจฉัยโรคหลัก (Principle) การวินิจฉัยโรคร่วม (Co-morbidity) การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อน (Complication) และการวินิจฉัยโรคอื่น ๆ (Other)

ผู้ป่วยจำหน่าย หมายถึง ผู้ป่วยในที่ได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่กำหนด


ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยนอก ประมวลผลโดยใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล ตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) จากคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) และจำแนกกลุ่มโรคเป็น 21 กลุ่มโรค โดยแสดงข้อมูลสถิติของผู้มารับบริการรักษาพยาบาลในภาพรวมระดับประเทศและรายภาค ตามกลุ่มโรคต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 1 – 3

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยนอก

ภาพที่ 1 อัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน ปี พ.ศ. 2558 – 2562



เมื่อเปรียบเทียบอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน ในภาพรวมประเทศ ย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2562) (ภาพที่ 1) พบว่า ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุดในขณะที่ปี พ.ศ. 2559 – 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 มีอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ส่วนปี พ.ศ. 2558 มีอัตราผู้ป่วยนอกต่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการนำเข้าข้อมูล จากเดิมใช้รูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน เปลี่ยนเป็นการนำเข้าข้อมูลที่หน่วยบริการเป็นผู้บันทึกและส่งออกในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลที่หน่วยบริการบันทึกและส่งเข้ามาที่คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center: HDC) จะมีการนำมาตรวจสอบคุณภาพข้อมูลให้มีความครบถ้วน และถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการส่งร่วมกับหน่วยบริการแม่ข่าย หรือส่งข้อมูลเอง แม้ว่าการส่งออกข้อมูลจะยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ ทั้งหน่วยบริการภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ

ตารางที่ 1 อัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 - 2561 (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร)

ลำดับ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	2562		2561		2560		2559		2558	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
9	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	682.99	1	604.77	1	638.33	1	610.93	1	489.89
4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	632.34	2	557.48	2	589.97	2	567.13	2	462.23
11	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	468.16	3	414.76	4	441.99	4	440.42	5	362.53
13	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม	4	458.33	4	390.51	5	432.88	5	438.54	4	371.76
10	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	410.78	5	378.07	3	447.85	3	499.58	3	408.14
14	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	225.93	8	91.84	7	103.58	8	108.69	6	141.67
5	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	141.38	10	88.40	10	89.66	10	76.36	10	72.09
1	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	140.89	7	94.14	8	101.75	7	110.98	7	115.17
12	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	107.02	6	96.13	6	108.40	6	114.56	8	98.25
7	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตาบางส่วนประกอบของตา	10	103.30	9	90.21	9	100.28	9	104.42	9	86.06

อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2558 - 2562) (ตารางที่ 1) พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 2 อันดับแรก เหมือนกันทั้ง 5 ปี คือ กลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ กลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ตามลำดับ ส่วนกลุ่มโรคอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับที่น่าสนใจมี 3 กลุ่มโรค คือ โรคระบบหายใจ จากเดิมอันดับ 3 เปลี่ยนเป็นอันดับ 5 ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม จากเดิมอันดับ 10 เปลี่ยนเป็นอันดับ 7 และโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง จากเดิมอันดับ 6 เปลี่ยนเป็นอันดับ 9

ตารางที่ 2 อัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562 (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร)

ลำดับ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	ทั้งประเทศ		ภาคเหนือ		ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคใต้	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
9	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	682.99	1	902.79	1	689.50	1	583.86	1	630.08
4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	632.34	2	784.91	2	647.99	2	566.51	2	568.60
11	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	468.16	4	507.27	3	444.52	3	476.09	3	443.73
13	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	4	458.33	3	549.69	4	431.50	4	471.62	5	362.33
10	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	410.78	5	413.45	5	396.06	5	409.92	4	435.96
14	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	225.93	6	285.14	6	191.35	6	236.41	6	190.27
5	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	141.38	7	172.69	8	118.44	7	139.85	8	147.43
1	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	140.89	8	146.72	7	140.37	8	133.40	7	152.04
12	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	107.02	10	118.43	10	107.42	9	98.04	9	113.13
7	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	10	103.30	9	119.06	9	109.46	10	96.57	10	88.42

เมื่อเปรียบเทียบอัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรกทั้งประเทศเปรียบเทียบกับรายภาค ปี พ.ศ.2562 (ตารางที่ 2) พบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศ กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 2 อันดับแรกคือ กลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ กลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราป่วยที่พบรายภาคทั้ง 4 ภาค โดยเมื่อวิเคราะห์แยกเป็นรายภาค พบว่า อัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุการป่วยด้วยกลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด มีอัตราป่วยสูงที่สุดในภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ตามลำดับ เช่นเดียวกับกลุ่มโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม มีอัตราป่วยสูงที่สุดในภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ตามลำดับ

ตารางที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วย เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562 (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร)

หน่วยนับ : รายโรค

ลำดับกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	ทั้งประเทศ		ภาคเหนือ		ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคใต้	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวม	241,816,724	4,030.69	55,533,341	4,758.16	66,559,638	3,928.08	83,723,610	3,811.17	36,000,135	3,825.66
1	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8,452,320	140.89	1,712,448	146.72	2,378,584	140.37	2,930,585	133.40	1,430,703	152.04
2	Neoplasms (C00-C97, D00-D48) เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	3,335,208	55.59	894,935	76.68	869,024	51.29	1,151,218	52.40	420,031	44.64
3	Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	2,255,416	37.59	544,723	46.67	568,318	33.54	871,717	39.68	270,658	28.76
4	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม	37,936,501	632.34	9,160,823	784.91	10,980,006	647.99	12,445,045	566.51	5,350,627	568.60
5	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	8,481,987	141.38	2,015,503	172.69	2,006,938	118.44	3,072,194	139.85	1,387,352	147.43
6	Diseases of the nervous system (G00-G99) โรคระบบประสาท	4,046,402	67.45	926,687	79.40	1,228,876	72.52	1,274,944	58.04	615,895	65.45
7	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	6,197,583	103.30	1,389,545	119.06	1,854,670	109.46	2,121,348	96.57	832,020	88.42
8	Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95) โรคหูและปุ่มกกหู	1,760,245	29.34	443,797	38.03	497,280	29.35	533,413	24.28	285,755	30.37
9	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	40,975,325	682.99	10,536,658	902.79	11,683,361	689.50	12,826,125	583.86	5,929,181	630.08
10	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	24,644,026	410.78	4,825,425	413.45	6,711,005	396.06	9,005,112	409.92	4,102,484	435.96

ตารางที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วย เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562 (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

ลำดับกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	ทั้งประเทศ		ภาคเหนือ		ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคใต้	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
11	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	28,086,922	468.16	5,920,439	507.27	7,532,175	444.52	10,458,694	476.09	4,175,614	443.73
12	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	6,420,629	107.02	1,382,209	118.43	1,820,190	107.42	2,153,683	98.04	1,064,547	113.13
13	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	27,497,262	458.33	6,415,584	549.69	7,311,544	431.50	10,360,560	471.62	3,409,574	362.33
14	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	13,554,267	225.93	3,327,890	285.14	3,242,337	191.35	5,193,532	236.41	1,790,508	190.27
15	Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99) ยกเว้น (O80-O84) ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	1,012,284	16.87	153,589	13.16	310,220	18.31	299,009	13.61	249,466	26.51
16	Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96) ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)	271,488	4.53	55,703	4.77	81,624	4.82	99,369	4.52	34,792	3.70
17	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00-Q99) รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิด และ โครโมโซม ผิดปกติ	322,686	5.38	72,032	6.17	83,464	4.93	111,693	5.08	55,497	5.90

ตารางที่ 3 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามสาเหตุการป่วย เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562 (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

ลำดับกลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	ทั้งประเทศ		ภาคเหนือ		ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคใต้	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
18	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R99) อาการ, อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น ๆ ได้	20,251,285	337.56	4,475,043	383.43	5,577,446	329.16	6,608,044	300.80	3,590,752	381.58
19	Poisoning, toxic effect, and their sequelae (X40-X49, X60-X69, X85-X90, Y10-Y19) การเป็นพิษและผลที่ตามมา	74,465	1.24	16,369	1.40	23,257	1.37	22,064	1.00	12,775	1.36
20	Transport accidents and their sequelae (V01-V99, Y85) อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	1,280,656	21.35	251,575	21.56	407,072	24.02	419,681	19.10	202,328	21.50
21	Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes) (W00-W99, X00-X19, X20-X29, X30-X39, X50-X59, X70-X84, X91-X99, Y00-Y09, Y20-Y36, Y40-Y84, Y86-Y89) สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	4,959,767	82.67	1,012,364	86.74	1,392,247	82.16	1,765,580	80.37	789,576	83.91

เมื่อพิจารณาจำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกทั้งประเทศและรายภาค จำแนกตามสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2562 ต่อประชากร 1,000 คน (ตารางที่ 3) โดยพิจารณาเฉพาะอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มโรครายภาค พบว่า กลุ่มโรคส่วนใหญ่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุดในภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มโรคที่ 2 เนื้องอก (รวมมะเร็ง) (อัตรา 76.68) กลุ่มโรคที่ 3 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (อัตรา 46.67) และกลุ่มโรคที่ 4 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม (อัตรา 784.91) เป็นต้น


ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน

ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน

สถานการณ์การป่วยปี พ.ศ. 2562 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการป่วยของประชาชนไทย จากข้อมูลผู้ป่วยใน ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยรายงานการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยในเป็นการจำแนกสาเหตุการป่วย ตามกลุ่มโรค/โรค การจัดอันดับโรคในแต่ละกลุ่มอายุ จำแนกตามเพศ และภูมิภาคต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน

ภาพที่ 2 อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบตามเพศ ปี พ.ศ. 2562




เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 2) พบว่า อัตราผู้ป่วยในภาพรวมทั้งประเทศคือ 32,678.78 เมื่อเปรียบเทียบตามเพศ จะเห็นว่า อัตราผู้ป่วยในเพศหญิงมีอัตราสูงกว่าเพศชาย คือ 33,086.69 และ 32,253.49 ตามลำดับ

ภาพที่ 3 อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562




เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 3) พบว่า ภาคเหนือมีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) ตามลำดับ

ภาพที่ 4 อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2558 – 2562



เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 (ภาพที่ 4) พบว่า อัตราผู้ป่วยในโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราผู้ป่วยในลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 และมีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดในปี พ.ศ. 2562

ภาพที่ 5 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ ปี พ.ศ. 2562



เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 5) พบว่า กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี กลุ่มอายุ 15-59 ปี กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 5-14 ปี ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุและเพศ พบว่า เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในมากกว่าเพศหญิงในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มอายุที่เพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในมากกว่าเพศชาย คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี

ตารางที่ 4 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก เปรียบเทียบตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	ทั้งประเทศ		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ	2,381,615	3,632.89	1,148,564	3,578.64	1,233,051	3,684.92
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	1,556,403	2,374.12	687,626	2,142.47	868,777	2,596.30
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,002,310	1,528.91	412,552	1,285.41	589,758	1,762.47
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	855,419	1,304.85	426,362	1,328.44	429,057	1,282.22
5	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	838,983	1,279.78	386,279	1,203.55	452,704	1,352.89
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	523,336	798.29	296,074	922.49	227,262	679.16
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	440,445	671.85	205,276	639.59	235,169	702.79
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	344,373	525.30	201,717	628.50	142,656	426.32
9*	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	280,033	427.16	0	0.00	280,033	836.87
10	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ	276,660	422.01	134,015	417.56	142,645	426.29

หมายเหตุ: * อันดับที่ 9 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด การคำนวณอัตราป่วยเพศหญิงใช้จำนวนประชากรรวมเฉพาะเพศหญิงเป็นตัวหาร

เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562 (ตารางที่ 4) พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และเบาหวาน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุการป่วยตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศชาย ยกเว้น ไตวาย ปอดบวม และโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ ตามลำดับ ซึ่งพบว่าเพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง

ตารางที่ 5 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	ทั้งประเทศ		ภาคเหนือ		ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคใต้	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	2,381,615	3,632.89	493,658	4,229.72	604,260	3,566.09	776,034	3,532.57	302,294	3,212.41
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	1,556,403	2,374.12	303,762	2,602.67	399,577	2,358.14	502,720	2,288.42	205,099	2,179.54
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,002,310	1,528.91	168,336	1,442.32	239,720	1,414.73	390,581	1,777.96	118,160	1,255.66
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	855,419	1,304.85	170,512	1,460.97	183,604	1,083.56	350,226	1,594.26	95,713	1,017.12
5	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	838,983	1,279.78	179,104	1,534.58	194,138	1,145.72	319,138	1,452.74	87,708	932.05
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	523,336	798.29	96,223	824.45	114,734	677.11	196,415	894.10	87,699	931.96
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	440,445	671.85	76,911	658.98	91,537	540.21	180,947	823.69	76,280	810.61
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	344,373	525.30	70,931	607.74	79,868	471.35	116,593	530.74	46,763	496.94
9	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	280,033	427.16	42,912	367.67	60,568	357.45	89,982	409.61	70,663	750.92
10	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	276,660	422.01	55,165	472.66	66,576	392.90	95,484	434.65	29,023	308.42

เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก เปรียบเทียบรายภาค ปี พ.ศ. 2562 (ตารางที่ 5) พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และเบาหวาน ตามลำดับ โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มโรครายภาค พบว่า กลุ่มโรคส่วนใหญ่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดในภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่มโรคอันดับที่ 1 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ กลุ่มโรคอันดับที่ 2 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และกลุ่มโรคอันดับที่ 5 โลหิตจางอื่น ๆ ตามลำดับ

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน รายเขตสุขภาพ
ตารางที่ 6 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 1 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	4,169.50
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,592.82
3	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,732.03
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,527.08
5	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,351.17
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	886.60
7	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	737.50
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	666.38
9	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	636.31
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	528.87

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 1 (ตารางที่ 6) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และโลหิตจางอื่น ๆ ตามลำดับ

ตารางที่ 7 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 2 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	4,099.04
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,492.88
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,495.80
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,487.27
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,272.90
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	720.10
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	640.58
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	462.62
9	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	444.09
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	439.62

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 2 (ตารางที่ 7) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 8 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	4,465.52
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,777.02
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,566.35
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,543.85
5	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,207.25
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	826.46
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	744.22
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	657.96
9	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	513.53
10	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	445.53

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 3 (ตารางที่ 8) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 9 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 4 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	3,608.11
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,391.24
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,417.34
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,135.72
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,122.22
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	676.10
7	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	515.77
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	473.03
9	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	467.82
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	426.89

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 4 (ตารางที่ 9) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 10 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 5 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	3,923.67
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,750.62
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,581.80
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,226.74
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,162.51
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	749.37
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	667.53
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	478.91
9	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	464.51
10	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	449.51

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 5 (ตารางที่ 10) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 11 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 6 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	3,203.02
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	1,967.84
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,261.30
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,070.84
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	967.53
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	609.80
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	474.04
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	464.61
9	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ใน ระยะปริกำเนิด	423.77
10	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	395.94

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 6 (ตารางที่ 11) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 12 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 7 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	3,150.67
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,428.56
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	2,089.05
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,662.23
5	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,541.69
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	1,022.17
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	818.94
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	540.12
9	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	463.74
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	412.69

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 7 (ตารางที่ 12) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 13 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	2,988.83
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	1,950.14
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,639.88
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,442.94
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,366.22
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	743.63
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	710.28
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	468.14
9	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	421.39
10	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	348.04

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 8 (ตารางที่ 13) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 14 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 9 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	4,127.47
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,441.80
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,626.72
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,520.12
5	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,400.34
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	862.91
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	838.26
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	559.04
9	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	474.32
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	414.29

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 9 (ตารางที่ 14) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 15 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	3,731.14
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,316.20
3	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,902.95
4	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,825.11
5	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,444.01
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	980.45
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	943.89
8	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	554.16
9	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	448.63
10	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	433.93

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 10 (ตารางที่ 15) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และไตวาย ตามลำดับ

ตารางที่ 16 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	3,477.35
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,252.20
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,311.50
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	1,048.38
5	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	989.43
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	759.46
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	755.00
8	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	662.72
9	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	569.68
10	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	485.28

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 11 (ตารางที่ 16) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 17 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	2,975.64
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,114.61
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,205.76
4	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	1,086.12
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	989.18
6	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	880.78
7	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	860.31
8	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	829.74
9	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	529.76
10	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	527.00

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 12 (ตารางที่ 17) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 18 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
เขตสุขภาพที่ 13 ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	อัตรา
1	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	3,691.60
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2,610.85
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	1,537.14
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	1,058.67
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	995.19
6	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่ได้รับบุรุษระยะเยียด และเกิดขึ้นหลายแห่ง	757.70
7	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	696.59
8	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	546.67
9	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	543.18
10	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	508.08


อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) เขตสุขภาพที่ 13 (ตารางที่ 18) พบสาเหตุการป่วยที่สูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุและเบาหวาน ตามลำดับ

ตารางที่ 19 อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2558 – 2561

ลำดับ กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	2562		2561		2560		2559		2558	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	1	3,632.89	1	3,320.92	1	3,208.18	1	3,254.58	1	3,136.40
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	2	2,374.12	2	2,230.18	2	2,076.76	2	1,993.38	2	1,882.32
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	3	1,528.91	3	1,439.04	3	1,344.95	3	1,292.79	3	1,233.46
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	4	1,304.85	5	1,203.44	5	1,132.17	5	1,092.81	5	993.89
098	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	5	1,279.78	4	1,205.03	4	1,171.34	4	1,192.32	4	1,156.98
169	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	6	798.29	6	858.80	6	810.25	6	791.87	6	702.44
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	7	671.85	7	690.61	7	585.44	7	687.03	7	617.45
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	8	525.30	8	505.78	8	506.97	8	522.50	8	495.44
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	9	427.16	9	444.48	9	457.06	9	451.03	9	451.37
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	10	422.01	-	-	-	-	-	-	-	-

จากตารางที่ 19 พบว่า สาเหตุการป่วยที่พบสูงที่สุดคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และเบาหวาน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเจ็บป่วย 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2562 พบอัตราผู้ป่วยในป่วย 3 อันดับแรกเหมือนกันทั้ง 5 ปี และมีแนวโน้มอัตราผู้ป่วยในทั้ง 3 กลุ่มโรคเพิ่มสูงขึ้น

ภาพที่ 6 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ปี พ.ศ. 2558 – 2562



อัตราผู้ป่วยในจำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ (ภาพที่ 6) พบว่า โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มอัตราผู้ป่วยในเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกโรค ยกเว้น โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นเรื้อรังอื่น พบว่า อัตราผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2562 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

ตารางที่ 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	228,497	37,899.59	126,432	40,780.70	102,065	34,849.70
2	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	78,072	12,949.39	46,799	15,095.04	31,273	10,678.04
3	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	61,598	10,216.93	31,013	10,003.26	30,585	10,443.13
4	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	42,627	7,070.32	26,615	8,584.68	16,012	5,467.23

ตารางที่ 20 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
5	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	41,894	6,948.74	24,882	8,025.70	17,012	5,808.68
6	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	36,043	5,978.26	19,934	6,429.72	16,109	5,500.36
7	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	33,460	5,549.83	19,765	6,375.21	13,695	4,676.10
8	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดาและโรคแทรกในระหว่างตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	27,595	4,577.04	14,532	4,687.30	13,063	4,460.31
9	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	25,801	4,279.48	16,489	5,318.53	9,312	3,179.55
10	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	19,452	3,226.40	13,934	4,494.42	5,518	1,884.10

สถานการณ์การเจ็บป่วยในเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี (ตารางที่ 20) พบว่า อัตราผู้ป่วยในที่มีสาเหตุจากภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด มีอัตราสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด และทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย ตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้น สาเหตุการป่วยจากทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศชาย

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน เด็กกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี

ตารางที่ 21 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
10 อันดับแรก กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	228,497	6,930.67	126,432	7,458.47	102,065	6,372.09
2	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	137,523	4,171.29	79,811	4,708.21	57,712	3,603.06
3	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	136,040	4,126.31	80,004	4,719.59	56,036	3,498.42
4	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	94,843	2,876.74	57,649	3,400.83	37,194	2,322.09
5	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	78,072	2,368.05	46,799	2,760.77	31,273	1,952.43
6	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	61,598	1,868.36	31,013	1,829.52	30,585	1,909.47
7	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ	57,184	1,734.48	32,338	1,907.68	24,846	1,551.18
8	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	49,792	1,510.27	31,301	1,846.51	18,491	1,154.42
9	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	39,975	1,212.50	24,157	1,425.07	15,818	987.54
10	Influenza (J10-J11) ไข้หวัดใหญ่	38,876	1,179.17	21,914	1,292.75	16,962	1,058.97

สถานการณ์การเจ็บป่วยในเด็กกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี (ตารางที่ 21) พบว่า อัตราผู้ป่วยในที่มีสาเหตุจากภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด มีอัตราสูงที่สุด รองลงมาคือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และปอดบวม ตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้น สาเหตุการป่วยจากทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศชาย

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 5 - 14 ปี

ตารางที่ 22 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	89,834	1,149.13	46,373	1,153.85	43,461	1,144.14
2	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออก ที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	77,463	990.88	41,067	1,021.82	36,396	958.15
3	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ	66,588	851.77	35,726	888.93	30,862	812.46
4	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	53,614	685.81	29,497	733.94	24,117	634.90
5	Influenza (J10-J11) ไข้หวัดใหญ่	32,959	421.60	18,311	455.61	14,648	385.62
6	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก อักเสบเฉียบพลัน	24,338	311.32	14,236	354.22	10,102	265.94
7	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	23,872	305.36	13,190	328.19	10,682	281.21
8	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้น อักเสบ	19,335	247.33	9,885	245.96	9,450	248.78
9	Asthma (J45-J46) โรคหืด	18,240	233.32	11,516	286.54	6,724	177.01
10	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิล อักเสบเฉียบพลัน	17,447	223.18	9,636	239.76	7,811	205.63

สถานการณ์การเจ็บป่วยในกลุ่มอายุ 5 – 14 ปี มีสาเหตุการป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก (ตารางที่ 22) ได้แก่ โลหิตจางอื่น ๆ รองลงมาคือ ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและใช้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ และความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมแทบอลิซึมอื่น ๆ ตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในมากกว่าเพศหญิง ยกเว้น สาเหตุการป่วยจากกระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ ที่ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีอัตราใกล้เคียงกัน

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 24 ปี

ตารางที่ 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1*	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	98,334	1,121.98	0	0.00	98,334	2,297.25
2	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมแทบอลิซึมอื่น ๆ	58,278	664.94	30,510	680.45	27,768	648.71
3*	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะคลอด	50,351	574.50	0	0.00	50,351	1,176.28
4	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	48,791	556.70	19,416	433.02	29,375	686.25
5	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและใช้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	44,700	510.02	24,535	547.19	20,165	471.09
6	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	31,783	362.64	24,503	546.47	7,280	170.07

ตารางที่ 23 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
7*	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอดและภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด	29,559	337.26	0	0.00	29,559	690.55
8	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	25,422	290.06	8,804	196.35	16,618	388.22
9	Fracture of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	21,357	243.68	17,284	385.47	4,073	95.15
10	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	18,457	210.59	8,307	185.27	10,150	237.12

หมายเหตุ: * ลำดับที่ 1 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)
ลำดับที่ 3 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48)
ลำดับที่ 7 ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอดและภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด (O85-O99)
ทั้ง 3 กลุ่มโรค/กลุ่มสาเหตุการป่วย พบได้เฉพาะในเพศหญิง

สถานการณ์การเจ็บป่วยในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี มีสาเหตุการป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรก (ตารางที่ 23) ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด รองลงมาคือ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ และการดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด ตามลำดับ แต่เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยที่พบได้ทั้ง 2 เพศ พบว่า อัตราผู้ป่วยในที่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ได้แก่ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ไขจากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย และกระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ นอกนั้นเป็นกลุ่มโรคที่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 59 ปี

ตารางที่ 24 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ	835,542	1,932.01	466,816	2,181.12	368,726	1,687.94
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	400,115	925.18	190,933	892.10	209,182	957.58
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	327,673	757.67	151,000	705.52	176,673	808.77
4	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	307,597	711.25	142,378	665.24	165,219	756.33
5*	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	278,430	643.81	0	0.00	278,430	1,274.59
6	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	224,626	519.40	125,673	587.19	98,953	452.98
7*	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด	147,644	341.39	0	0.00	147,644	675.88
8	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	133,668	309.08	101,444	473.98	32,224	147.51

ตารางที่ 24 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
9	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	121,583	281.13	48,468	226.46	73,115	334.70
10	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	112,916	261.09	73,333	342.64	39,583	181.20

หมายเหตุ: * ลำดับที่ 5 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)

ลำดับที่ 7 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจเกิดได้ในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48)

ทั้ง 2 กลุ่มโรค/กลุ่มสาเหตุการป่วย พบได้เฉพาะในเพศหญิง

การเจ็บป่วยของประชากรในช่วงวัย 15 - 59 ปี ครอบคลุม 3 กลุ่มวัย คือ วัยรุ่น วัยเจริญพันธุ์ และวัยทำงาน จะเห็นว่าสาเหตุการป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก (ตารางที่ 24) ได้แก่ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมแทบอลิซึมอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ และเบาหวาน ตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศ พบว่า อัตราผู้ป่วยในที่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ได้แก่ ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึมอื่น ๆ รองลงมาคือ ไตวาย การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย และโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ (J22, J66-J99) นอกนั้นเป็นกลุ่มโรคที่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป

ตารางที่ 25 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ: รายโรค

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมแทบอลิซึมอื่น ๆ	1,422,301	12,704.52	613,684	12,327.44	808,617	13,006.45
2	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	1,154,169	10,309.46	495,414	9,951.68	658,755	10,595.95
3	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	672,657	6,008.42	260,748	5,237.80	411,909	6,625.48
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	627,699	5,606.84	298,819	6,002.56	328,880	5,289.97
5	Other anaemia (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	391,760	3,499.34	166,227	3,339.10	225,533	3,627.66
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	259,356	2,316.66	139,522	2,802.66	119,834	1,927.51

ตารางที่ 25 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย
10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ: รายโรค


อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
7	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและ ปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	213,467	1,906.77	159,810	3,210.20	53,657	863.06
8	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้า หัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	208,480	1,862.22	97,987	1,968.32	110,493	1,777.26
9	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	208,213	1,859.84	114,770	2,305.46	93,443	1,503.01
10	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	197,385	1,763.12	109,444	2,198.47	87,941	1,414.51

ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสาเหตุการป่วยใน 3 อันดับแรก (ตารางที่ 25) ได้แก่ ความผิดปกติของ
ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ และเบาหวาน ตามลำดับ
และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้ง 3 กลุ่มโรค สาเหตุการป่วยที่พบรองลงมาคือ ไตวาย พบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง โลหิตจางอื่น ๆ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และปอดบวม พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตามลำดับ


ภาพรวมของสถานการณ์การป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก

สถานการณ์การป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก เปรียบเทียบย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 และจำแนกตามเพศ (ภาพที่ 7) พบว่า อัตราผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยพบอัตราสูงที่สุดใน ปี พ.ศ. 2562 เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า สถานการณ์ป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอก พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทุกปีเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 7 อัตราผู้ป่วยในทั้งประเทศต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2558 – 2562



ภาพที่ 8 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก รายภาคและกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562



ภาพที่ 8 อัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอกในภาพรวมทั่วประเทศ มีอัตรา 1,107.45 ต่อประชากรแสนคน เมื่อเปรียบเทียบรายภาค พบว่า ภาคเหนือ มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ


ตารางที่ 26 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก 10 อันดับแรก
จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : ราย

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	138,345	211.03	75,923	236.56	62,422	186.55
2	Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	84,824	129.39	65,408	203.80	19,416	58.02
3	Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	79,411	121.13	56,599	176.35	22,812	68.17
4	Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59) ยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	74,625	113.83	33,434	104.17	41,191	123.10
5	Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	33,428	50.99	20,169	62.84	13,259	39.62
6	Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere (Y90-Y98) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่มีได้ระบุไว้ที่อื่น	32,673	49.84	18,963	59.08	13,710	40.97
7	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	30,085	45.89	16,954	52.82	13,131	39.24
8	Assault (X85-Y09) การถูกทำร้าย	25,604	39.06	19,200	59.82	6,404	19.14
9	Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	19,495	29.74	11,534	35.94	7,961	23.79
10	Intentional self-harm (X60-X84) การทำร้ายตัวเอง	19,490	29.73	8,320	25.92	11,170	33.38

จากตารางที่ 26 พบว่า สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอกภาพรวมทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2562 พบสาเหตุของการป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม รองลงมาคือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และคนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตามลำดับ และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทั้ง 3 กลุ่ม

ภาพที่ 9 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี พ.ศ. 2562



เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอกภาพรวมทั้งประเทศ พบอัตรา 1,107.45 ต่อประชากรแสนคน เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่มอายุ พบว่า อัตราผู้ป่วยในสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอัตรา 2,221.21 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี อัตรา 1,154.75 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี อัตรา 983.86 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (ภาพที่ 9)

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี

ตารางที่ 27 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุแรกเกิด – 14 ปี จากสาเหตุภายนอก ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : ราย

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	< 1 ปี		1 – 4 ปี		5 – 14 ปี		แรกเกิด – 14 ปี	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	907	150.44	6,072	225.39	13,699	175.23	20,678	186.05
2	Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	290	48.10	3,758	139.50	8,307	106.26	12,355	111.16
3	Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	88	14.60	567	21.05	6,152	78.69	6,807	61.24
4	Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	185	30.68	1,491	55.35	4,756	60.84	6,432	57.87
5	Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59) ยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	619	102.67	1,560	57.91	2,632	33.67	4,811	43.29
6	Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	94	15.59	1,124	41.72	2,687	34.37	3,905	35.13
7	Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere (Y90-Y98) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่ได้ระบุไว้ที่อื่น	1,968	326.42	704	26.13	502	6.42	3,174	28.56
8	Pedal cyclist injured in transport accident (V10-V19) ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	8	1.33	423	15.70	2,333	29.84	2,764	24.87
9	Contact with heat and hot substances (X10-X19) การถูกความร้อนและสารร้อน	518	85.92	1,401	52.00	442	5.65	2,361	21.24
10	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	383	63.53	512	19.01	1,318	16.86	2,213	19.91

สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยที่สำคัญ 3 อันดับแรกในกลุ่มอายุนี้นี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ตามตารางที่ 27 พบว่า การพลัดตกหกล้ม มีอัตราสูงที่สุด รองลงมาคือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และคนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุ พบว่า การพลัดตกหกล้ม เป็นสาเหตุภายนอกที่พบสูงที่สุดในทุกกลุ่มอายุ ยกเว้น กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี เมื่อพิจารณาการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกในกลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี พบว่า ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่ได้ระบุไว้ที่อื่น เป็นสาเหตุที่พบสูงที่สุด รองลงมาคือ การพลัดตกหกล้ม และยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา ตามลำดับ ในกลุ่มอายุ 1-4 ปี การป่วยจากสาเหตุภายนอกที่พบสูงที่สุดคือ การพลัดตกหกล้ม รองลงมาคือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา ตามลำดับ ในกลุ่มอายุ 5-14 ปี พบสาเหตุจากการพลัดตกหกล้มสูงที่สุด รองลงมาคือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และคนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตามลำดับ

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในด้วยสาเหตุภายนอก กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

ตารางที่ 28 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : ราย

อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	15 – 24 ปี						15 – 59 ปี					
		รวม		ชาย		หญิง		รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	23,105	263.62	17,338	386.68	5,767	134.73	62,866	145.36	45,342	211.85	17,524	80.22
2	Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	6,655	75.93	4,758	106.11	1,897	44.32	54,723	126.53	37,696	176.13	17,027	77.95
3	Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	8,741	99.73	7,552	168.43	1,189	27.78	52,485	121.36	42,910	200.49	9,575	43.83
4	Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59) ยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	3,300	37.65	1,622	36.17	1,678	39.20	28,256	65.34	13,792	64.44	14,464	66.21
5	Assault (X85-Y09) การถูกทำร้าย	6,554	74.78	5,455	121.66	1,099	25.67	22,133	51.18	16,977	79.32	5,156	23.60
6	Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	3,897	44.46	2,537	56.58	1,360	31.77	19,945	46.12	12,291	57.43	7,654	35.04
7	Intentional self-harm (X60-X84) การทำร้ายตัวเอง	6,213	70.89	1,975	44.05	4,238	99.01	16,793	38.83	7,194	33.61	9,599	43.94
8	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	2,289	26.12	1,514	33.77	775	18.11	15,212	35.17	8,785	41.05	6,427	29.42
9	Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	1,988	22.68	1,357	30.26	631	14.74	10,200	23.59	6,319	29.52	3,881	17.77
10	Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere (Y90-Y98) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่ไม่ได้ระบุไว้ที่อื่น	880	10.04	621	13.85	259	6.05	9,787	22.63	6,421	30.00	3,366	15.41

กลุ่มอายุ 15-59 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงาน สาเหตุภายนอกที่เป็นสาเหตุการป่วยที่สำคัญในภาพรวม (ตารางที่ 28) ได้แก่ คนซึ่งรถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง รองลงมาคือ การพลัดตกหกล้ม และบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต ตามลำดับ และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้ง 3 กลุ่ม เมื่อพิจารณาจากกลุ่มอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่น พบสาเหตุภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ คนซึ่งรถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง รองลงมาคือ บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต และการพลัดตกหกล้ม ตามลำดับ และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้ง 3 กลุ่ม

ตารางที่ 29 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 หน่วยนับ : ราย


อันดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Falls (W00-W19) การพลัดตกหกล้ม	62,944	562.24	24,334	488.81	38,610	621.03
2	Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use (Y40-Y59) ยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	41,558	371.21	16,836	338.20	24,722	397.65
3	Exposure to inanimate mechanical forces (W20-W49) บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	19,984	178.50	13,826	277.73	6,158	99.05
4	Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere (Y90-Y98) ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่ไม่ได้ระบุไว้ที่อื่น	19,712	176.07	10,655	214.03	9,057	145.68
5	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure (Y83-Y84) วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	12,660	113.08	6,834	137.28	5,826	93.71
6	Motorcycle rider injured in transport accident (V20-V29) คนซึ่งรถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	9,738	86.98	6,679	134.17	3,059	49.20
7	Contact with venomous animals and plants (X20-X29) สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	7,051	62.98	3,599	72.30	3,452	55.52
8	Misadventures to patients during surgical and medical care (Y60-Y69) ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะให้การรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรม	6,219	55.55	3,027	60.81	3,192	51.34

ตารางที่ 29 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จากสาเหตุภายนอก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ) หน่วยนับ : ราย

ลำดับ	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค/กลุ่มโรค)	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
9	Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use (Y70-Y82) ความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์	5,407	48.30	2,715	54.54	2,692	43.30
10	Exposure to animate mechanical forces (W50-W64) บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	5,390	48.15	2,715	54.54	2,675	43.03

กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ตารางที่ 29) พบว่า อัตราผู้ป่วยในจากสาเหตุภายนอกที่พบสูงที่สุด ได้แก่ การพลัดตกหกล้ม รองลงมาคือ ยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา และบาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต ตามลำดับ และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ยกเว้น บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต ซึ่งพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ภาพที่ 10 สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาล และสิทธิการรักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2562



ภาพที่ 10 จากการวิเคราะห์พบว่า สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยในของผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลประเภท สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ตามลำดับ ส่วนผู้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว มีสัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงพยาบาลรัฐอื่นมากกว่าผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิการรักษาอื่น ๆ สำหรับการรักษายาบาลในโรงพยาบาลเอกชน พบว่าผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นกลุ่มที่เข้ารับการรักษาสูงที่สุด รองลงมาคือ สิทธิการรักษาอื่น ๆ และสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว ตามลำดับ

ตารางที่ 30 จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : วัน

ประเภทโรงพยาบาล	จำนวนผู้ป่วยและวันนอนรวม			หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ			สิทธิการรักษาอื่น ๆ		
	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	วันนอนรวม	วันนอนเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	วันนอนรวม	วันนอนเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	วันนอนรวม	วันนอนเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	วันนอนรวม	วันนอนเฉลี่ย
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
- โรงพยาบาลศูนย์	1,596,311	7,992,769	5.01	1,245,334	6,063,292	4.87	170,846	1,000,492	5.86	180,131	928,985	5.16
- โรงพยาบาลทั่วไป	1,702,589	7,462,148	4.38	1,330,989	5,687,111	4.27	176,198	956,398	5.43	195,402	818,639	4.19
- โรงพยาบาลชุมชน	3,074,604	9,529,958	3.10	2,656,285	8,193,646	3.08	203,357	707,108	3.48	214,962	629,204	2.93
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ	185,071	2,251,641	12.17	137,619	1,869,473	13.58	28,141	260,956	9.27	19,311	121,212	6.28
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	283,996	1,768,390	6.23	131,561	827,028	6.29	117,723	727,308	6.18	34,712	214,054	6.17
โรงพยาบาลรัฐ อื่น ๆ	324,860	2,109,101	6.49	165,376	1,093,710	6.61	109,018	759,516	6.97	50,466	255,875	5.07
โรงพยาบาลเอกชน	207,405	767,177	3.70	159,408	525,477	3.30	686	2,810	4.10	47,311	238,890	5.05
รวม	7,374,836	31,881,184	4.32	5,826,572	24,259,737	4.16	805,969	4,414,588	5.48	742,295	3,206,859	4.32

จากตารางที่ 30 จำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยโดยรวมเฉลี่ย 4.32 วัน โดยสิทธิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว มีจำนวนวันนอนเฉลี่ยสูงสุด 5.48 วัน รองลงมาคือสิทธิการรักษาอื่น ๆ 4.32 วัน และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4.16 วัน เมื่อเปรียบเทียบวันนอนเฉลี่ย แยกตามประเภทโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ มีวันนอนเฉลี่ยสูงสุด 12.17 วัน รองลงมาคือ โรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ 6.49 วัน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6.23 วัน โรงพยาบาลศูนย์ 5.01 วัน โรงพยาบาลทั่วไป 4.38 วัน โรงพยาบาลเอกชน 3.70 วัน และโรงพยาบาลชุมชน 3.10 วัน ตามลำดับ

ตารางที่ 31 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : โรค

ประเภทโรงพยาบาล	จำนวนผู้ป่วยและโรคเฉลี่ย			หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ			สิทธิการรักษาอื่น ๆ		
	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	จำนวนโรครวม	จำนวนโรคเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	จำนวนโรครวม	จำนวนโรคเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	จำนวนโรครวม	จำนวนโรคเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	จำนวนโรครวม	จำนวนโรคเฉลี่ย
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
- โรงพยาบาลศูนย์	1,596,311	5,159,898	3.23	1,245,334	4,088,235	3.28	170,846	592,792	3.47	180,131	478,871	2.66
- โรงพยาบาลทั่วไป	1,702,589	5,031,384	2.96	1,330,989	3,983,376	2.99	176,198	589,366	3.34	195,402	458,642	2.35
- โรงพยาบาลชุมชน	3,074,604	7,790,320	2.53	2,656,285	6,799,552	2.56	203,357	595,245	2.93	214,962	395,523	1.84
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ	185,071	568,393	3.07	137,619	425,067	3.09	28,141	95,721	3.40	19,311	47,605	2.47
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	283,996	1,150,015	4.05	131,561	535,695	4.07	117,723	494,741	4.20	34,712	119,579	3.44
โรงพยาบาลรัฐ อื่น ๆ	324,860	1,149,791	3.54	165,376	603,203	3.65	109,018	418,855	3.84	50,466	127,733	2.53
โรงพยาบาลเอกชน	207,405	573,444	2.76	159,408	417,681	2.62	686	2,412	3.52	47,311	153,351	3.24
รวม	7,374,836	21,423,245	2.90	5,826,572	16,852,809	2.89	805,969	2,789,132	3.46	742,295	1,781,304	2.40

จากตารางที่ 31 จำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 2.90 โรค เมื่อพิจารณาตามประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล โดยเรียงจากจำนวนโรคเฉลี่ย พบว่า สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว สูงที่สุด 3.46 โรค สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2.89 โรค และสิทธิการรักษาอื่น ๆ 2.40 โรค ตามลำดับ และเมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล โดยเรียงจากจำนวนโรคเฉลี่ยสูงสุด พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนโรคเฉลี่ยที่ป่วยต่อครั้งของการนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 4.05 โรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ 3.54 โรงพยาบาลศูนย์ 3.23 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ 3.07 โรงพยาบาลทั่วไป 2.96 โรงพยาบาลเอกชน 2.76 และโรงพยาบาลชุมชน 2.53 ตามลำดับ

ตารางที่ 32 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยใน จำแนกตามประเภทโรงพยาบาลและสิทธิการประกันสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : บาท

ประเภทโรงพยาบาล	รวม			หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า			สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ			อื่น ๆ		
	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	ค่าใช้จ่ายรวม	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข												
- โรงพยาบาลศูนย์	1,596,311	41,138,205,609.48	25,770.80	1,245,334	32,867,564,469.41	26,392.57	170,846	5,447,611,524.66	31,886.09	180,131	2,823,029,615.41	15,672.09
- โรงพยาบาลทั่วไป	1,702,589	27,678,136,418.69	16,256.50	1,330,989	22,083,749,962.14	16,591.99	176,198	3,741,564,697.51	21,235.00	195,402	1,852,821,759.04	9,482.10
- โรงพยาบาลชุมชน	3,074,604	19,634,646,083.60	6,386.07	2,656,285	16,927,262,257.18	6,372.53	203,357	1,749,095,878.06	8,601.11	214,962	958,287,948.36	4,457.94
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ	185,071	5,978,695,929.08	32,304.88	137,619	4,466,283,067.34	32,453.97	28,141	1,122,268,628.77	39,880.20	19,311	390,144,232.97	20,203.21
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	283,996	16,432,362,932.75	57,861.25	131,561	7,547,010,944.70	57,365.11	117,723	7,564,193,294.93	64,254.17	34,712	1,321,158,693.12	38,060.58
โรงพยาบาลรัฐ อื่น ๆ	324,860	10,902,849,149.89	33,561.69	165,376	5,261,820,696.44	31,817.32	109,018	4,814,657,020.44	44,163.87	50,466	826,371,433.01	16,374.82
โรงพยาบาลเอกชน	207,405	11,156,626,900.98	53,791.50	159,408	7,215,601,573.73	45,264.99	686	41,963,223.56	61,170.88	47,311	3,899,062,103.69	82,413.44
รวม	7,374,836	132,921,523,024	18,023.66	5,826,572	96,369,292,971	16,539.62	805,969	24,481,354,268	30,375.06	742,295	12,070,875,786	16,261.56

จากตารางที่ 32 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยในในการนอนโรงพยาบาล คือ 18,023.66 บาทต่อครั้ง เมื่อจำแนกตามสิทธิการรักษา พบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัวสูงสุด 30,375.06 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 16,539.62 บาทต่อครั้ง และสิทธิการรักษาอื่น ๆ 16,261.56 บาทต่อครั้ง เมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งตามประเภทของโรงพยาบาล โดยเรียงจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุด พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 57,861.25 บาท โรงพยาบาลเอกชน 53,791.50 บาท โรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ 33,561.69 บาท โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่น ๆ 32,304.88 บาท โรงพยาบาลศูนย์ 25,770.80 บาท โรงพยาบาลทั่วไป 16,256.50 บาท และโรงพยาบาลชุมชน 6,386.07 บาท ตามลำดับ

ผู้ป่วยใน

(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย

เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2562

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	21,423,245	32,678.78	4,104,463	35,167.48	4,982,307	29,403.52	7,354,352	33,477.64	3,075,218	32,679.67	1,906,905	34,277.51
		ชาย	10,351,739	32,253.49	2,033,345	35,572.31	2,361,718	28,722.16	3,595,439	32,955.90	1,421,500	30,693.41	939,737	35,935.28
		หญิง	11,071,506	33,086.69	2,071,118	34,778.90	2,620,589	30,045.89	3,758,913	33,992.39	1,653,718	34,604.57	967,168	32,806.99
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)														
001	Cholera (A00) อหิวาตกโรค	รวม	138	0.21	17	0.15	36	0.21	56	0.25	14	0.15	15	0.27
		ชาย	67	0.21	7	0.12	15	0.18	26	0.24	6	0.13	13	0.50
		หญิง	71	0.21	10	0.17	21	0.24	30	0.27	8	0.17	2	0.07
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	รวม	2,797	4.27	639	5.48	188	1.11	513	2.34	1,425	15.14	32	0.58
		ชาย	1,518	4.73	357	6.25	90	1.09	277	2.54	776	16.76	18	0.69
		หญิง	1,279	3.82	282	4.74	98	1.12	236	2.13	649	13.58	14	0.47
003	Shigellosis (A03) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	รวม	90	0.14	21	0.18	26	0.15	23	0.10	14	0.15	6	0.11
		ชาย	42	0.13	10	0.17	10	0.12	8	0.07	9	0.19	5	0.19
		หญิง	48	0.14	11	0.18	16	0.18	15	0.14	5	0.10	1	0.03
004	Amoebiasis (A06) โรคบิดมีตัว	รวม	3,449	5.26	925	7.93	353	2.08	828	3.77	1,305	13.87	38	0.68
		ชาย	1,651	5.14	457	7.99	167	2.03	401	3.68	600	12.96	26	0.99
		หญิง	1,798	5.37	468	7.86	186	2.13	427	3.86	705	14.75	12	0.41

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	440,445	671.85	76,911	658.98	91,537	540.21	180,947	823.69	76,280	810.61	14,770	265.50
		ชาย	205,276	639.59	36,831	644.34	42,262	513.97	83,014	760.91	35,950	776.24	7,219	276.05
		หญิง	235,169	702.79	40,080	673.04	49,275	564.95	97,933	885.62	40,330	843.92	7,551	256.13
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	63,108	96.26	14,678	125.76	13,031	76.90	25,088	114.20	7,220	76.73	3,091	55.56
		ชาย	30,516	95.08	7,373	128.99	6,465	78.62	11,567	106.02	3,576	77.21	1,535	58.70
		หญิง	32,592	97.40	7,305	122.67	6,566	75.28	13,521	122.27	3,644	76.25	1,556	52.78
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	69,073	105.36	12,183	104.39	15,442	91.13	29,044	132.21	7,657	81.37	4,747	85.33
		ชาย	49,131	153.08	8,846	154.76	11,192	136.11	20,102	184.26	5,723	123.57	3,268	124.97
		หญิง	19,942	59.60	3,337	56.04	4,250	48.73	8,942	80.86	1,934	40.47	1,479	50.17
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	16,689	25.46	2,742	23.49	3,408	20.11	7,439	33.86	1,648	17.51	1,452	26.10
		ชาย	10,294	32.07	1,786	31.25	2,092	25.44	4,539	41.60	1,060	22.89	817	31.24
		หญิง	6,395	19.11	956	16.05	1,316	15.09	2,900	26.23	588	12.30	635	21.54
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	13	0.02	1	0.01	2	0.01	8	0.04	1	0.01	1	0.02
		ชาย	6	0.02	0	0.00	2	0.02	3	0.03	0	0.00	1	0.04
		หญิง	7	0.02	1	0.02	0	0.00	5	0.05	1	0.02	0	0.00
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อบรูเซลลา	รวม	36	0.05	5	0.04	5	0.03	21	0.10	1	0.01	4	0.07
		ชาย	21	0.07	2	0.03	4	0.05	12	0.11	0	0.00	3	0.11
		หญิง	15	0.04	3	0.05	1	0.01	9	0.08	1	0.02	1	0.03

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	302	0.46	34	0.29	82	0.48	132	0.60	45	0.48	9	0.16
		ชาย	204	0.64	25	0.44	45	0.55	90	0.82	38	0.82	6	0.23
		หญิง	98	0.29	9	0.15	37	0.42	42	0.38	7	0.15	3	0.10
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	1	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	202	0.31	54	0.46	34	0.20	92	0.42	17	0.18	5	0.09
		ชาย	140	0.44	41	0.72	25	0.30	60	0.55	12	0.26	2	0.08
		หญิง	62	0.19	13	0.22	9	0.10	32	0.29	5	0.10	3	0.10
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	78	0.12	9	0.08	15	0.09	23	0.10	29	0.31	2	0.04
		ชาย	34	0.11	5	0.09	6	0.07	9	0.08	14	0.30	0	0.00
		หญิง	44	0.13	4	0.07	9	0.10	14	0.13	15	0.31	2	0.07
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	85	0.13	11	0.09	18	0.11	25	0.11	27	0.29	4	0.07
		ชาย	42	0.13	9	0.16	9	0.11	9	0.08	13	0.28	2	0.08
		หญิง	43	0.13	2	0.03	9	0.10	16	0.14	14	0.29	2	0.07
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	รวม	96	0.15	9	0.08	20	0.12	26	0.12	31	0.33	10	0.18
		ชาย	57	0.18	2	0.03	16	0.19	15	0.14	16	0.35	8	0.31
		หญิง	39	0.12	7	0.12	4	0.05	11	0.10	15	0.31	2	0.07

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
017	Septicaemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	152,210	232.18	28,330	242.73	40,555	239.34	49,634	225.94	20,008	212.62	13,683	245.96
		ชาย	77,435	241.27	14,910	260.84	19,453	236.58	25,990	238.23	10,299	222.38	6,783	259.38
		หญิง	74,775	223.46	13,420	225.35	21,102	241.94	23,644	213.82	9,709	203.16	6,900	234.05
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	63,149	96.33	8,120	69.57	6,888	40.65	30,412	138.44	16,250	172.69	1,479	26.59
		ชาย	36,511	113.76	4,665	81.61	3,813	46.37	17,881	163.90	9,322	201.28	830	31.74
		หญิง	26,638	79.61	3,455	58.02	3,075	35.26	12,531	113.32	6,928	144.97	649	22.01
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	1,806	2.75	216	1.85	750	4.43	547	2.49	73	0.78	220	3.95
		ชาย	960	2.99	121	2.12	389	4.73	295	2.70	40	0.86	115	4.40
		หญิง	846	2.53	95	1.60	361	4.14	252	2.28	33	0.69	105	3.56
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	386	0.59	65	0.56	108	0.64	140	0.64	30	0.32	43	0.77
		ชาย	209	0.65	31	0.54	54	0.66	73	0.67	25	0.54	26	0.99
		หญิง	177	0.53	34	0.57	54	0.62	67	0.61	5	0.10	17	0.58
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	4,203	6.41	598	5.12	1,099	6.49	1,531	6.97	501	5.32	474	8.52
		ชาย	1,866	5.81	296	5.18	398	4.84	734	6.73	261	5.64	177	6.77
		หญิง	2,337	6.98	302	5.07	701	8.04	797	7.21	240	5.02	297	10.07
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	381	0.58	79	0.68	86	0.51	162	0.74	28	0.30	26	0.47
		ชาย	265	0.83	54	0.94	50	0.61	125	1.15	23	0.50	13	0.50
		หญิง	116	0.35	25	0.42	36	0.41	37	0.33	5	0.10	13	0.44

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	รวม	50	0.08	9	0.08	9	0.05	18	0.08	11	0.12	3	0.05
		ชาย	30	0.09	5	0.09	6	0.07	10	0.09	8	0.17	1	0.04
		หญิง	20	0.06	4	0.07	3	0.03	8	0.07	3	0.06	2	0.07
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดต่ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นส่วนมาก	รวม	2,762	4.21	458	3.92	735	4.34	951	4.33	261	2.77	357	6.42
		ชาย	729	2.27	131	2.29	143	1.74	272	2.49	56	1.21	127	4.86
		หญิง	2,033	6.08	327	5.49	592	6.79	679	6.14	205	4.29	230	7.80
025	Relapsing fevers (A68) โรคไข้กลับซ้ำ	รวม	2	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
		ชาย	1	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
026	Trachoma (A71) โรคตาแดง	รวม	13	0.02	3	0.03	2	0.01	6	0.03	2	0.02	0	0.00
		ชาย	4	0.01	1	0.02	0	0.00	2	0.02	1	0.02	0	0.00
		หญิง	9	0.03	2	0.03	2	0.02	4	0.04	1	0.02	0	0.00
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	13,252	20.21	3,708	31.77	647	3.82	6,605	30.07	2,198	23.36	94	1.69
		ชาย	7,440	23.18	2,078	36.35	358	4.35	3,693	33.85	1,271	27.44	40	1.53
		หญิง	5,812	17.37	1,630	27.37	289	3.31	2,912	26.33	927	19.40	54	1.83
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	272	0.41	59	0.51	71	0.42	65	0.30	36	0.38	41	0.74
		ชาย	192	0.60	45	0.79	48	0.58	46	0.42	22	0.48	31	1.19
		หญิง	80	0.24	14	0.24	23	0.26	19	0.17	14	0.29	10	0.34

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	3	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01	1	0.01	0	0.00
		ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	876	1.34	176	1.51	172	1.02	324	1.47	125	1.33	79	1.42
		ชาย	484	1.51	105	1.84	88	1.07	188	1.72	62	1.34	41	1.57
		หญิง	392	1.17	71	1.19	84	0.96	136	1.23	63	1.32	38	1.29
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	154	0.23	25	0.21	45	0.27	30	0.14	49	0.52	5	0.09
		ชาย	89	0.28	13	0.23	26	0.32	19	0.17	28	0.60	3	0.11
		หญิง	65	0.19	12	0.20	19	0.22	11	0.10	21	0.44	2	0.07
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออก ที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	176,128	268.66	20,269	173.67	36,888	217.70	67,257	306.16	46,177	490.71	5,537	99.53
		ชาย	91,335	284.58	10,388	181.73	19,659	239.08	34,896	319.86	23,176	500.42	3,216	122.98
		หญิง	84,793	253.40	9,881	165.93	17,229	197.54	32,361	292.65	23,001	481.30	2,321	78.73
033	Herpesviral infections (B00) เริม	รวม	6,083	9.28	1,395	11.95	1,255	7.41	2,226	10.13	513	5.45	694	12.47
		ชาย	2,820	8.79	681	11.91	561	6.82	1,031	9.45	247	5.33	300	11.47
		หญิง	3,263	9.75	714	11.99	694	7.96	1,195	10.81	266	5.57	394	13.36
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	11,780	17.97	2,319	19.87	2,385	14.08	4,412	20.08	1,810	19.23	854	15.35
		ชาย	5,690	17.73	1,113	19.47	1,177	14.31	2,116	19.40	901	19.45	383	14.65
		หญิง	6,090	18.20	1,206	20.25	1,208	13.85	2,296	20.76	909	19.02	471	15.98

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
035	Measles (B05) หัด	รวม	4,936	7.53	393	3.37	897	5.29	223	1.02	3,286	34.92	137	2.46
		ชาย	2,689	8.38	188	3.29	577	7.02	99	0.91	1,756	37.92	69	2.64
		หญิง	2,247	6.72	205	3.44	320	3.67	124	1.12	1,530	32.02	68	2.31
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	63	0.10	8	0.07	16	0.09	21	0.10	10	0.11	8	0.14
		ชาย	27	0.08	6	0.10	5	0.06	7	0.06	5	0.11	4	0.15
		หญิง	36	0.11	2	0.03	11	0.13	14	0.13	5	0.10	4	0.14
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	5,950	9.08	1,325	11.35	1,229	7.25	2,611	11.89	530	5.63	255	4.58
		ชาย	3,809	11.87	849	14.85	767	9.33	1,723	15.79	297	6.41	173	6.62
		หญิง	2,141	6.40	476	7.99	462	5.30	888	8.03	233	4.88	82	2.78
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	63,379	96.68	14,036	120.26	12,324	72.73	22,225	101.17	5,479	58.22	9,315	167.44
		ชาย	42,906	133.68	9,656	168.93	7,876	95.78	15,376	140.94	3,793	81.90	6,205	237.28
		หญิง	20,473	61.18	4,380	73.55	4,448	51.00	6,849	61.94	1,686	35.28	3,110	105.49
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	รวม	66,057	100.76	12,158	104.17	18,882	111.43	21,472	97.74	8,081	85.88	5,464	98.22
		ชาย	39,133	121.93	7,032	123.02	10,818	131.56	13,012	119.27	4,812	103.90	3,459	132.27
		หญิง	26,924	80.46	5,126	86.08	8,064	92.46	8,460	76.50	3,269	68.40	2,005	68.01
040	Mumps (B26) คางทูม	รวม	190	0.29	100	0.86	23	0.14	36	0.16	27	0.29	4	0.07
		ชาย	117	0.36	61	1.07	14	0.17	20	0.18	19	0.41	3	0.11
		หญิง	73	0.22	39	0.65	9	0.10	16	0.14	8	0.17	1	0.03

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	รวม	61,690	94.10	9,773	83.74	14,683	86.65	19,665	89.52	14,230	151.22	3,339	60.02
		ชาย	32,521	101.33	5,311	92.91	7,676	93.35	10,430	95.60	7,284	157.28	1,820	69.60
		หญิง	29,169	87.17	4,462	74.93	7,007	80.34	9,235	83.51	6,946	145.35	1,519	51.53
042	Mycoses (B35-B49) โรคติดเชื้อรา	รวม	28,061	42.80	6,009	51.49	6,200	36.59	8,877	40.41	3,607	38.33	3,368	60.54
		ชาย	15,789	49.19	3,395	59.39	3,343	40.66	5,217	47.82	2,017	43.55	1,817	69.48
		หญิง	12,272	36.67	2,614	43.90	2,857	32.76	3,660	33.10	1,590	33.27	1,551	52.61
043	Malaria (B50-B54) มาลาเรีย	รวม	1,396	2.13	211	1.81	426	2.51	278	1.27	469	4.98	12	0.22
		ชาย	936	2.92	129	2.26	270	3.28	251	2.30	277	5.98	9	0.34
		หญิง	460	1.37	82	1.38	156	1.79	27	0.24	192	4.02	3	0.10
044	Leishmaniasis (B55) โรคไลชมาเนีย	รวม	10	0.02	3	0.03	0	0.00	1	0.00	6	0.06	0	0.00
		ชาย	6	0.02	3	0.05	0	0.00	0	0.00	3	0.06	0	0.00
		หญิง	4	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.01	3	0.06	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57) โรคทริปาโนโซม	รวม	17	0.03	6	0.05	2	0.01	7	0.03	1	0.01	1	0.02
		ชาย	10	0.03	2	0.03	2	0.02	4	0.04	1	0.02	1	0.04
		หญิง	7	0.02	4	0.07	0	0.00	3	0.03	0	0.00	0	0.00
046	Schistosomiasis (B65) โรคติดเชื้อซิสโตโซม	รวม	11	0.02	1	0.01	4	0.02	4	0.02	2	0.02	0	0.00
		ชาย	6	0.02	0	0.00	1	0.01	3	0.03	2	0.04	0	0.00
		หญิง	5	0.01	1	0.02	3	0.03	1	0.01	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
047	Other fluke infections (B66)	รวม	461	0.70	92	0.79	19	0.11	344	1.57	0	0.00	6	0.11
	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	ชาย	258	0.80	49	0.86	13	0.16	194	1.78	0	0.00	2	0.08
		หญิง	203	0.61	43	0.72	6	0.07	150	1.36	0	0.00	4	0.14
048	Echinococcosis (B67)	รวม	9	0.01	2	0.02	4	0.02	2	0.01	1	0.01	0	0.00
	โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส	ชาย	5	0.02	1	0.02	2	0.02	1	0.01	1	0.02	0	0.00
		หญิง	4	0.01	1	0.02	2	0.02	1	0.01	0	0.00	0	0.00
049	Dracunculiasis (B72)	รวม	2	0.00	1	0.01	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิคานคูลัส	ชาย	2	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
050	Onchocerciasis (B73)	รวม	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	ชาย	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
051	Filariasis (B74)	รวม	15	0.02	2	0.02	3	0.02	1	0.00	8	0.09	1	0.02
	โรคพยาธิฟิลาเรีย	ชาย	14	0.04	2	0.03	3	0.04	1	0.01	7	0.15	1	0.04
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
052	Hookworm diseases (B76)	รวม	326	0.50	36	0.31	45	0.27	105	0.48	130	1.38	10	0.18
	โรคพยาธิปากขอ	ชาย	185	0.58	24	0.42	25	0.30	50	0.46	80	1.73	6	0.23
		หญิง	141	0.42	12	0.20	20	0.23	55	0.50	50	1.05	4	0.14

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
053	Other helminthiasis (B68-B71, B75, B77-B83) โรคพยาธิตัวติดอื่น ๆ	รวม	6,982	10.65	1,792	15.35	592	3.49	3,763	17.13	647	6.88	188	3.38
		ชาย	4,582	14.28	1,232	21.55	379	4.61	2,461	22.56	392	8.46	118	4.51
		หญิง	2,400	7.17	560	9.40	213	2.44	1,302	11.77	255	5.34	70	2.37
054	Sequelae of tuberculosis (B90) ผลตามหลังวัณโรค	รวม	29,593	45.14	3,565	30.55	6,401	37.78	13,906	63.30	3,675	39.05	2,046	36.78
		ชาย	20,340	63.37	2,620	45.84	4,588	55.80	9,051	82.96	2,671	57.67	1,410	53.92
		หญิง	9,253	27.65	945	15.87	1,813	20.79	4,855	43.90	1,004	21.01	636	21.57
055	Sequelae of poliomyelitis (B91) ผลตามหลังโรคโปลิโอ	รวม	65	0.10	11	0.09	14	0.08	11	0.05	2	0.02	27	0.49
		ชาย	43	0.13	8	0.14	11	0.13	8	0.07	0	0.00	16	0.61
		หญิง	22	0.07	3	0.05	3	0.03	3	0.03	2	0.04	11	0.37
056	Sequelae of leprosy (B92) ผลตามหลังโรคเรื้อน	รวม	34	0.05	1	0.01	1	0.01	28	0.13	4	0.04	0	0.00
		ชาย	21	0.07	1	0.02	1	0.01	19	0.17	0	0.00	0	0.00
		หญิง	13	0.04	0	0.00	0	0.00	9	0.08	4	0.08	0	0.00
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	รวม	9,560	14.58	1,727	14.80	1,977	11.67	2,784	12.67	2,321	24.66	751	13.50
		ชาย	5,567	17.35	1,059	18.53	1,122	13.65	1,682	15.42	1,361	29.39	343	13.12
		หญิง	3,993	11.93	668	11.22	855	9.80	1,102	9.97	960	20.09	408	13.84
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00 - D48)														
058	Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14) เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย	รวม	27,821	42.44	4,608	39.48	7,252	42.80	7,947	36.18	3,269	34.74	4,745	85.29
		ชาย	20,674	64.42	3,436	60.11	5,671	68.97	5,348	49.02	2,483	53.61	3,736	142.86
		หญิง	7,147	21.36	1,172	19.68	1,581	18.13	2,599	23.50	786	16.45	1,009	34.23

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	10,929	16.67	1,740	14.91	3,892	22.97	2,062	9.39	1,697	18.03	1,538	27.65
		ชาย	9,665	30.11	1,493	26.12	3,386	41.18	1,857	17.02	1,523	32.89	1,406	53.77
		หญิง	1,264	3.78	247	4.15	506	5.80	205	1.85	174	3.64	132	4.48
060	Malignant neoplasm of stomach (C16) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	รวม	12,606	19.23	3,201	27.43	2,616	15.44	4,117	18.74	850	9.03	1,822	32.75
		ชาย	7,169	22.34	1,831	32.03	1,408	17.12	2,552	23.39	565	12.20	813	31.09
		หญิง	5,437	16.25	1,370	23.01	1,208	13.85	1,565	14.15	285	5.96	1,009	34.23
061	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	รวม	72,684	110.87	13,304	113.99	16,943	99.99	22,435	102.13	8,050	85.55	11,952	214.84
		ชาย	37,750	117.62	7,164	125.33	8,579	104.33	11,344	103.98	4,277	92.35	6,386	244.20
		หญิง	34,934	104.40	6,140	103.10	8,364	95.90	11,091	100.30	3,773	78.95	5,566	188.80
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21) เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัมและ ซิกมอยด์ เร็กตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก	รวม	50,211	76.59	9,964	85.37	10,298	60.77	16,290	74.15	5,016	53.30	8,643	155.36
		ชาย	29,797	92.84	5,991	104.81	6,065	73.76	9,475	86.85	3,080	66.50	5,186	198.31
		หญิง	20,414	61.01	3,973	66.72	4,233	48.53	6,815	61.63	1,936	40.51	3,457	117.26
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22) เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	รวม	57,695	88.01	12,280	105.22	10,096	59.58	23,074	105.03	3,745	39.80	8,500	152.79
		ชาย	39,372	122.67	8,675	151.76	6,727	81.81	15,511	142.17	2,633	56.85	5,826	222.78
		หญิง	18,323	54.76	3,605	60.54	3,369	38.63	7,563	68.39	1,112	23.27	2,674	90.70
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25) เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	รวม	7,525	11.48	1,559	13.36	1,544	9.11	1,757	8.00	836	8.88	1,829	32.88
		ชาย	4,048	12.61	849	14.85	770	9.36	957	8.77	495	10.69	977	37.36
		หญิง	3,477	10.39	710	11.92	774	8.87	800	7.23	341	7.14	852	28.90

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	รวม	8,576	13.08	1,601	13.72	1,470	8.68	3,585	16.32	735	7.81	1,185	21.30
		ชาย	4,434	13.82	918	16.06	648	7.88	2,007	18.40	330	7.13	531	20.31
		หญิง	4,142	12.38	683	11.47	822	9.42	1,578	14.27	405	8.47	654	22.18
066	Malignant neoplasm of larynx (C32) เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	รวม	6,094	9.30	1,047	8.97	1,789	10.56	1,466	6.67	761	8.09	1,031	18.53
		ชาย	5,728	17.85	970	16.97	1,702	20.70	1,369	12.55	726	15.68	961	36.75
		หญิง	366	1.09	77	1.29	87	1.00	97	0.88	35	0.73	70	2.37
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	รวม	45,681	69.68	11,872	101.72	10,115	59.69	12,913	58.78	5,139	54.61	5,642	101.42
		ชาย	27,971	87.15	6,735	117.83	6,269	76.24	8,187	75.04	3,382	73.03	3,398	129.94
		หญิง	17,710	52.93	5,137	86.26	3,846	44.10	4,726	42.74	1,757	36.77	2,244	76.12
068	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	รวม	2,625	4.00	517	4.43	438	2.58	761	3.46	226	2.40	683	12.28
		ชาย	1,684	5.25	312	5.46	291	3.54	494	4.53	125	2.70	462	17.67
		หญิง	941	2.81	205	3.44	147	1.69	267	2.41	101	2.11	221	7.50
069	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage (C40-C41) เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	รวม	3,398	5.18	556	4.76	388	2.29	1,053	4.79	373	3.96	1,028	18.48
		ชาย	1,994	6.21	364	6.37	221	2.69	618	5.66	230	4.97	561	21.45
		หญิง	1,404	4.20	192	3.22	167	1.91	435	3.93	143	2.99	467	15.84
070	Malignant melanoma of skin (C43) เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	รวม	1,003	1.53	148	1.27	161	0.95	428	1.95	96	1.02	170	3.06
		ชาย	591	1.84	89	1.56	68	0.83	302	2.77	51	1.10	81	3.10
		หญิง	412	1.23	59	0.99	93	1.07	126	1.14	45	0.94	89	3.02

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
071	Other malignant neoplasms of skin (C44) เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	รวม	3,078	4.70	535	4.58	707	4.17	961	4.37	335	3.56	540	9.71
		ชาย	1,516	4.72	265	4.64	334	4.06	473	4.34	167	3.61	277	10.59
		หญิง	1,562	4.67	270	4.53	373	4.28	488	4.41	168	3.52	263	8.92
072	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue (C45-C49) เนื้องอกร้ายที่เมโสทีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	รวม	6,041	9.21	1,151	9.86	1,045	6.17	1,453	6.61	698	7.42	1,694	30.45
		ชาย	2,447	7.62	442	7.73	431	5.24	658	6.03	312	6.74	604	23.10
		หญิง	3,594	10.74	709	11.91	614	7.04	795	7.19	386	8.08	1,090	36.97
073	Malignant neoplasm of breast (C50) เนื้องอกร้ายที่เต้านม	รวม	50,635	77.24	11,773	100.87	10,965	64.71	14,553	66.25	5,590	59.40	7,754	139.38
		ชาย	374	1.17	125	2.19	87	1.06	99	0.91	25	0.54	38	1.45
		หญิง	50,261	150.20	11,648	195.60	10,878	124.72	14,454	130.71	5,565	116.45	7,716	261.73
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53) เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	รวม	24,646	37.59	4,932	42.26	6,375	37.62	6,900	31.41	2,394	25.44	4,045	72.71
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,646	73.65	4,932	82.82	6,375	73.09	6,900	62.40	2,394	50.10	4,045	137.21
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุส่วนของมดลูก	รวม	11,327	17.28	1,916	16.42	2,308	13.62	3,216	14.64	956	10.16	2,931	52.69
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	11,327	33.85	1,916	32.17	2,308	26.46	3,216	29.08	956	20.00	2,931	99.42
076	Other malignant neoplasms of female genital organs (C51-C52, C56-C58) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	รวม	20,759	31.67	3,295	28.23	4,165	24.58	6,410	29.18	1,808	19.21	5,081	91.33
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	20,759	62.04	3,295	55.33	4,165	47.75	6,410	57.97	1,808	37.83	5,081	172.35

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
077	Malignant neoplasm of prostate (C61) เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	รวม	12,469	19.02	2,227	19.08	2,837	16.74	2,847	12.96	1,683	17.88	2,875	51.68
		ชาย	12,469	38.85	2,227	38.96	2,837	34.50	2,847	26.10	1,683	36.34	2,875	109.94
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	2,710	4.13	480	4.11	502	2.96	979	4.46	370	3.93	379	6.81
		ชาย	2,710	8.44	480	8.40	502	6.11	979	8.97	370	7.99	379	14.49
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	รวม	12,888	19.66	2,495	21.38	2,788	16.45	3,288	14.97	1,812	19.26	2,505	45.03
		ชาย	10,277	32.02	1,939	33.92	2,177	26.48	2,724	24.97	1,529	33.01	1,908	72.96
		หญิง	2,611	7.80	556	9.34	611	7.01	564	5.10	283	5.92	597	20.25
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	รวม	4,267	6.51	709	6.07	775	4.57	1,082	4.93	599	6.37	1,102	19.81
		ชาย	2,758	8.59	496	8.68	450	5.47	710	6.51	407	8.79	695	26.58
		หญิง	1,509	4.51	213	3.58	325	3.73	372	3.36	192	4.02	407	13.81
081	Malignant neoplasm of the eye and adnexa (C69) เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	รวม	804	1.23	95	0.81	31	0.18	196	0.89	104	1.11	378	6.79
		ชาย	506	1.58	61	1.07	19	0.23	124	1.14	86	1.86	216	8.26
		หญิง	298	0.89	34	0.57	12	0.14	72	0.65	18	0.38	162	5.50
082	Malignant neoplasm of brain (C71) เนื้องอกร้ายของสมอง	รวม	4,941	7.54	819	7.02	827	4.88	1,533	6.98	632	6.72	1,130	20.31
		ชาย	2,680	8.35	441	7.72	444	5.40	835	7.65	323	6.97	637	24.36
		หญิง	2,261	6.76	378	6.35	383	4.39	698	6.31	309	6.47	493	16.72

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72) เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	444	0.68	67	0.57	95	0.56	159	0.72	37	0.39	86	1.55
		ชาย	202	0.63	29	0.51	38	0.46	60	0.55	22	0.48	53	2.03
		หญิง	242	0.72	38	0.64	57	0.65	99	0.90	15	0.31	33	1.12
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีระยะลุกลามและเกิดขึ้นหลายแห่ง	รวม	184,724	281.78	36,321	311.20	30,664	180.97	58,933	268.27	16,654	176.98	42,152	757.70
		ชาย	89,273	278.15	18,089	316.46	14,999	182.41	30,025	275.21	8,357	180.45	17,803	680.78
		หญิง	95,451	285.25	18,232	306.16	15,665	179.60	28,908	261.42	8,297	173.62	24,349	825.93
085	Hodgkin's disease (C81) โรคฮอดจกิน	รวม	2,331	3.56	319	2.73	457	2.70	803	3.66	249	2.65	503	9.04
		ชาย	1,346	4.19	197	3.45	276	3.36	458	4.20	151	3.26	264	10.10
		หญิง	985	2.94	122	2.05	181	2.08	345	3.12	98	2.05	239	8.11
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85) เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดจกิน	รวม	25,300	38.59	4,902	42.00	4,811	28.39	8,353	38.02	2,809	29.85	4,425	79.54
		ชาย	14,450	45.02	2,882	50.42	2,638	32.08	4,918	45.08	1,650	35.63	2,362	90.32
		หญิง	10,850	32.42	2,020	33.92	2,173	24.91	3,435	31.06	1,159	24.25	2,063	69.98
087	Leukaemia (C91-C95) ลิวคีเมีย	รวม	24,942	38.05	4,240	36.33	5,372	31.70	7,916	36.03	3,750	39.85	3,664	65.86
		ชาย	13,878	43.24	2,434	42.58	2,993	36.40	4,340	39.78	2,070	44.70	2,041	78.05
		หญิง	11,064	33.06	1,806	30.33	2,379	27.28	3,576	32.34	1,680	35.15	1,623	55.05
088	Other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อ	รวม	7,682	11.72	1,412	12.10	1,649	9.73	2,736	12.45	781	8.30	1,104	19.84
		ชาย	4,029	12.55	772	13.51	772	9.39	1,474	13.51	461	9.95	550	21.03
		หญิง	3,653	10.92	640	10.75	877	10.06	1,262	11.41	320	6.70	554	18.79

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06) มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	รวม	1,096	1.67	190	1.63	380	2.24	267	1.22	123	1.31	136	2.44
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,096	3.28	190	3.19	380	4.36	267	2.41	123	2.57	136	4.61
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23) เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	รวม	937	1.43	153	1.31	157	0.93	310	1.41	132	1.40	185	3.33
		ชาย	400	1.25	56	0.98	82	1.00	114	1.04	55	1.19	93	3.56
		หญิง	537	1.60	97	1.63	75	0.86	196	1.77	77	1.61	92	3.12
091	Benign neoplasm of breast (D24) เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	รวม	1,310	2.00	268	2.30	217	1.28	390	1.78	225	2.39	210	3.77
		ชาย	10	0.03	4	0.07	2	0.02	1	0.01	3	0.06	0	0.00
		หญิง	1,300	3.88	264	4.43	215	2.47	389	3.52	222	4.65	210	7.12
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	24,465	37.32	3,508	30.06	4,542	26.81	9,536	43.41	3,051	32.42	3,828	68.81
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,465	73.11	3,508	58.91	4,542	52.08	9,536	86.24	3,051	63.84	3,828	129.85
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	3,250	4.96	567	4.86	525	3.10	1,054	4.80	491	5.22	613	11.02
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,250	9.71	567	9.52	525	6.02	1,054	9.53	491	10.27	613	20.79
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	240	0.37	37	0.32	55	0.32	60	0.27	32	0.34	56	1.01
		ชาย	131	0.41	23	0.40	34	0.41	35	0.32	22	0.48	17	0.65
		หญิง	109	0.33	14	0.24	21	0.24	25	0.23	10	0.21	39	1.32

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	1,809	2.76	259	2.22	411	2.43	461	2.10	264	2.81	414	7.44
		ชาย	728	2.27	111	1.94	168	2.04	196	1.80	104	2.25	149	5.70
		หญิง	1,081	3.23	148	2.49	243	2.79	265	2.40	160	3.35	265	8.99
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายจำกัเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	65,307	99.62	12,428	106.48	13,435	79.29	21,813	99.29	7,196	76.47	10,435	187.57
		ชาย	28,845	89.87	5,676	99.30	5,890	71.63	9,867	90.44	3,151	68.04	4,261	162.94
		หญิง	36,462	108.97	6,752	113.38	7,545	86.51	11,946	108.03	4,045	84.64	6,174	209.43
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50 - D89)														
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	115,739	176.55	21,483	184.07	24,636	145.39	39,076	177.88	22,676	240.97	7,868	141.43
		ชาย	50,672	157.88	10,401	181.96	10,243	124.57	17,529	160.67	9,129	197.12	3,370	128.87
		หญิง	65,067	194.45	11,082	186.09	14,393	165.02	21,547	194.85	13,547	283.48	4,498	152.58
098	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	รวม	838,983	1,279.78	179,104	1,534.58	194,138	1,145.72	319,138	1,452.74	87,708	932.05	58,895	1,058.67
		ชาย	386,279	1,203.55	86,448	1,512.36	89,311	1,086.16	145,051	1,329.54	38,583	833.09	26,886	1,028.11
		หญิง	452,704	1,352.89	92,656	1,555.91	104,827	1,201.87	174,087	1,574.29	49,125	1,027.96	32,009	1,085.77
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77) ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	รวม	181,948	277.54	38,392	328.95	35,779	211.15	70,943	322.94	19,505	207.28	17,329	311.50
		ชาย	103,988	324.00	22,317	390.42	19,431	236.31	41,976	384.75	10,938	236.18	9,326	356.62
		หญิง	77,960	232.98	16,075	269.94	16,348	187.44	28,967	261.95	8,567	179.27	8,003	271.47

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	รวม	2,320	3.54	339	2.90	495	2.92	619	2.82	213	2.26	654	11.76
		ชาย	1,530	4.77	197	3.45	365	4.44	448	4.11	131	2.83	389	14.88
		หญิง	790	2.36	142	2.38	130	1.49	171	1.55	82	1.72	265	8.99
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00 - E90)														
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders (E00-E02) การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับ ต่อมไทรอยด์	รวม	1,509	2.30	375	3.21	287	1.69	466	2.12	156	1.66	225	4.04
		ชาย	575	1.79	140	2.45	89	1.08	198	1.81	56	1.21	92	3.52
		หญิง	934	2.79	235	3.95	198	2.27	268	2.42	100	2.09	133	4.51
102	Thyrotoxicosis (E05) โรคพิษไทรอยด์	รวม	37,574	57.31	7,636	65.43	8,064	47.59	14,644	66.66	4,390	46.65	2,840	51.05
		ชาย	10,663	33.22	2,082	36.42	2,374	28.87	4,104	37.62	1,292	27.90	811	31.01
		หญิง	26,911	80.42	5,554	93.26	5,690	65.24	10,540	95.31	3,098	64.83	2,029	68.83
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อื่น ๆ	รวม	45,881	69.99	8,977	76.92	10,525	62.11	13,798	62.81	6,068	64.48	6,513	117.07
		ชาย	11,233	35.00	2,306	40.34	2,595	31.56	3,096	28.38	1,407	30.38	1,829	69.94
		หญิง	34,648	103.54	6,671	112.02	7,930	90.92	10,702	96.78	4,661	97.53	4,684	158.88
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	รวม	1,002,310	1,528.91	168,336	1,442.32	239,720	1,414.73	390,581	1,777.96	118,160	1,255.66	85,513	1,537.14
		ชาย	412,552	1,285.41	70,782	1,238.29	97,026	1,179.99	156,969	1,438.78	47,309	1,021.51	40,466	1,547.41
		หญิง	589,758	1,762.47	97,554	1,638.16	142,694	1,636.03	233,612	2,112.59	70,851	1,482.58	45,047	1,528.02
105	Malnutrition (E40-E46) ทุพโภชนาการ	รวม	41,166	62.79	7,306	62.60	6,021	35.53	10,122	46.08	3,494	37.13	14,223	255.67
		ชาย	22,761	70.92	3,992	69.84	3,436	41.79	6,032	55.29	2,092	45.17	7,209	275.67
		หญิง	18,405	55.00	3,314	55.65	2,585	29.64	4,090	36.99	1,402	29.34	7,014	237.92

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
106	Vitamin A deficiency (E50) การขาดวิตามินเอ	รวม	121	0.18	8	0.07	21	0.12	28	0.13	10	0.11	54	0.97
		ชาย	59	0.18	4	0.07	7	0.09	12	0.11	6	0.13	30	1.15
		หญิง	62	0.19	4	0.07	14	0.16	16	0.14	4	0.08	24	0.81
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) การขาดวิตามินอื่น ๆ	รวม	4,827	7.36	473	4.05	572	3.38	1,237	5.63	202	2.15	2,343	42.12
		ชาย	2,401	7.48	253	4.43	277	3.37	685	6.28	132	2.85	1,054	40.30
		หญิง	2,426	7.25	220	3.69	295	3.38	552	4.99	70	1.46	1,289	43.72
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการ และภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	61	0.09	14	0.12	15	0.09	13	0.06	4	0.04	15	0.27
		ชาย	29	0.09	7	0.12	6	0.07	5	0.05	3	0.06	8	0.31
		หญิง	32	0.10	7	0.12	9	0.10	8	0.07	1	0.02	7	0.24
109	Obesity (E66) โรคอ้วน	รวม	19,689	30.03	2,155	18.46	5,075	29.95	5,315	24.19	3,718	39.51	3,426	61.58
		ชาย	6,712	20.91	824	14.42	1,753	21.32	1,785	16.36	911	19.67	1,439	55.03
		หญิง	12,977	38.78	1,331	22.35	3,322	38.09	3,530	31.92	2,807	58.74	1,987	67.40
110	Volume depletion (E86) การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	รวม	59,234	90.35	11,468	98.26	15,787	93.17	15,131	68.88	12,236	130.03	4,612	82.90
		ชาย	30,874	96.20	6,118	107.03	8,372	101.82	7,794	71.44	6,119	132.12	2,471	94.49
		หญิง	28,360	84.75	5,350	89.84	7,415	85.02	7,337	66.35	6,117	128.00	2,141	72.62
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตาบอลิซึมอื่น ๆ	รวม	2,381,615	3,632.89	493,658	4,229.72	604,260	3,566.09	776,034	3,532.57	302,294	3,212.41	205,369	3,691.60
		ชาย	1,148,564	3,578.64	240,194	4,202.07	281,237	3,420.28	386,423	3,541.96	141,120	3,047.10	99,590	3,808.29
		หญิง	1,233,051	3,684.92	253,464	4,256.25	323,023	3,703.56	389,611	3,523.31	161,174	3,372.62	105,779	3,588.09

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F00 - F99)														
112	Dementia (F00-F03) สมองเสื่อม	รวม	14,274	21.77	2,571	22.03	3,583	21.15	3,697	16.83	1,050	11.16	3,373	60.63
		ชาย	6,129	19.10	1,137	19.89	1,484	18.05	1,586	14.54	462	9.98	1,460	55.83
		หญิง	8,145	24.34	1,434	24.08	2,099	24.07	2,111	19.09	588	12.30	1,913	64.89
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาท ที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	รวม	125,318	191.16	29,494	252.71	20,979	123.81	64,135	291.95	6,952	73.88	3,758	67.55
		ชาย	111,883	348.60	26,348	460.94	18,071	219.77	57,569	527.68	6,534	141.08	3,361	128.52
		หญิง	13,435	40.15	3,146	52.83	2,908	33.34	6,566	59.38	418	8.75	397	13.47
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท ที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	รวม	46,441	70.84	7,600	65.12	8,591	50.70	15,968	72.69	9,784	103.97	4,498	80.85
		ชาย	40,327	125.65	6,449	112.82	7,115	86.53	14,125	129.47	8,971	193.70	3,667	140.23
		หญิง	6,114	18.27	1,151	19.33	1,476	16.92	1,843	16.67	813	17.01	831	28.19
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	รวม	69,350	105.79	10,887	93.28	11,812	69.71	33,222	151.23	7,557	80.31	5,872	105.55
		ชาย	45,697	142.38	6,713	117.44	7,146	86.91	23,083	211.58	5,224	112.80	3,531	135.02
		หญิง	23,653	70.69	4,174	70.09	4,666	53.50	10,139	91.69	2,333	48.82	2,341	79.41
116	Mood [affective] disorders (F30-F39) ความผิดปกติทางอารมณ์	รวม	50,952	77.72	13,088	112.14	9,358	55.23	17,407	79.24	6,900	73.32	4,199	75.48
		ชาย	15,681	48.86	4,401	76.99	2,875	34.96	4,796	43.96	2,117	45.71	1,492	57.05
		หญิง	35,271	105.41	8,687	145.87	6,483	74.33	12,611	114.04	4,783	100.09	2,707	91.82
117	Neurotic, stress-related, and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ และความเครียด	รวม	27,069	41.29	6,144	52.64	5,112	30.17	9,664	43.99	4,317	45.88	1,832	32.93
		ชาย	8,423	26.24	1,985	34.73	1,853	22.54	2,524	23.14	1,346	29.06	715	27.34
		หญิง	18,646	55.72	4,159	69.84	3,259	37.37	7,140	64.57	2,971	62.17	1,117	37.89

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	6,876	10.49	1,069	9.16	1,188	7.01	1,854	8.44	734	7.80	2,031	36.51
		ชาย	4,001	12.47	594	10.39	715	8.70	1,019	9.34	422	9.11	1,251	47.84
		หญิง	2,875	8.59	475	7.98	473	5.42	835	7.55	312	6.53	780	26.46
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99) ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	61,402	93.66	12,880	110.36	13,456	79.41	20,611	93.82	5,094	54.13	9,361	168.27
		ชาย	36,230	112.88	7,923	138.61	8,208	99.82	11,258	103.19	3,068	66.25	5,773	220.76
		หญิง	25,172	75.23	4,957	83.24	5,248	60.17	9,353	84.58	2,026	42.39	3,588	121.71
โรกระบบประสาท (G00 - G99)														
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09) การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	26,962	41.13	5,299	45.40	5,294	31.24	12,104	55.10	2,261	24.03	2,004	36.02
		ชาย	16,255	50.65	3,183	55.68	3,183	38.71	7,496	68.71	1,344	29.02	1,049	40.11
		หญิง	10,707	32.00	2,116	35.53	2,111	24.20	4,608	41.67	917	19.19	955	32.39
121	Parkinson's disease (G20) โรคพาร์กินสัน	รวม	20,227	30.85	3,650	31.27	5,001	29.51	5,938	27.03	2,222	23.61	3,416	61.40
		ชาย	10,027	31.24	1,827	31.96	2,432	29.58	2,893	26.52	1,095	23.64	1,780	68.07
		หญิง	10,200	30.48	1,823	30.61	2,569	29.45	3,045	27.54	1,127	23.58	1,636	55.49
122	Alzheimer's disease (G30) โรคอัลไซเมอร์	รวม	9,171	13.99	1,447	12.40	2,521	14.88	2,131	9.70	882	9.37	2,190	39.37
		ชาย	3,331	10.38	567	9.92	880	10.70	773	7.09	345	7.45	766	29.29
		หญิง	5,840	17.45	880	14.78	1,641	18.81	1,358	12.28	537	11.24	1,424	48.30
123	Multiple sclerosis (G35) โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	รวม	381	0.58	88	0.75	84	0.50	94	0.43	37	0.39	78	1.40
		ชาย	114	0.36	29	0.51	27	0.33	26	0.24	9	0.19	23	0.88
		หญิง	267	0.80	59	0.99	57	0.65	68	0.61	28	0.59	55	1.87

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
124	Epilepsy (G40-G41) ลมบ้าหมู	รวม	92,714	141.42	18,783	160.93	20,911	123.41	32,709	148.89	12,740	135.39	7,571	136.09
		ชาย	57,758	179.96	11,874	207.73	12,961	157.63	20,878	191.37	7,699	166.24	4,346	166.19
		หญิง	34,956	104.46	6,909	116.02	7,950	91.15	11,831	106.99	5,041	105.48	3,225	109.39
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44) โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	รวม	14,504	22.12	2,348	20.12	2,632	15.53	6,532	29.73	2,367	25.15	625	11.23
		ชาย	4,464	13.91	667	11.67	740	9.00	2,205	20.21	715	15.44	137	5.24
		หญิง	10,040	30.00	1,681	28.23	1,892	21.69	4,327	39.13	1,652	34.57	488	16.55
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45) โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว และกลุ่มอาการต่อเนื่อง	รวม	14,404	21.97	2,842	24.35	3,415	20.15	4,713	21.45	2,284	24.27	1,150	20.67
		ชาย	7,687	23.95	1,533	26.82	1,840	22.38	2,411	22.10	1,285	27.75	618	23.63
		หญิง	6,717	20.07	1,309	21.98	1,575	18.06	2,302	20.82	999	20.90	532	18.05
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59) ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท และปมประสาท	รวม	12,878	19.64	2,808	24.06	2,404	14.19	4,053	18.45	1,552	16.49	2,061	37.05
		ชาย	5,524	17.21	1,112	19.45	1,066	12.96	1,781	16.32	666	14.38	899	34.38
		หญิง	7,354	21.98	1,696	28.48	1,338	15.34	2,272	20.55	886	18.54	1,162	39.42
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83) สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	รวม	53,719	81.94	9,807	84.03	11,643	68.71	18,454	84.00	8,580	91.18	5,235	94.10
		ชาย	32,578	101.51	6,028	105.46	6,966	84.72	11,491	105.33	5,182	111.89	2,911	111.32
		หญิง	21,141	63.18	3,779	63.46	4,677	53.62	6,963	62.97	3,398	71.10	2,324	78.83
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	รวม	115,350	175.95	22,306	191.12	21,646	127.75	43,398	197.55	11,727	124.62	16,273	292.51
		ชาย	63,980	199.35	12,527	219.15	11,540	140.34	24,845	227.73	6,374	137.63	8,694	332.46
		หญิง	51,370	153.52	9,779	164.21	10,106	115.87	18,553	167.78	5,353	112.01	7,579	257.08

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00 - H59)														
130	Inflammation of eyelid (H00-H01) การอักเสบของหนังตา	รวม	2,966	4.52	487	4.17	625	3.69	1,117	5.08	463	4.92	274	4.93
		ชาย	1,425	4.44	248	4.34	295	3.59	554	5.08	210	4.53	118	4.51
		หญิง	1,541	4.61	239	4.01	330	3.78	563	5.09	253	5.29	156	5.29
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติ ของเยื่อตาอื่น ๆ	รวม	23,311	35.56	4,587	39.30	6,362	37.55	8,565	38.99	2,677	28.45	1,120	20.13
		ชาย	9,581	29.85	1,949	34.10	2,534	30.82	3,395	31.12	1,108	23.92	595	22.75
		หญิง	13,730	41.03	2,638	44.30	3,828	43.89	5,170	46.75	1,569	32.83	525	17.81
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติ ของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	รวม	11,029	16.82	1,991	17.06	2,131	12.58	3,980	18.12	1,227	13.04	1,700	30.56
		ชาย	6,527	20.34	1,252	21.90	1,193	14.51	2,366	21.69	818	17.66	898	34.34
		หญิง	4,502	13.45	739	12.41	938	10.75	1,614	14.60	409	8.56	802	27.20
133	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	203,114	309.83	40,817	349.72	58,634	346.03	54,209	246.76	25,057	266.28	24,397	438.55
		ชาย	89,589	279.14	18,305	320.24	24,964	303.60	24,520	224.75	10,877	234.86	10,923	417.69
		หญิง	113,525	339.26	22,512	378.03	33,670	386.04	29,689	268.48	14,180	296.72	13,474	457.05
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีก ของจอประสาทตา	รวม	8,177	12.47	1,509	12.93	1,888	11.14	1,573	7.16	817	8.68	2,390	42.96
		ชาย	4,846	15.10	958	16.76	1,163	14.14	890	8.16	484	10.45	1,351	51.66
		หญิง	3,331	9.95	551	9.25	725	8.31	683	6.18	333	6.97	1,039	35.24
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	23,494	35.84	4,890	41.90	5,519	32.57	6,115	27.84	2,839	30.17	4,131	74.26
		ชาย	11,450	35.68	2,325	40.67	2,716	33.03	2,834	25.98	1,443	31.16	2,132	81.53
		หญิง	12,044	35.99	2,565	43.07	2,803	32.14	3,281	29.67	1,396	29.21	1,999	67.81

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
136	Strabismus (H49-H50) ตาเหล่	รวม	3,607	5.50	403	3.45	725	4.28	792	3.61	480	5.10	1,207	21.70
		ชาย	1,775	5.53	186	3.25	354	4.31	365	3.35	252	5.44	618	23.63
		หญิง	1,832	5.47	217	3.64	371	4.25	427	3.86	228	4.77	589	19.98
137	Disorders of refraction and accommodation (H52) ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	รวม	1,296	1.98	144	1.23	278	1.64	228	1.04	250	2.66	396	7.12
		ชาย	593	1.85	70	1.22	121	1.47	94	0.86	113	2.44	195	7.46
		หญิง	703	2.10	74	1.24	157	1.80	134	1.21	137	2.87	201	6.82
138	Blindness and low vision (H54) ตาบอดและสายตาลือกลาง	รวม	199,056	303.64	39,558	338.94	56,298	332.25	54,777	249.35	24,383	259.11	24,040	432.13
		ชาย	87,107	271.40	17,624	308.32	23,642	287.52	24,685	226.26	10,490	226.50	10,666	407.86
		หญิง	111,949	334.55	21,934	368.32	32,656	374.41	30,092	272.13	13,893	290.72	13,374	453.66
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	รวม	51,483	78.53	7,881	67.53	11,411	67.34	14,660	66.73	6,355	67.53	11,176	200.89
		ชาย	24,581	76.59	3,808	66.62	5,331	64.83	6,838	62.68	3,136	67.71	5,468	209.09
		หญิง	26,902	80.40	4,073	68.40	6,080	69.71	7,822	70.74	3,219	67.36	5,708	193.62
โรคของหูและปุ่มกกหู (H60 - H95)														
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75) หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	9,855	15.03	1,836	15.73	1,958	11.56	2,596	11.82	2,029	21.56	1,436	25.81
		ชาย	5,096	15.88	962	16.83	1,033	12.56	1,290	11.82	1,040	22.46	771	29.48
		หญิง	4,759	14.22	874	14.68	925	10.61	1,306	11.81	989	20.70	665	22.56
141	Hearing loss (H90-H91) การสูญเสียการได้ยิน	รวม	3,810	5.81	571	4.89	732	4.32	1,177	5.36	366	3.89	964	17.33
		ชาย	2,035	6.34	334	5.84	383	4.66	644	5.90	176	3.80	498	19.04
		หญิง	1,775	5.30	237	3.98	349	4.00	533	4.82	190	3.98	466	15.81

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95) โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	27,163	41.43	4,344	37.22	6,177	36.45	9,521	43.34	5,456	57.98	1,665	29.93
		ชาย	8,621	26.86	1,472	25.75	1,882	22.89	2,976	27.28	1,674	36.15	617	23.59
		หญิง	18,542	55.41	2,872	48.23	4,295	49.24	6,545	59.19	3,782	79.14	1,048	35.55
โรกระบบไหลเวียนโลหิต (I00 - I99)														
143	Acute rheumatic fever (I00-I02) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	รวม	480	0.73	49	0.42	92	0.54	199	0.91	108	1.15	32	0.58
		ชาย	246	0.77	24	0.42	50	0.61	101	0.93	56	1.21	15	0.57
		หญิง	234	0.70	25	0.42	42	0.48	98	0.89	52	1.09	17	0.58
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09) โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	รวม	24,026	36.65	5,283	45.27	4,661	27.51	8,895	40.49	2,339	24.86	2,848	51.19
		ชาย	9,480	29.54	2,027	35.46	1,854	22.55	3,570	32.72	824	17.79	1,205	46.08
		หญิง	14,546	43.47	3,256	54.68	2,807	32.18	5,325	48.15	1,515	31.70	1,643	55.73
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	รวม	1,556,403	2,374.12	303,762	2,602.67	399,577	2,358.14	502,720	2,288.42	205,099	2,179.54	145,245	2,610.85
		ชาย	687,626	2,142.47	137,071	2,397.99	173,194	2,106.31	216,520	1,984.63	91,389	1,973.30	69,452	2,655.82
		หญิง	868,777	2,596.30	166,691	2,799.13	226,383	2,595.55	286,200	2,588.15	113,710	2,379.42	75,793	2,570.95
146	Other hypertensive diseases (I11-I15) โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	รวม	9,649	14.72	1,507	12.91	1,763	10.40	2,863	13.03	1,790	19.02	1,726	31.03
		ชาย	4,516	14.07	754	13.19	820	9.97	1,358	12.45	807	17.42	777	29.71
		หญิง	5,133	15.34	753	12.64	943	10.81	1,505	13.61	983	20.57	949	32.19
147	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	รวม	92,659	141.34	15,941	136.58	27,838	164.29	23,377	106.41	16,613	176.54	8,890	159.80
		ชาย	54,014	168.29	8,579	150.09	15,750	191.54	13,520	123.92	10,691	230.84	5,474	209.32
		หญิง	38,645	115.49	7,362	123.63	12,088	138.59	9,857	89.14	5,922	123.92	3,416	115.87

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	รวม	258,263	393.95	40,652	348.31	76,789	453.18	57,915	263.63	44,155	469.23	38,752	696.59
		ชาย	151,140	470.92	21,654	378.83	42,774	520.20	33,782	309.65	28,660	618.83	24,270	928.08
		หญิง	107,123	320.13	18,998	319.02	34,015	389.99	24,133	218.24	15,495	324.24	14,482	491.24
149	Pulmonary embolism (I26) ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	รวม	8,556	13.05	1,379	11.82	2,059	12.15	2,154	9.81	983	10.45	1,981	35.61
		ชาย	3,232	10.07	597	10.44	757	9.21	772	7.08	414	8.94	692	26.46
		หญิง	5,324	15.91	782	13.13	1,302	14.93	1,382	12.50	569	11.91	1,289	43.72
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ	รวม	276,660	422.01	55,165	472.66	66,576	392.90	95,484	434.65	29,023	308.42	30,412	546.67
		ชาย	134,015	417.56	26,779	468.48	31,517	383.30	46,605	427.18	14,179	306.16	14,935	571.11
		หญิง	142,645	426.29	28,386	476.67	35,059	401.96	48,879	442.02	14,844	310.62	15,477	524.99
151	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	รวม	216,131	329.68	42,364	362.98	61,193	361.14	56,557	257.45	38,764	411.94	17,253	310.13
		ชาย	96,837	301.72	17,969	314.36	26,425	321.37	26,428	242.24	17,848	385.38	8,167	312.30
		หญิง	119,294	356.50	24,395	409.65	34,768	398.63	30,129	272.46	20,916	437.67	9,086	308.20
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52) โรคหัวใจอื่น ๆ	รวม	129,214	197.10	23,421	200.67	31,650	186.79	40,330	183.59	15,063	160.07	18,750	337.04
		ชาย	65,795	205.00	11,943	208.94	16,084	195.61	20,772	190.40	7,206	155.59	9,790	374.37
		หญิง	63,419	189.52	11,478	192.74	15,566	178.47	19,558	176.87	7,857	164.41	8,960	303.93
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62) เลือดออกในสมอง	รวม	64,769	98.80	14,038	120.28	17,484	103.18	18,946	86.24	7,960	84.59	6,341	113.98
		ชาย	38,376	119.57	8,234	144.05	10,313	125.42	11,600	106.33	4,567	98.61	3,662	140.03
		หญิง	26,393	78.87	5,804	97.46	7,171	82.22	7,346	66.43	3,393	71.00	2,679	90.87

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
154	Cerebral infraction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	130,726	199.41	22,650	194.07	32,956	194.49	45,192	205.72	19,555	207.81	10,373	186.46
		ชาย	70,680	220.22	12,267	214.60	17,957	218.38	24,171	221.55	10,570	228.23	5,715	218.54
		หญิง	60,046	179.44	10,383	174.35	14,999	171.97	21,021	190.10	8,985	188.01	4,658	158.00
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจาก เลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจาก การขาดเลือด	รวม	29,193	44.53	5,223	44.75	6,385	37.68	11,408	51.93	4,890	51.96	1,287	23.13
		ชาย	15,475	48.22	2,715	47.50	3,480	42.32	5,993	54.93	2,589	55.90	698	26.69
		หญิง	13,718	41.00	2,508	42.12	2,905	33.31	5,415	48.97	2,301	48.15	589	19.98
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69) โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	รวม	130,983	199.80	22,468	192.51	35,347	208.60	42,350	192.78	16,957	180.20	13,861	249.16
		ชาย	72,280	225.21	12,413	217.16	19,238	233.96	23,475	215.17	9,540	205.99	7,614	291.16
		หญิง	58,703	175.43	10,055	168.85	16,109	184.69	18,875	170.69	7,417	155.20	6,247	211.90
157	Atherosclerosis (I70) ภาวะหลอดเลือดแข็ง	รวม	2,538	3.87	261	2.24	399	2.35	464	2.11	193	2.05	1,221	21.95
		ชาย	1,381	4.30	137	2.40	217	2.64	265	2.43	100	2.16	662	25.31
		หญิง	1,157	3.46	124	2.08	182	2.09	199	1.80	93	1.95	559	18.96
158	Other peripheral vascular diseases (I73) โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	รวม	2,597	3.96	354	3.03	703	4.15	370	1.68	426	4.53	744	13.37
		ชาย	1,439	4.48	176	3.08	371	4.51	215	1.97	236	5.10	441	16.86
		หญิง	1,158	3.46	178	2.99	332	3.81	155	1.40	190	3.98	303	10.28
159	Arterial embolism and thrombosis (I74) ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	รวม	6,520	9.95	1,294	11.09	1,496	8.83	1,832	8.34	806	8.57	1,092	19.63
		ชาย	3,747	11.67	751	13.14	835	10.15	1,071	9.82	472	10.19	618	23.63
		หญิง	2,773	8.29	543	9.12	661	7.58	761	6.88	334	6.99	474	16.08

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79) โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และแคปิลลารีอื่น ๆ	รวม	17,201	26.24	3,394	29.08	3,123	18.43	4,707	21.43	2,573	27.34	3,404	61.19
		ชาย	10,612	33.06	1,909	33.40	1,879	22.85	2,891	26.50	1,690	36.49	2,243	85.77
		หญิง	6,589	19.69	1,485	24.94	1,244	14.26	1,816	16.42	883	18.48	1,161	39.38
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82) หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบ มีลิ่มเลือดก่อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ	รวม	30,415	46.39	5,977	51.21	6,313	37.26	9,970	45.38	3,636	38.64	4,519	81.23
		ชาย	13,044	40.64	2,657	46.48	2,453	29.83	4,539	41.60	1,622	35.02	1,773	67.80
		หญิง	17,371	51.91	3,320	55.75	3,860	44.26	5,431	49.11	2,014	42.14	2,746	93.15
162	Varicose veins of lower extremities (I83) หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	รวม	1,565	2.39	309	2.65	385	2.27	305	1.39	223	2.37	343	6.17
		ชาย	614	1.91	124	2.17	143	1.74	152	1.39	87	1.88	108	4.13
		หญิง	951	2.84	185	3.11	242	2.77	153	1.38	136	2.85	235	7.97
163	Haemorrhoids (I84, K64) ริดสีดวงทวาร	รวม	23,511	35.86	5,607	48.04	5,165	30.48	7,663	34.88	2,991	31.78	2,085	37.48
		ชาย	12,893	40.17	3,105	54.32	2,801	34.06	4,184	38.35	1,719	37.12	1,084	41.45
		หญิง	10,618	31.73	2,502	42.01	2,364	27.10	3,479	31.46	1,272	26.62	1,001	33.95
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99) โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	60,972	93.01	16,474	141.15	13,998	82.61	19,263	87.69	5,870	62.38	5,367	96.47
		ชาย	37,077	115.52	10,081	176.36	8,397	102.12	12,008	110.07	3,493	75.42	3,098	118.47
		หญิง	23,895	71.41	6,393	107.35	5,601	64.22	7,255	65.61	2,377	49.74	2,269	76.97

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคระบบหายใจ (J00 - J99)														
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	รวม	65,360	99.70	13,462	115.34	15,502	91.49	21,661	98.60	12,478	132.60	2,257	40.57
		ชาย	33,947	105.77	7,097	124.16	8,334	101.35	11,140	102.11	6,212	134.13	1,164	44.51
		หญิง	31,413	93.88	6,365	106.88	7,168	82.18	10,521	95.14	6,266	131.12	1,093	37.08
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04) กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	รวม	1,081	1.65	206	1.77	206	1.22	383	1.74	161	1.71	125	2.25
		ชาย	587	1.83	114	1.99	119	1.45	195	1.79	96	2.07	63	2.41
		หญิง	494	1.48	92	1.54	87	1.00	188	1.70	65	1.36	62	2.10
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	รวม	78,856	120.29	13,551	116.11	19,091	112.67	27,383	124.65	15,181	161.33	3,650	65.61
		ชาย	42,297	131.79	7,405	129.55	10,645	129.46	14,592	133.75	7,601	164.12	2,054	78.54
		หญิง	36,559	109.25	6,146	103.21	8,446	96.84	12,791	115.67	7,580	158.61	1,596	54.14
168	Influenza (J10-J11) ไข้หวัดใหญ่	รวม	106,618	162.63	19,182	164.35	28,052	165.55	38,052	173.22	14,757	156.82	6,575	118.19
		ชาย	55,220	172.05	10,327	180.67	14,562	177.10	19,386	177.69	7,475	161.40	3,470	132.69
		หญิง	51,398	153.60	8,855	148.70	13,490	154.67	18,666	168.80	7,282	152.38	3,105	105.32
169	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	รวม	523,336	798.29	96,223	824.45	114,734	677.11	196,415	894.10	87,699	931.96	28,265	508.08
		ชาย	296,074	922.49	54,643	955.95	64,388	783.06	111,219	1,019.44	49,970	1,078.97	15,854	606.25
		หญิง	227,262	679.16	41,580	698.23	50,346	577.23	85,196	770.44	37,729	789.49	12,411	420.99
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	รวม	175,042	267.01	35,564	304.72	36,257	213.97	62,888	286.27	34,087	362.24	6,246	112.27
		ชาย	94,884	295.64	19,562	342.23	19,362	235.47	34,161	313.12	18,427	397.88	3,372	128.94
		หญิง	80,158	239.55	16,002	268.71	16,895	193.71	28,727	259.78	15,660	327.69	2,874	97.49

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
171	Chronic sinusitis (J32) ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	รวม	6,295	9.60	1,333	11.42	1,373	8.10	1,666	7.58	770	8.18	1,153	20.73
		ชาย	3,348	10.43	731	12.79	721	8.77	894	8.19	409	8.83	593	22.68
		หญิง	2,947	8.81	602	10.11	652	7.48	772	6.98	361	7.55	560	19.00
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34) โรคอื่นของจมูกและไซนัส	รวม	17,975	27.42	3,325	28.49	4,931	29.10	4,036	18.37	2,318	24.63	3,365	60.49
		ชาย	9,885	30.80	1,871	32.73	2,657	32.31	2,201	20.17	1,231	26.58	1,925	73.61
		หญิง	8,090	24.18	1,454	24.42	2,274	26.07	1,835	16.59	1,087	22.75	1,440	48.85
173	Chronic disease of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิล และต่อมน้ำเหลืองในคอ	รวม	10,221	15.59	1,756	15.05	2,017	11.90	3,265	14.86	1,456	15.47	1,727	31.04
		ชาย	5,650	17.60	970	16.97	1,129	13.73	1,707	15.65	761	16.43	1,083	41.41
		หญิง	4,571	13.66	786	13.20	888	10.18	1,558	14.09	695	14.54	644	21.84
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	10,397	15.86	1,993	17.08	1,712	10.10	3,010	13.70	1,522	16.17	2,160	38.83
		ชาย	5,848	18.22	1,101	19.26	980	11.92	1,736	15.91	834	18.01	1,197	45.77
		หญิง	4,549	13.59	892	14.98	732	8.39	1,274	11.52	688	14.40	963	32.67
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	รวม	253,159	386.17	66,369	568.66	54,594	322.19	70,296	319.99	51,624	548.60	10,276	184.72
		ชาย	189,498	590.43	43,034	752.86	42,236	513.66	56,348	516.49	39,798	859.33	8,082	309.05
		หญิง	63,661	190.25	23,335	391.85	12,358	141.69	13,948	126.13	11,826	247.46	2,194	74.42
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	130,458	199.00	17,627	151.03	30,669	181.00	46,303	210.78	28,022	297.78	7,837	140.87
		ชาย	49,129	153.07	7,021	122.83	11,390	138.52	17,476	160.19	10,306	222.53	2,936	112.27
		หญิง	81,329	243.05	10,606	178.10	19,279	221.04	28,827	260.69	17,716	370.71	4,901	166.25

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	15,911	24.27	2,633	22.56	2,965	17.50	6,916	31.48	2,151	22.86	1,246	22.40
		ชาย	7,905	24.63	1,383	24.19	1,501	18.25	3,399	31.16	987	21.31	635	24.28
		หญิง	8,006	23.93	1,250	20.99	1,464	16.79	3,517	31.80	1,164	24.36	611	20.73
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	212	0.32	17	0.15	33	0.19	127	0.58	15	0.16	20	0.36
		ชาย	175	0.55	12	0.21	22	0.27	119	1.09	8	0.17	14	0.54
		หญิง	37	0.11	5	0.08	11	0.13	8	0.07	7	0.15	6	0.20
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	รวม	344,373	525.30	70,931	607.74	79,868	471.35	116,593	530.74	46,763	496.94	30,218	543.18
		ชาย	201,717	628.50	41,707	729.64	45,163	549.25	70,489	646.10	27,853	601.41	16,505	631.15
		หญิง	142,656	426.32	29,224	490.74	34,705	397.90	46,104	416.93	18,910	395.70	13,713	465.15
โรกระบบย่อยอาหาร (K00 - K93)														
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	10,082	15.38	1,560	13.37	2,487	14.68	3,102	14.12	1,551	16.48	1,382	24.84
		ชาย	5,655	17.62	873	15.27	1,469	17.87	1,583	14.51	930	20.08	800	30.59
		หญิง	4,427	13.23	687	11.54	1,018	11.67	1,519	13.74	621	12.99	582	19.74
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	20,684	31.55	4,458	38.20	3,886	22.93	7,780	35.42	2,274	24.17	2,286	41.09
		ชาย	11,261	35.09	2,418	42.30	2,203	26.79	4,108	37.65	1,231	26.58	1,301	49.75
		หญิง	9,423	28.16	2,040	34.26	1,683	19.30	3,672	33.21	1,043	21.83	985	33.41
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อม้ำลายและ ขากรรไกร	รวม	21,379	32.61	4,086	35.01	3,835	22.63	9,224	41.99	2,552	27.12	1,682	30.23
		ชาย	10,820	33.71	2,136	37.37	1,982	24.10	4,504	41.28	1,324	28.59	874	33.42
		หญิง	10,559	31.56	1,950	32.75	1,853	21.25	4,720	42.68	1,228	25.70	808	27.41

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนิ้ม	รวม	41,537	63.36	10,046	86.08	11,464	67.66	12,884	58.65	3,403	36.16	3,740	67.23
		ชาย	27,995	87.23	6,737	117.86	7,490	91.09	9,188	84.22	2,220	47.93	2,360	90.25
		หญิง	13,542	40.47	3,309	55.57	3,974	45.56	3,696	33.42	1,183	24.75	1,380	46.81
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้น อักเสบ	รวม	97,811	149.20	17,146	146.91	24,029	141.81	34,795	158.39	14,801	157.29	7,040	126.55
		ชาย	51,304	159.85	9,275	162.26	12,349	150.18	18,734	171.72	7,236	156.24	3,710	141.87
		หญิง	46,507	138.98	7,871	132.17	11,680	133.91	16,061	145.24	7,565	158.30	3,330	112.96
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ และดูโอเดนิ้ม	รวม	132,214	201.68	23,380	200.32	23,884	140.95	57,490	261.70	21,096	224.18	6,364	114.40
		ชาย	59,000	183.83	10,436	182.57	10,822	131.61	25,436	233.15	9,140	197.35	3,166	121.07
		หญิง	73,214	218.80	12,944	217.36	13,062	149.76	32,054	289.87	11,956	250.18	3,198	108.48
186	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	85,726	130.77	17,453	149.54	18,535	109.39	32,472	147.82	12,164	129.26	5,102	91.71
		ชาย	40,626	126.58	8,446	147.76	9,157	111.36	14,670	134.47	5,775	124.70	2,578	98.58
		หญิง	45,100	134.78	9,007	151.25	9,378	107.52	17,802	160.99	6,389	133.69	2,524	85.62
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	35,641	54.37	7,849	67.25	7,829	46.20	10,940	49.80	5,670	60.25	3,353	60.27
		ชาย	33,623	104.76	7,430	129.98	7,383	89.79	10,370	95.05	5,312	114.70	3,128	119.61
		หญิง	2,018	6.03	419	7.04	446	5.11	570	5.15	358	7.49	225	7.63
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	7,251	11.06	1,355	11.61	1,996	11.78	1,549	7.05	1,101	11.70	1,250	22.47
		ชาย	3,371	10.50	639	11.18	880	10.70	798	7.31	475	10.26	579	22.14
		หญิง	3,880	11.60	716	12.02	1,116	12.80	751	6.79	626	13.10	671	22.76

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51)	รวม	1,492	2.28	291	2.49	281	1.66	416	1.89	146	1.55	358	6.44
	โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	ชาย	788	2.46	153	2.68	136	1.65	218	2.00	87	1.88	194	7.42
		หญิง	704	2.10	138	2.32	145	1.66	198	1.79	59	1.23	164	5.56
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56)	รวม	40,501	61.78	8,571	73.44	8,767	51.74	14,070	64.05	5,351	56.86	3,742	67.26
	ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตัน	ชาย	24,649	76.80	5,220	91.32	5,146	62.58	8,832	80.95	3,389	73.18	2,062	78.85
	แบบไม่มีไส้เลื่อน	หญิง	15,852	47.37	3,351	56.27	3,621	41.52	5,238	47.37	1,962	41.06	1,680	56.99
191	Diverticular disease of intestine (K57)	รวม	12,061	18.40	2,889	24.75	3,202	18.90	3,099	14.11	1,158	12.31	1,713	30.79
	โรคต่งเนื้อของลำไส้	ชาย	6,299	19.63	1,551	27.13	1,578	19.19	1,697	15.55	606	13.08	867	33.15
		หญิง	5,762	17.22	1,338	22.47	1,624	18.62	1,402	12.68	552	11.55	846	28.70
192	Other diseases of intestines and peritoneum (K52-K55, K58-K63, K65-K67)	รวม	127,611	194.66	26,196	224.45	29,238	172.55	43,125	196.31	15,681	166.64	13,371	240.35
	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	ชาย	69,541	216.67	14,466	253.08	15,362	186.83	23,982	219.82	8,665	187.10	7,066	270.20
		หญิง	58,070	173.54	11,730	196.97	13,876	159.09	19,143	173.11	7,016	146.81	6,305	213.87
193	Alcoholic liver disease (K70)	รวม	63,953	97.55	13,565	116.23	14,216	83.90	28,454	129.53	3,707	39.39	4,011	72.10
	โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	ชาย	50,942	158.72	10,841	189.66	10,530	128.06	22,931	210.19	3,356	72.46	3,284	125.58
		หญิง	13,011	38.88	2,724	45.74	3,686	42.26	5,523	49.95	351	7.34	727	24.66
194	Other diseases of liver (K71-K77)	รวม	157,270	239.90	30,036	257.35	33,627	198.45	62,191	283.10	15,533	165.07	15,883	285.50
	โรคอื่น ๆ ของตับ	ชาย	98,687	307.48	19,614	343.14	19,904	242.06	40,027	366.89	9,651	208.39	9,491	362.93
		หญิง	58,583	175.07	10,422	175.01	13,723	157.34	22,164	200.43	5,882	123.08	6,392	216.82

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81) โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	รวม	78,995	120.50	14,387	123.27	17,441	102.93	30,549	139.06	7,777	82.64	8,841	158.92
		ชาย	31,450	97.99	5,765	100.86	6,877	83.63	12,221	112.02	2,765	59.70	3,822	146.15
		หญิง	47,545	142.09	8,622	144.78	10,564	121.12	18,328	165.74	5,012	104.88	5,019	170.25
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	รวม	23,200	35.39	4,469	38.29	5,766	34.03	7,972	36.29	2,402	25.53	2,591	46.57
		ชาย	16,283	50.73	3,169	55.44	3,947	48.00	5,997	54.97	1,588	34.29	1,582	60.50
		หญิง	6,917	20.67	1,300	21.83	1,819	20.86	1,975	17.86	814	17.03	1,009	34.23
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	142,651	217.60	30,930	265.01	34,475	203.46	48,961	222.87	15,242	161.97	13,043	234.45
		ชาย	87,443	272.45	19,659	343.92	20,513	249.47	30,736	281.73	9,202	198.69	7,333	280.41
		หญิง	55,208	164.99	11,271	189.27	13,962	160.08	18,225	164.81	6,040	126.39	5,710	193.69
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00 - L99)														
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	155,351	236.97	31,177	267.13	33,770	199.30	56,540	257.37	26,780	284.59	7,084	127.34
		ชาย	86,904	270.77	17,767	310.82	18,093	220.04	32,572	298.56	14,579	314.79	3,893	148.87
		หญิง	68,447	204.55	13,410	225.19	15,677	179.74	23,968	216.75	12,201	255.31	3,191	108.24
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99) โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	118,993	181.51	25,073	214.83	29,584	174.59	37,611	171.21	14,840	157.70	11,885	213.64
		ชาย	62,878	195.91	13,499	236.16	14,899	181.19	20,579	188.63	7,952	171.70	5,949	227.49
		หญิง	56,115	167.70	11,574	194.35	14,685	168.37	17,032	154.02	6,888	144.13	5,936	201.35

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรกระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00 - M99)														
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14) ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	รวม	189,919	289.70	47,818	409.71	38,120	224.97	72,886	331.78	18,516	196.77	12,579	226.11
		ชาย	125,537	391.14	31,495	550.99	24,845	302.15	47,893	438.99	13,108	283.03	8,196	313.41
		หญิง	64,382	192.40	16,323	274.10	13,275	152.20	24,993	226.02	5,408	113.16	4,383	148.67
201	Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม	รวม	39,568	60.36	9,579	82.07	11,543	68.12	7,862	35.79	3,426	36.41	7,158	128.67
		ชาย	9,083	28.30	2,400	41.99	2,394	29.11	2,090	19.16	730	15.76	1,469	56.17
		หญิง	30,485	91.10	7,179	120.55	9,149	104.90	5,772	52.20	2,696	56.41	5,689	192.97
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา	รวม	2,007	3.06	297	2.54	367	2.17	407	1.85	190	2.02	746	13.41
		ชาย	947	2.95	127	2.22	158	1.92	237	2.17	102	2.20	323	12.35
		หญิง	1,060	3.17	170	2.85	209	2.40	170	1.54	88	1.84	423	14.35
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	รวม	24,940	38.04	4,957	42.47	5,573	32.89	8,183	37.25	2,667	28.34	3,560	63.99
		ชาย	15,631	48.70	2,929	51.24	3,624	44.07	5,042	46.22	1,746	37.70	2,290	87.57
		หญิง	9,309	27.82	2,028	34.05	1,949	22.35	3,141	28.40	921	19.27	1,270	43.08
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	รวม	31,264	47.69	6,531	55.96	6,182	36.48	11,483	52.27	3,455	36.72	3,613	64.95
		ชาย	5,817	18.12	1,168	20.43	1,085	13.20	2,403	22.03	527	11.38	634	24.24
		หญิง	25,447	76.05	5,363	90.06	5,097	58.44	9,080	82.11	2,928	61.27	2,979	101.05
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	รวม	8,402	12.82	1,687	14.45	1,607	9.48	2,890	13.16	975	10.36	1,243	22.34
		ชาย	4,160	12.96	783	13.70	794	9.66	1,463	13.41	527	11.38	593	22.68
		หญิง	4,242	12.68	904	15.18	813	9.32	1,427	12.90	448	9.37	650	22.05

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	71,615	109.24	16,513	141.49	13,136	77.52	27,534	125.34	6,757	71.81	7,675	137.96
		ชาย	29,626	92.31	6,741	117.93	5,308	64.55	11,410	104.58	2,967	64.06	3,200	122.37
		หญิง	41,989	125.48	9,772	164.09	7,828	89.75	16,124	145.81	3,790	79.31	4,475	151.79
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	90,163	137.53	18,124	155.29	16,084	94.92	38,620	175.80	11,833	125.75	5,502	98.90
		ชาย	48,459	150.99	9,714	169.94	8,818	107.24	21,261	194.88	5,952	128.52	2,714	103.78
		หญิง	41,704	124.63	8,410	141.22	7,266	83.31	17,359	156.98	5,881	123.06	2,788	94.57
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่น ของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	รวม	16,257	24.80	3,422	29.32	3,467	20.46	4,549	20.71	1,851	19.67	2,968	53.35
		ชาย	5,250	16.36	1,060	18.54	1,109	13.49	1,588	14.56	673	14.53	820	31.36
		หญิง	11,007	32.89	2,362	39.66	2,358	27.04	2,961	26.78	1,178	24.65	2,148	72.86
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	12,492	19.06	2,560	21.93	2,676	15.79	5,025	22.87	1,324	14.07	907	16.30
		ชาย	7,739	24.11	1,551	27.13	1,730	21.04	3,061	28.06	829	17.90	568	21.72
		หญิง	4,753	14.20	1,009	16.94	946	10.85	1,964	17.76	495	10.36	339	11.50
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาน	รวม	13,537	20.65	2,702	23.15	3,006	17.74	3,891	17.71	2,106	22.38	1,832	32.93
		ชาย	7,007	21.83	1,337	23.39	1,479	17.99	2,138	19.60	1,141	24.64	912	34.87
		หญิง	6,530	19.51	1,365	22.92	1,527	17.51	1,753	15.85	965	20.19	920	31.21
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00 - N99)														
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลัน และชนิดกำเริบเร็ว	รวม	3,371	5.14	517	4.43	506	2.99	869	3.96	1,255	13.34	224	4.03
		ชาย	1,938	6.04	303	5.30	297	3.61	479	4.39	742	16.02	117	4.47
		หญิง	1,433	4.28	214	3.59	209	2.40	390	3.53	513	10.73	107	3.63

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	41,010	62.56	5,671	48.59	6,422	37.90	17,455	79.46	6,597	70.10	4,865	87.45
		ชาย	16,414	51.14	2,244	39.26	2,689	32.70	6,648	60.94	2,774	59.90	2,059	78.74
		หญิง	24,596	73.50	3,427	57.55	3,733	42.80	10,807	97.73	3,823	80.00	2,806	95.18
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	101,429	154.72	22,369	191.66	23,170	136.74	34,626	157.62	13,699	145.58	7,565	135.98
		ชาย	38,509	119.98	9,213	161.18	7,628	92.77	14,186	130.03	4,674	100.92	2,808	107.38
		หญิง	62,920	188.03	13,156	220.92	15,542	178.19	20,440	184.84	9,025	188.85	4,757	161.36
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	855,419	1,304.85	170,512	1,460.97	183,604	1,083.56	350,226	1,594.26	95,713	1,017.12	55,364	995.19
		ชาย	426,362	1,328.44	88,597	1,549.96	89,353	1,086.67	169,167	1,550.59	49,484	1,068.47	29,761	1,138.05
		หญิง	429,057	1,282.22	81,915	1,375.54	94,251	1,080.62	181,059	1,637.34	46,229	967.36	25,603	868.47
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	58,526	89.27	14,259	122.17	7,899	46.62	25,631	116.67	7,764	82.51	2,973	53.44
		ชาย	35,996	112.15	9,372	163.96	4,479	54.47	16,032	146.95	4,437	95.80	1,676	64.09
		หญิง	22,530	67.33	4,887	82.06	3,420	39.21	9,599	86.81	3,327	69.62	1,297	44.00
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	24,495	37.36	5,031	43.11	5,741	33.88	9,153	41.67	3,513	37.33	1,057	19.00
		ชาย	7,176	22.36	1,529	26.75	1,561	18.98	2,867	26.28	930	20.08	289	11.05
		หญิง	17,319	51.76	3,502	58.81	4,180	47.93	6,286	56.85	2,583	54.05	768	26.05
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	262,933	401.08	58,272	499.28	67,118	396.10	82,301	374.64	32,428	344.61	22,814	410.09
		ชาย	108,817	339.05	24,775	433.43	26,054	316.86	35,691	327.14	12,776	275.86	9,521	364.08
		หญิง	154,116	460.57	33,497	562.49	41,064	470.81	46,610	421.50	19,652	411.22	13,293	450.91

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
218	Hyperplasia of prostate (N40) ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	รวม	90,225	137.63	19,749	169.21	22,648	133.66	23,323	106.17	13,483	143.28	11,022	198.13
		ชาย	90,225	281.12	19,749	345.50	22,648	275.43	23,323	213.78	13,483	291.13	11,022	421.48
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	814	1.24	155	1.33	128	0.76	270	1.23	57	0.61	204	3.67
		ชาย	814	2.54	155	2.71	128	1.56	270	2.47	57	1.23	204	7.80
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อันตะ	รวม	3,201	4.88	649	5.56	648	3.82	1,031	4.69	528	5.61	345	6.20
		ชาย	3,201	9.97	649	11.35	648	7.88	1,031	9.45	528	11.40	345	13.19
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายติบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก	รวม	5,281	8.06	1,102	9.44	1,204	7.11	1,832	8.34	728	7.74	415	7.46
		ชาย	5,281	16.45	1,102	19.28	1,204	14.64	1,832	16.79	728	15.72	415	15.87
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
222	Other diseases of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	12,053	18.39	2,347	20.11	2,458	14.51	4,754	21.64	1,734	18.43	760	13.66
		ชาย	12,053	37.55	2,347	41.06	2,458	29.89	4,754	43.58	1,734	37.44	760	29.06
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of the breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	9,182	14.01	1,886	16.16	1,798	10.61	2,901	13.21	1,862	19.79	735	13.21
		ชาย	515	1.60	112	1.96	86	1.05	161	1.48	120	2.59	36	1.38
		หญิง	8,667	25.90	1,774	29.79	1,712	19.63	2,740	24.78	1,742	36.45	699	23.71

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	2,808	4.28	398	3.41	679	4.01	1,043	4.75	362	3.85	326	5.86
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,808	8.39	398	6.68	679	7.78	1,043	9.43	362	7.57	326	11.06
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	589	0.90	120	1.03	80	0.47	189	0.86	87	0.92	113	2.03
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	589	1.76	120	2.02	80	0.92	189	1.71	87	1.82	113	3.83
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	20,889	31.86	3,314	28.39	4,645	27.41	7,596	34.58	3,299	35.06	2,035	36.58
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	20,889	62.43	3,314	55.65	4,645	53.26	7,596	68.69	3,299	69.03	2,035	69.03
227	Endometriosis (N80) เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	รวม	14,059	21.45	1,913	16.39	2,412	14.23	4,684	21.32	2,085	22.16	2,965	53.30
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	14,059	42.01	1,913	32.12	2,412	27.65	4,684	42.36	2,085	43.63	2,965	100.57
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	4,591	7.00	874	7.49	896	5.29	1,657	7.54	452	4.80	712	12.80
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,591	13.72	874	14.68	896	10.27	1,657	14.98	452	9.46	712	24.15
229	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก	รวม	9,746	14.87	1,619	13.87	2,407	14.21	2,995	13.63	1,604	17.05	1,121	20.15
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,746	29.13	1,619	27.19	2,407	27.60	2,995	27.08	1,604	33.56	1,121	38.03

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
230	Disorders of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	10,190	15.54	1,547	13.25	2,020	11.92	4,108	18.70	2,078	22.08	437	7.86
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,190	30.45	1,547	25.98	2,020	23.16	4,108	37.15	2,078	43.48	437	14.82
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่น ในระยะหมดประจำเดือน	รวม	4,394	6.70	887	7.60	970	5.72	1,478	6.73	726	7.72	333	5.99
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,394	13.13	887	14.89	970	11.12	1,478	13.37	726	15.19	333	11.30
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	301	0.46	27	0.23	36	0.21	93	0.42	69	0.73	76	1.37
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	301	0.90	27	0.45	36	0.41	93	0.84	69	1.44	76	2.58
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์	รวม	25,305	38.60	4,583	39.27	5,004	29.53	8,484	38.62	4,469	47.49	2,765	49.70
		ชาย	354	1.10	85	1.49	31	0.38	28	0.26	26	0.56	184	7.04
		หญิง	24,951	74.56	4,498	75.53	4,973	57.02	8,456	76.47	4,443	92.97	2,581	87.55
การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00 - O99)														
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	10,394	15.85	1,296	11.10	2,127	12.55	3,674	16.72	2,573	27.34	724	13.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,394	31.06	1,296	21.76	2,127	24.39	3,674	33.22	2,573	53.84	724	24.56
235	Medical abortion (O04) การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	รวม	2,306	3.52	376	3.22	257	1.52	1,204	5.48	384	4.08	85	1.53
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,306	6.89	376	6.31	257	2.95	1,204	10.89	384	8.04	85	2.88

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08) การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	รวม	25,558	38.99	4,157	35.62	6,055	35.73	7,078	32.22	6,831	72.59	1,437	25.83
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	25,558	76.38	4,157	69.81	6,055	69.42	7,078	64.01	6,831	142.94	1,437	48.74
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด	รวม	26,123	39.85	3,753	32.16	5,833	34.42	7,832	35.65	7,406	78.70	1,299	23.35
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,123	78.07	3,753	63.02	5,833	66.88	7,832	70.83	7,406	154.97	1,299	44.06
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	5,265	8.03	847	7.26	1,028	6.07	1,703	7.75	1,382	14.69	305	5.48
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5,265	15.73	847	14.22	1,028	11.79	1,703	15.40	1,382	28.92	305	10.35
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	รวม	148,321	226.25	23,375	200.28	31,853	187.98	48,814	222.21	35,706	379.44	8,573	154.10
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	148,321	443.25	23,375	392.52	31,853	365.20	48,814	441.43	35,706	747.16	8,573	290.80

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	16,805	25.63	2,766	23.70	3,169	18.70	6,533	29.74	3,466	36.83	871	15.66
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,805	50.22	2,766	46.45	3,169	36.33	6,533	59.08	3,466	72.53	871	29.54
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	9,911	15.12	1,584	13.57	2,181	12.87	2,880	13.11	2,813	29.89	453	8.14
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,911	29.62	1,584	26.60	2,181	25.01	2,880	26.04	2,813	58.86	453	15.37
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	280,033	427.16	42,912	367.67	60,568	357.45	89,982	409.61	70,663	750.92	15,908	285.95
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	280,033	836.87	42,912	720.59	60,568	694.43	89,982	813.72	70,663	1,478.65	15,908	539.61
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดียว	รวม	193,042	294.46	30,659	262.69	42,904	253.20	62,180	283.05	48,490	515.29	8,809	158.35
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	193,042	576.90	30,659	514.84	42,904	491.91	62,180	562.30	48,490	1,014.67	8,809	298.81
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุ รายละเอียด	รวม	71,070	108.41	9,998	85.66	14,741	87.00	21,198	96.50	19,254	204.61	5,879	105.68
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	71,070	212.39	9,998	167.89	14,741	169.01	21,198	191.70	19,254	402.90	5,879	199.42

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00 - P96)														
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	27,595	42.09	5,057	43.33	4,992	29.46	11,150	50.76	3,775	40.12	2,621	47.11
		ชาย	14,532	45.28	2,702	47.27	2,658	32.33	5,734	52.56	1,998	43.14	1,440	55.07
		หญิง	13,063	39.04	2,355	39.55	2,334	26.76	5,416	48.98	1,777	37.18	1,181	40.06
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหารและความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	61,598	93.96	8,738	74.87	16,422	96.92	17,482	79.58	11,489	122.09	7,467	134.22
		ชาย	31,013	96.63	4,419	77.31	8,226	100.04	8,790	80.57	5,709	123.27	3,869	147.95
		หญิง	30,585	91.40	4,319	72.53	8,196	93.97	8,692	78.60	5,780	120.95	3,598	122.05
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	9,114	13.90	1,407	12.06	2,156	12.72	2,626	11.95	864	9.18	2,061	37.05
		ชาย	5,308	16.54	809	14.15	1,288	15.66	1,522	13.95	524	11.31	1,165	44.55
		หญิง	3,806	11.37	598	10.04	868	9.95	1,104	9.98	340	7.11	896	30.39
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด	รวม	10,986	16.76	1,448	12.41	2,521	14.88	3,140	14.29	1,769	18.80	2,108	37.89
		ชาย	6,208	19.34	854	14.94	1,453	17.67	1,757	16.10	1,000	21.59	1,144	43.75
		หญิง	4,778	14.28	594	9.97	1,068	12.24	1,383	12.51	769	16.09	964	32.70

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	78,072	119.09	9,160	78.48	22,735	134.17	25,057	114.06	12,607	133.97	8,513	153.03
		ชาย	46,799	145.81	5,514	96.46	13,669	166.24	14,923	136.78	7,629	164.73	5,064	193.65
		หญิง	31,273	93.46	3,646	61.22	9,066	103.94	10,134	91.64	4,978	104.17	3,449	116.99
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	รวม	36,043	54.98	4,577	39.22	10,734	63.35	12,618	57.44	5,513	58.59	2,601	46.75
		ชาย	19,934	62.11	2,574	45.03	5,918	71.97	6,924	63.47	3,061	66.09	1,457	55.72
		หญิง	16,109	48.14	2,003	33.64	4,816	55.22	5,694	51.49	2,452	51.31	1,144	38.81
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39) การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	4,896	7.47	647	5.54	1,567	9.25	1,406	6.40	939	9.98	337	6.06
		ชาย	2,816	8.77	360	6.30	917	11.15	804	7.37	527	11.38	208	7.95
		หญิง	2,080	6.22	287	4.82	650	7.45	602	5.44	412	8.62	129	4.38
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55) โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	รวม	7,684	11.72	831	7.12	2,501	14.76	2,405	10.95	1,225	13.02	722	12.98
		ชาย	3,922	12.22	425	7.44	1,283	15.60	1,211	11.10	640	13.82	363	13.88
		หญิง	3,762	11.24	406	6.82	1,218	13.96	1,194	10.80	585	12.24	359	12.18
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	228,497	348.55	35,185	301.47	61,820	364.84	69,732	317.43	35,057	372.54	26,703	480.00
		ชาย	126,432	393.93	19,425	339.83	34,347	417.71	38,347	351.49	19,346	417.72	14,967	572.33
		หญิง	102,065	305.02	15,760	264.65	27,473	314.99	31,385	283.82	15,711	328.76	11,736	398.09
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00 - Q99)														
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	662	1.01	83	0.71	98	0.58	218	0.99	60	0.64	203	3.65
		ชาย	323	1.01	52	0.91	44	0.54	110	1.01	30	0.65	87	3.33
		หญิง	339	1.01	31	0.52	54	0.62	108	0.98	30	0.63	116	3.93

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	รวม	3,480	5.31	655	5.61	731	4.31	790	3.60	381	4.05	923	16.59
		ชาย	1,730	5.39	315	5.51	368	4.48	402	3.68	191	4.12	454	17.36
		หญิง	1,750	5.23	340	5.71	363	4.16	388	3.51	190	3.98	469	15.91
256	Congenital malformations of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	34,387	52.45	5,228	44.79	6,062	35.78	8,318	37.86	4,303	45.73	10,476	188.31
		ชาย	17,232	53.69	2,513	43.96	3,020	36.73	4,117	37.74	2,185	47.18	5,397	206.38
		หญิง	17,155	51.27	2,715	45.59	3,042	34.88	4,201	37.99	2,118	44.32	5,079	172.28
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	4,568	6.97	637	5.46	908	5.36	1,386	6.31	869	9.23	768	13.81
		ชาย	2,445	7.62	358	6.26	487	5.92	731	6.70	442	9.54	427	16.33
		หญิง	2,123	6.34	279	4.69	421	4.83	655	5.92	427	8.94	341	11.57
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตัน และตีบ	รวม	408	0.62	37	0.32	75	0.44	104	0.47	92	0.98	100	1.80
		ชาย	210	0.65	20	0.35	39	0.47	58	0.53	44	0.95	49	1.87
		หญิง	198	0.59	17	0.29	36	0.41	46	0.42	48	1.00	51	1.73
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	37,433	57.10	4,939	42.32	8,515	50.25	10,371	47.21	5,676	60.32	7,932	142.58
		ชาย	21,968	68.45	2,909	50.89	5,035	61.23	6,261	57.39	3,379	72.96	4,384	167.64
		หญิง	15,465	46.22	2,030	34.09	3,480	39.90	4,110	37.17	2,297	48.07	3,548	120.35
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	2,956	4.51	472	4.04	723	4.27	810	3.69	381	4.05	570	10.25
		ชาย	2,956	9.21	472	8.26	723	8.79	810	7.42	381	8.23	570	21.80
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

หน่วยนับ : รายโรค

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ	รวม	5,451	8.31	744	6.37	839	4.95	1,290	5.87	779	8.28	1,799	32.34
		ชาย	3,498	10.90	451	7.89	472	5.74	823	7.54	523	11.29	1,229	47.00
		หญิง	1,953	5.84	293	4.92	367	4.21	467	4.22	256	5.36	570	19.33
262	Congenital deformities of hip (Q65) ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	รวม	355	0.54	38	0.33	54	0.32	75	0.34	37	0.39	151	2.71
		ชาย	134	0.42	15	0.26	14	0.17	30	0.27	13	0.28	62	2.37
		หญิง	221	0.66	23	0.39	40	0.46	45	0.41	24	0.50	89	3.02
263	Congenital deformities of feet (Q66) ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	รวม	2,467	3.76	352	3.02	581	3.43	671	3.05	470	4.99	393	7.06
		ชาย	1,240	3.86	193	3.38	271	3.30	327	3.00	246	5.31	203	7.76
		หญิง	1,227	3.67	159	2.67	310	3.55	344	3.11	224	4.69	190	6.44
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	รวม	5,708	8.71	798	6.84	953	5.62	1,516	6.90	739	7.85	1,702	30.59
		ชาย	3,206	9.99	433	7.58	541	6.58	850	7.79	409	8.83	973	37.21
		หญิง	2,502	7.48	365	6.13	412	4.72	666	6.02	330	6.91	729	24.73
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	11,654	17.78	1,655	14.18	1,927	11.37	2,653	12.08	1,548	16.45	3,871	69.58
		ชาย	6,192	19.29	869	15.20	1,026	12.48	1,449	13.28	815	17.60	2,033	77.74
		หญิง	5,462	16.32	786	13.20	901	10.33	1,204	10.89	733	15.34	1,838	62.35
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified (Q90-Q99) ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุ ไว้ที่อื่น	รวม	6,871	10.48	1,000	8.57	1,530	9.03	1,973	8.98	1,127	11.98	1,241	22.31
		ชาย	3,651	11.38	496	8.68	851	10.35	1,021	9.36	608	13.13	675	25.81
		หญิง	3,220	9.62	504	8.46	679	7.78	952	8.61	519	10.86	566	19.20

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00 - R99)														
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	61,557	93.90	12,078	103.49	10,539	62.20	25,068	114.11	12,359	131.34	1,513	27.20
		ชาย	25,604	79.78	5,122	89.61	4,277	52.01	10,566	96.85	5,034	108.70	605	23.14
		หญิง	35,953	107.44	6,956	116.81	6,262	71.80	14,502	131.14	7,325	153.28	908	30.80
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	136,667	208.47	25,689	220.11	20,318	119.91	66,188	301.29	17,819	189.36	6,653	119.59
		ชาย	71,482	222.72	13,840	242.12	10,359	125.98	34,389	315.21	9,262	199.99	3,632	138.89
		หญิง	65,185	194.80	11,849	198.97	9,959	114.18	31,799	287.56	8,557	179.06	3,021	102.47
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	1,184	1.81	327	2.80	368	2.17	292	1.33	122	1.30	75	1.35
		ชาย	509	1.59	159	2.78	141	1.71	139	1.27	42	0.91	28	1.07
		หญิง	675	2.02	168	2.82	227	2.60	153	1.38	80	1.67	47	1.59
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้	รวม	789,313	1,204.01	155,829	1,335.16	170,819	1,008.10	287,003	1,306.46	119,329	1,268.08	56,333	1,012.61
		ชาย	413,534	1,288.47	83,357	1,458.29	88,446	1,075.64	151,158	1,385.52	60,481	1,305.92	30,092	1,150.71
		หญิง	375,779	1,123.00	72,472	1,216.97	82,373	944.43	135,845	1,228.47	58,848	1,231.41	26,241	890.11
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00 - T98)														
271	Fracture of skull and facial bones (S02) กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	41,438	63.21	7,345	62.93	12,383	73.08	11,339	51.62	6,750	71.73	3,621	65.09
		ชาย	32,605	101.59	5,762	100.80	9,710	118.09	9,181	84.15	4,966	107.23	2,986	114.18
		หญิง	8,833	26.40	1,583	26.58	2,673	30.65	2,158	19.52	1,784	37.33	635	21.54

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค														
รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูก เชิงกรานหัก	รวม	37,607	57.37	8,940	76.60	9,899	58.42	9,896	45.05	5,943	63.15	2,929	52.65
		ชาย	25,287	78.79	5,981	104.63	6,484	78.86	6,843	62.72	4,037	87.17	1,942	74.26
		หญิง	12,320	36.82	2,959	49.69	3,415	39.15	3,053	27.61	1,906	39.88	987	33.48
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว	รวม	45,704	69.72	11,420	97.85	13,064	77.10	11,335	51.60	5,557	59.05	4,328	77.80
		ชาย	20,091	62.60	4,652	81.38	5,972	72.63	5,088	46.64	2,478	53.51	1,901	72.69
		หญิง	25,613	76.54	6,768	113.65	7,092	81.31	6,247	56.49	3,079	64.43	2,427	82.33
274	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	142,709	217.69	29,465	252.46	37,576	221.76	45,080	205.21	18,894	200.78	11,694	210.21
		ชาย	95,103	296.32	18,899	330.63	25,308	307.78	30,657	281.00	12,260	264.72	7,979	305.11
		หญิง	47,606	142.27	10,566	177.43	12,268	140.66	14,423	130.43	6,634	138.82	3,715	126.02
275	Fractures involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	78	0.12	5	0.04	14	0.08	23	0.10	34	0.36	2	0.04
		ชาย	59	0.18	3	0.05	11	0.13	15	0.14	28	0.60	2	0.08
		หญิง	19	0.06	2	0.03	3	0.03	8	0.07	6	0.13	0	0.00
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกาย หลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	22,482	34.29	4,077	34.93	6,117	36.10	7,030	32.00	3,175	33.74	2,083	37.44
		ชาย	15,227	47.44	2,751	48.13	4,240	51.56	4,865	44.59	1,921	41.48	1,450	55.45
		หญิง	7,255	21.68	1,326	22.27	1,877	21.52	2,165	19.58	1,254	26.24	633	21.47
277	Injury of the eye and orbit (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	11,004	16.79	2,279	19.53	2,629	15.52	3,784	17.23	1,773	18.84	539	9.69
		ชาย	8,575	26.72	1,837	32.14	1,980	24.08	2,931	26.87	1,413	30.51	414	15.83
		หญิง	2,429	7.26	442	7.42	649	7.44	853	7.71	360	7.53	125	4.24

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	116,006	176.95	20,671	177.11	25,087	148.05	44,335	201.82	20,839	221.45	5,074	91.21
		ชาย	79,493	247.68	14,275	249.73	17,300	210.39	31,373	287.57	12,962	279.88	3,583	137.01
		หญิง	36,513	109.12	6,396	107.40	7,787	89.28	12,962	117.22	7,877	164.83	1,491	50.58
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	26,042	39.72	5,166	44.26	6,757	39.88	8,290	37.74	3,959	42.07	1,870	33.61
		ชาย	20,857	64.99	4,157	72.72	5,347	65.03	6,745	61.82	3,073	66.35	1,535	58.70
		หญิง	5,185	15.50	1,009	16.94	1,410	16.17	1,545	13.97	886	18.54	335	11.36
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บ ที่เกิดจากตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่ง ที่ระบุเฉพาะ	รวม	6,374	9.72	1,252	10.73	1,756	10.36	2,291	10.43	750	7.97	325	5.84
		ชาย	5,150	16.05	996	17.42	1,406	17.10	1,913	17.53	585	12.63	250	9.56
		หญิง	1,224	3.66	256	4.30	350	4.01	378	3.42	165	3.45	75	2.54
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะ และหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	209,636	319.78	39,735	340.45	48,502	286.24	73,804	335.96	35,158	373.62	12,437	223.56
		ชาย	147,462	459.46	27,844	487.12	33,281	404.75	53,767	492.83	23,534	508.15	9,036	345.53
		หญิง	62,174	185.80	11,891	199.68	15,221	174.51	20,037	181.20	11,624	243.24	3,401	115.36

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวาร ธรรมชาติของร่างกาย	รวม	6,843	10.44	1,171	10.03	1,542	9.10	2,307	10.50	1,422	15.11	401	7.21
		ชาย	4,045	12.60	723	12.65	900	10.95	1,377	12.62	801	17.30	244	9.33
		หญิง	2,798	8.36	448	7.52	642	7.36	930	8.41	621	12.99	157	5.33
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	21,519	32.82	4,193	35.93	5,093	30.06	8,154	37.12	2,942	31.26	1,137	20.44
		ชาย	13,988	43.58	2,715	47.50	3,234	39.33	5,465	50.09	1,891	40.83	683	26.12
		หญิง	7,531	22.51	1,478	24.82	1,859	21.31	2,689	24.32	1,051	21.99	454	15.40
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยา และชีววัตถุ	รวม	30,816	47.01	6,537	56.01	8,197	48.38	10,047	45.73	4,251	45.17	1,784	32.07
		ชาย	12,459	38.82	2,677	46.83	3,179	38.66	4,189	38.40	1,719	37.12	695	26.58
		หญิง	18,357	54.86	3,860	64.82	5,018	57.53	5,858	52.97	2,532	52.98	1,089	36.94
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	43,255	65.98	7,756	66.45	11,681	68.94	12,965	59.02	10,030	106.59	823	14.79
		ชาย	25,166	78.41	4,767	83.40	6,575	79.96	7,356	67.43	6,028	130.16	440	16.83
		หญิง	18,089	54.06	2,989	50.19	5,106	58.54	5,609	50.72	4,002	83.74	383	12.99
286	Maltreatment syndrome (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	418	0.64	86	0.74	87	0.51	137	0.62	42	0.45	66	1.19
		ชาย	86	0.27	20	0.35	18	0.22	21	0.19	6	0.13	21	0.80
		หญิง	332	0.99	66	1.11	69	0.79	116	1.05	36	0.75	45	1.53
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	38,244	58.34	6,419	55.00	10,451	61.68	12,787	58.21	7,466	79.34	1,121	20.15
		ชาย	20,797	64.80	3,556	62.21	5,674	69.00	7,052	64.64	3,875	83.67	640	24.47
		หญิง	17,447	52.14	2,863	48.08	4,777	54.77	5,735	51.86	3,591	75.14	481	16.32

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	155,993	237.95	30,606	262.24	30,678	181.05	59,051	268.81	18,257	194.01	17,401	312.79
		ชาย	88,391	275.40	17,825	311.84	17,111	208.10	34,104	312.60	10,312	222.66	9,039	345.65
		หญิง	67,602	202.03	12,781	214.62	13,567	155.55	24,947	225.60	7,945	166.25	8,362	283.64
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าช้าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	2,741	4.18	678	5.81	696	4.11	589	2.68	339	3.60	439	7.89
		ชาย	1,953	6.09	492	8.61	479	5.83	451	4.13	239	5.16	292	11.17
		หญิง	788	2.35	186	3.12	217	2.49	138	1.25	100	2.09	147	4.99
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00 - Z99)														
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	รวม	73,595	112.26	19,403	166.25	16,224	95.75	16,592	75.53	17,908	190.30	3,468	62.34
		ชาย	33,669	104.90	9,772	170.96	5,860	71.27	8,259	75.70	7,950	171.66	1,828	69.90
		หญิง	39,926	119.32	9,631	161.73	10,364	118.83	8,333	75.36	9,958	208.37	1,640	55.63
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	7,954	12.13	1,837	15.74	1,872	11.05	2,448	11.14	1,539	16.35	258	4.64
		ชาย	4,193	13.06	948	16.58	993	12.08	1,334	12.23	775	16.73	143	5.47
		หญิง	3,761	11.24	889	14.93	879	10.08	1,114	10.07	764	15.99	115	3.90
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	รวม	55,916	85.29	3,991	34.20	9,503	56.08	26,468	120.48	13,003	138.18	2,951	53.05
		ชาย	28,608	89.14	1,983	34.69	4,845	58.92	13,686	125.45	6,629	143.14	1,465	56.02
		หญิง	27,308	81.61	2,008	33.72	4,658	53.41	12,782	115.59	6,374	133.38	1,486	50.41

ตารางที่ 33 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	90,174	137.55	14,476	124.03	27,691	163.42	31,176	141.92	11,766	125.03	5,065	91.05
		ชาย	83	0.26	9	0.16	30	0.36	26	0.24	7	0.15	11	0.42
		หญิง	90,091	269.23	14,467	242.93	27,661	317.14	31,150	281.69	11,759	246.06	5,054	171.44
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอดและการให้ คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	16,840	25.69	1,374	11.77	3,355	19.80	4,840	22.03	5,954	63.27	1,317	23.67
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,840	50.33	1,374	23.07	3,355	38.47	4,840	43.77	5,954	124.59	1,317	44.67
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	506,427	772.50	74,695	639.99	133,512	787.93	156,023	710.23	100,874	1,071.97	41,323	742.80
		ชาย	261,130	813.62	38,497	673.48	68,797	836.68	80,197	735.09	51,969	1,122.13	21,670	828.65
		หญิง	245,297	733.06	36,198	607.85	64,715	741.98	75,826	685.71	48,905	1,023.35	19,653	666.64
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	1,879	2.87	373	3.20	243	1.43	735	3.35	478	5.08	50	0.90
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,879	5.62	373	6.26	243	2.79	735	6.65	478	10.00	50	1.70
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการ หรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	437,022	666.63	97,038	831.43	96,581	569.98	134,966	614.38	47,537	505.17	60,900	1,094.71
		ชาย	223,718	697.05	49,048	858.07	50,082	609.07	69,613	638.07	26,294	567.75	28,681	1,096.75
		หญิง	213,304	637.45	47,990	805.86	46,499	533.13	65,353	591.00	21,243	444.52	32,219	1,092.89
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	490,892	748.80	80,819	692.47	108,896	642.66	153,041	696.66	100,194	1,064.74	47,942	861.78
		ชาย	97,411	303.51	17,875	312.71	20,853	253.60	29,996	274.94	11,156	240.88	17,531	670.38
		หญิง	393,481	1,175.90	62,944	1,056.98	88,043	1,009.44	123,045	1,112.71	89,038	1,863.15	30,411	1,031.56

ผู้ป่วยใน

(เฉพาะการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย

เพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ. 2562

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	7,374,836	11,249.49	1,396,845	11,968.32	1,645,871	9,713.25	2,641,787	12,025.64	1,175,141	12,487.97	515,192	9,260.82
		ชาย	3,574,461	11,137.15	690,924	12,087.36	790,649	9,615.52	1,292,586	11,847.88	546,304	11,795.94	253,998	9,712.81
		หญิง	3,800,375	11,357.25	705,921	11,854.06	855,222	9,805.39	1,349,201	12,201.02	628,837	13,158.61	261,194	8,859.88
กลุ่มโรคติดต่อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)														
001	Cholera (A00) อหิวาตกโรค	รวม	92	0.14	12	0.10	21	0.12	40	0.18	9	0.10	10	0.18
		ชาย	49	0.15	5	0.09	10	0.12	20	0.18	5	0.11	9	0.34
		หญิง	43	0.13	7	0.12	11	0.13	20	0.18	4	0.08	1	0.03
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	รวม	2,299	3.51	460	3.94	155	0.91	405	1.84	1,251	13.29	28	0.50
		ชาย	1,261	3.93	253	4.43	78	0.95	224	2.05	689	14.88	17	0.65
		หญิง	1,038	3.10	207	3.48	77	0.88	181	1.64	562	11.76	11	0.37
003	Shigellosis (A03) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	รวม	56	0.09	14	0.12	16	0.09	14	0.06	8	0.09	4	0.07
		ชาย	27	0.08	7	0.12	6	0.07	6	0.05	5	0.11	3	0.11
		หญิง	29	0.09	7	0.12	10	0.11	8	0.07	3	0.06	1	0.03
004	Amoebiasis (A06) โรคบิดมีตัว	รวม	2,528	3.86	733	6.28	245	1.45	567	2.58	972	10.33	11	0.20
		ชาย	1,183	3.69	360	6.30	119	1.45	257	2.36	437	9.44	10	0.38
		หญิง	1,345	4.02	373	6.26	126	1.44	310	2.80	535	11.20	1	0.03

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	351,733	536.53	60,956	522.28	72,625	428.60	148,460	675.80	59,757	635.02	9,935	178.59
		ชาย	161,543	503.33	28,750	502.97	33,186	403.59	67,010	614.22	27,781	599.85	4,816	184.16
		หญิง	190,190	568.37	32,206	540.81	39,439	452.18	81,450	736.56	31,976	669.11	5,119	173.64
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	52,818	80.57	12,578	107.77	10,912	64.40	21,735	98.94	5,766	61.27	1,827	32.84
		ชาย	25,163	78.40	6,230	108.99	5,364	65.23	9,870	90.47	2,791	60.26	908	34.72
		หญิง	27,655	82.65	6,348	106.60	5,548	63.61	11,865	107.30	2,975	62.25	919	31.17
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	34,867	53.19	6,649	56.97	7,116	42.00	15,438	70.28	3,923	41.69	1,741	31.30
		ชาย	24,885	77.54	4,838	84.64	5,256	63.92	10,708	98.15	2,871	61.99	1,212	46.35
		หญิง	9,982	29.83	1,811	30.41	1,860	21.33	4,730	42.77	1,052	22.01	529	17.94
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	6,800	10.37	1,099	9.42	1,215	7.17	3,311	15.07	686	7.29	489	8.79
		ชาย	4,143	12.91	708	12.39	750	9.12	1,987	18.21	443	9.57	255	9.75
		หญิง	2,657	7.94	391	6.57	465	5.33	1,324	11.97	243	5.08	234	7.94
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	5	0.01	0	0.00	0	0.00	4	0.02	1	0.01	0	0.00
		ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3	0.01	0	0.00	0	0.00	2	0.02	1	0.02	0	0.00
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อบรูเซลลา	รวม	22	0.03	4	0.03	2	0.01	15	0.07	0	0.00	1	0.02
		ชาย	12	0.04	2	0.03	1	0.01	9	0.08	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10	0.03	2	0.03	1	0.01	6	0.05	0	0.00	1	0.03

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	36	0.05	4	0.03	3	0.02	17	0.08	11	0.12	1	0.02
		ชาย	28	0.09	2	0.03	3	0.04	11	0.10	11	0.24	1	0.04
		หญิง	8	0.02	2	0.03	0	0.00	6	0.05	0	0.00	0	0.00
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	1	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	142	0.22	32	0.27	23	0.14	71	0.32	11	0.12	5	0.09
		ชาย	100	0.31	24	0.42	17	0.21	48	0.44	9	0.19	2	0.08
		หญิง	42	0.13	8	0.13	6	0.07	23	0.21	2	0.04	3	0.10
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	52	0.08	4	0.03	6	0.04	13	0.06	28	0.30	1	0.02
		ชาย	22	0.07	2	0.03	3	0.04	3	0.03	14	0.30	0	0.00
		หญิง	30	0.09	2	0.03	3	0.03	10	0.09	14	0.29	1	0.03
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	70	0.11	9	0.08	17	0.10	19	0.09	22	0.23	3	0.05
		ชาย	36	0.11	9	0.16	8	0.10	7	0.06	10	0.22	2	0.08
		หญิง	34	0.10	0	0.00	9	0.10	12	0.11	12	0.25	1	0.03
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	รวม	73	0.11	8	0.07	15	0.09	20	0.09	23	0.24	7	0.13
		ชาย	42	0.13	2	0.03	11	0.13	12	0.11	12	0.26	5	0.19
		หญิง	31	0.09	6	0.10	4	0.05	8	0.07	11	0.23	2	0.07

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
017	Septicaemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	40,512	61.80	7,317	62.69	10,027	59.18	15,533	70.71	5,031	53.46	2,604	46.81
		ชาย	20,256	63.11	3,850	67.35	4,748	57.74	7,895	72.37	2,510	54.20	1,253	47.91
		หญิง	20,256	60.53	3,467	58.22	5,279	60.53	7,638	69.07	2,521	52.75	1,351	45.83
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	45,084	68.77	5,409	46.34	4,304	25.40	22,070	100.46	12,640	134.32	661	11.88
		ชาย	26,187	81.59	3,079	53.87	2,374	28.87	13,003	119.19	7,353	158.77	378	14.45
		หญิง	18,897	56.47	2,330	39.13	1,930	22.13	9,067	81.99	5,287	110.63	283	9.60
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	1,283	1.96	149	1.28	554	3.27	384	1.75	56	0.60	140	2.52
		ชาย	700	2.18	77	1.35	296	3.60	218	2.00	30	0.65	79	3.02
		หญิง	583	1.74	72	1.21	258	2.96	166	1.50	26	0.54	61	2.07
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	113	0.17	23	0.20	34	0.20	33	0.15	12	0.13	11	0.20
		ชาย	69	0.21	13	0.23	21	0.26	18	0.16	8	0.17	9	0.34
		หญิง	44	0.13	10	0.17	13	0.15	15	0.14	4	0.08	2	0.07
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	635	0.97	105	0.90	137	0.81	245	1.12	96	1.02	52	0.93
		ชาย	396	1.23	68	1.19	86	1.05	150	1.37	56	1.21	36	1.38
		หญิง	239	0.71	37	0.62	51	0.58	95	0.86	40	0.84	16	0.54
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	237	0.36	46	0.39	50	0.30	110	0.50	15	0.16	16	0.29
		ชาย	161	0.50	30	0.52	29	0.35	81	0.74	13	0.28	8	0.31
		หญิง	76	0.23	16	0.27	21	0.24	29	0.26	2	0.04	8	0.27

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	รวม	38	0.06	9	0.08	5	0.03	13	0.06	10	0.11	1	0.02
		ชาย	25	0.08	5	0.09	3	0.04	8	0.07	8	0.17	1	0.04
		หญิง	13	0.04	4	0.07	2	0.02	5	0.05	2	0.04	0	0.00
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นส่วนมาก	รวม	740	1.13	109	0.93	180	1.06	306	1.39	84	0.89	61	1.10
		ชาย	345	1.07	55	0.96	70	0.85	146	1.34	27	0.58	47	1.80
		หญิง	395	1.18	54	0.91	110	1.26	160	1.45	57	1.19	14	0.47
025	Relapsing fevers (A68) โรคไข้กลับซ้ำ	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
026	Trachoma (A71) โรคสีดวงตา	รวม	6	0.01	2	0.02	1	0.01	3	0.01	0	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5	0.01	2	0.03	1	0.01	2	0.02	0	0.00	0	0.00
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	10,629	16.21	2,846	24.38	563	3.32	5,183	23.59	1,958	20.81	79	1.42
		ชาย	5,926	18.46	1,594	27.89	306	3.72	2,836	25.99	1,152	24.87	38	1.45
		หญิง	4,703	14.05	1,252	21.02	257	2.95	2,347	21.22	806	16.87	41	1.39
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	14	0.02	3	0.03	1	0.01	3	0.01	3	0.03	4	0.07
		ชาย	10	0.03	1	0.02	1	0.01	2	0.02	2	0.04	4	0.15
		หญิง	4	0.01	2	0.03	0	0.00	1	0.01	1	0.02	0	0.00

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	3	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01	1	0.01	0	0.00
		ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	2	0.02	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	709	1.08	146	1.25	144	0.85	259	1.18	105	1.12	55	0.99
		ชาย	381	1.19	84	1.47	73	0.89	146	1.34	49	1.06	29	1.11
		หญิง	328	0.98	62	1.04	71	0.81	113	1.02	56	1.17	26	0.88
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	121	0.18	18	0.15	36	0.21	25	0.11	38	0.40	4	0.07
		ชาย	67	0.21	9	0.16	19	0.23	16	0.15	20	0.43	3	0.11
		หญิง	54	0.16	9	0.15	17	0.19	9	0.08	18	0.38	1	0.03
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออก ที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	171,009	260.86	19,593	167.87	35,902	211.88	65,563	298.45	44,618	474.15	5,333	95.86
		ชาย	89,104	277.63	10,082	176.38	19,248	234.09	34,113	312.68	22,546	486.82	3,115	119.12
		หญิง	81,905	244.77	9,511	159.71	16,654	190.94	31,450	284.41	22,072	461.86	2,218	75.24
033	Herpesviral infections (B00) เริม	รวม	2,008	3.06	515	4.41	417	2.46	734	3.34	227	2.41	115	2.07
		ชาย	1,019	3.17	262	4.58	195	2.37	379	3.47	126	2.72	57	2.18
		หญิง	989	2.96	253	4.25	222	2.55	355	3.21	101	2.11	58	1.97
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	6,279	9.58	1,142	9.78	1,275	7.52	2,468	11.23	1,084	11.52	310	5.57
		ชาย	3,112	9.70	559	9.78	677	8.23	1,174	10.76	555	11.98	147	5.62
		หญิง	3,167	9.46	583	9.79	598	6.86	1,294	11.70	529	11.07	163	5.53

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
035	Measles (B05) หัด	รวม	4,502	6.87	344	2.95	843	4.98	192	0.87	3,003	31.91	120	2.16
		ชาย	2,492	7.76	165	2.89	560	6.81	85	0.78	1,620	34.98	62	2.37
		หญิง	2,010	6.01	179	3.01	283	3.24	107	0.97	1,383	28.94	58	1.97
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	36	0.05	5	0.04	10	0.06	11	0.05	7	0.07	3	0.05
		ชาย	14	0.04	3	0.05	3	0.04	4	0.04	3	0.06	1	0.04
		หญิง	22	0.07	2	0.03	7	0.08	7	0.06	4	0.08	2	0.07
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	876	1.34	170	1.46	204	1.20	380	1.73	89	0.95	33	0.59
		ชาย	550	1.71	102	1.78	131	1.59	243	2.23	58	1.25	16	0.61
		หญิง	326	0.97	68	1.14	73	0.84	137	1.24	31	0.65	17	0.58
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	6,412	9.78	1,277	10.94	1,394	8.23	2,898	13.19	516	5.48	327	5.88
		ชาย	3,884	12.10	756	13.23	802	9.75	1,820	16.68	310	6.69	196	7.49
		หญิง	2,528	7.55	521	8.75	592	6.79	1,078	9.75	206	4.31	131	4.44
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	รวม	26,732	40.78	4,941	42.34	7,229	42.66	9,497	43.23	3,192	33.92	1,873	33.67
		ชาย	17,007	52.99	3,126	54.69	4,377	53.23	6,205	56.88	2,041	44.07	1,258	48.11
		หญิง	9,725	29.06	1,815	30.48	2,852	32.70	3,292	29.77	1,151	24.09	615	20.86
040	Mumps (B26) คางทูม	รวม	158	0.24	89	0.76	17	0.10	27	0.12	24	0.26	1	0.02
		ชาย	101	0.31	56	0.98	12	0.15	14	0.13	18	0.39	1	0.04
		หญิง	57	0.17	33	0.55	5	0.06	13	0.12	6	0.13	0	0.00

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	รวม	49,808	75.98	7,737	66.29	11,851	69.94	16,229	73.88	11,824	125.65	2,167	38.95
		ชาย	26,154	81.49	4,181	73.14	6,189	75.27	8,541	78.29	6,064	130.94	1,179	45.08
		หญิง	23,654	70.69	3,556	59.71	5,662	64.92	7,688	69.52	5,760	120.53	988	33.51
042	Mycoses (B35-B49) โรคติดเชื้อรา	รวม	2,534	3.87	515	4.41	463	2.73	1,006	4.58	224	2.38	326	5.86
		ชาย	1,530	4.77	304	5.32	274	3.33	640	5.87	128	2.76	184	7.04
		หญิง	1,004	3.00	211	3.54	189	2.17	366	3.31	96	2.01	142	4.82
043	Malaria (B50-B54) มาลาเรีย	รวม	1,259	1.92	188	1.61	390	2.30	256	1.17	413	4.39	12	0.22
		ชาย	867	2.70	121	2.12	248	3.02	233	2.14	256	5.53	9	0.34
		หญิง	392	1.17	67	1.13	142	1.63	23	0.21	157	3.29	3	0.10
044	Leishmaniasis (B55) โรคพิษมาเนีย	รวม	8	0.01	2	0.02	0	0.00	1	0.00	5	0.05	0	0.00
		ชาย	4	0.01	2	0.03	0	0.00	0	0.00	2	0.04	0	0.00
		หญิง	4	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.01	3	0.06	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57) โรคทริปาโนโซม	รวม	5	0.01	2	0.02	0	0.00	2	0.01	1	0.01	0	0.00
		ชาย	2	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.01	1	0.02	0	0.00
		หญิง	3	0.01	2	0.03	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
046	Schistosomiasis (B65) โรคติดเชื้อซิสโตโซม	รวม	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
047	Other fluke infections (B66)	รวม	54	0.08	14	0.12	2	0.01	36	0.16	0	0.00	2	0.04
	โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	ชาย	19	0.06	8	0.14	0	0.00	11	0.10	0	0.00	0	0.00
		หญิง	35	0.10	6	0.10	2	0.02	25	0.23	0	0.00	2	0.07
048	Echinococcosis (B67)	รวม	5	0.01	1	0.01	3	0.02	1	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิเอโคโคคคัส	ชาย	2	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.01	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3	0.01	1	0.02	2	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
049	Dracunculiasis (B72)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิตราคันคูลัส	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
050	Onchocerciasis (B73)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	โรคพยาธิออนโคเซอร์คา	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
051	Filariasis (B74)	รวม	4	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.00	2	0.02	0	0.00
	โรคพยาธิฟิลาเรีย	ชาย	3	0.01	0	0.00	1	0.01	1	0.01	1	0.02	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
052	Hookworm diseases (B76)	รวม	57	0.09	9	0.08	12	0.07	14	0.06	22	0.23	0	0.00
	โรคพยาธิปากขอ	ชาย	30	0.09	5	0.09	4	0.05	7	0.06	14	0.30	0	0.00
		หญิง	27	0.08	4	0.07	8	0.09	7	0.06	8	0.17	0	0.00

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
053	Other helminthiasis	รวม	2,169	3.31	473	4.05	144	0.85	1,365	6.21	161	1.71	26	0.47
	(B68-B71, B75, B77-B83)	ชาย	1,353	4.22	317	5.55	85	1.03	845	7.75	92	1.99	14	0.54
	โรคพยาธิตัวตืดอื่น ๆ	หญิง	816	2.44	156	2.62	59	0.68	520	4.70	69	1.44	12	0.41
054	Sequelae of tuberculosis (B90)	รวม	220	0.34	38	0.33	43	0.25	89	0.41	33	0.35	17	0.31
	ผลตามหลังวัณโรค	ชาย	143	0.45	29	0.51	29	0.35	48	0.44	23	0.50	14	0.54
		หญิง	77	0.23	9	0.15	14	0.16	41	0.37	10	0.21	3	0.10
055	Sequelae of poliomyelitis (B91)	รวม	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00
	ผลตามหลังโรคโปลิโอ	ชาย	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
056	Sequelae of leprosy (B92)	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ผลตามหลังโรคเรื้อน	ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
057	Other infectious and parasitic	รวม	2,495	3.81	395	3.38	438	2.58	564	2.57	966	10.27	132	2.37
	diseases (A65-A67, A69-A70, A74,	ชาย	1,456	4.54	237	4.15	251	3.05	321	2.94	577	12.46	70	2.68
	A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99)	หญิง	1,039	3.11	158	2.65	187	2.14	243	2.20	389	8.14	62	2.10
โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ														
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00 - D48)														
058	Malignant neoplasms of lip,	รวม	21,506	32.81	3,518	30.14	5,648	33.33	6,174	28.10	2,424	25.76	3,742	67.26
	oral cavity and pharynx (C00-C14)	ชาย	16,137	50.28	2,642	46.22	4,451	54.13	4,213	38.62	1,845	39.84	2,986	114.18
	เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก	หญิง	5,369	16.05	876	14.71	1,197	13.72	1,961	17.73	579	12.12	756	25.64
และคอหอย														

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	8,678	13.24	1,382	11.84	3,075	18.15	1,673	7.62	1,319	14.02	1,229	22.09
		ชาย	7,674	23.91	1,186	20.75	2,680	32.59	1,496	13.71	1,190	25.69	1,122	42.90
		หญิง	1,004	3.00	196	3.29	395	4.53	177	1.60	129	2.70	107	3.63
060	Malignant neoplasm of stomach (C16) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	รวม	10,594	16.16	2,695	23.09	2,175	12.84	3,537	16.10	688	7.31	1,499	26.95
		ชาย	6,013	18.74	1,535	26.85	1,173	14.27	2,200	20.17	469	10.13	636	24.32
		หญิง	4,581	13.69	1,160	19.48	1,002	11.49	1,337	12.09	219	4.58	863	29.27
061	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	รวม	59,181	90.27	11,065	94.81	13,711	80.92	18,364	83.59	6,717	71.38	9,324	167.60
		ชาย	30,550	95.19	5,877	102.82	6,934	84.33	9,251	84.79	3,502	75.62	4,986	190.66
		หญิง	28,631	85.56	5,188	87.12	6,777	77.70	9,113	82.41	3,215	67.27	4,338	147.15
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21) เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็คตัมและ ซิกมอยด์ เร็คตัม ทวารหนักและ ช่องทวารหนัก	รวม	43,192	65.88	8,717	74.69	8,910	52.58	14,336	65.26	4,378	46.52	6,851	123.15
		ชาย	25,597	79.75	5,202	91.01	5,248	63.82	8,363	76.66	2,703	58.36	4,081	156.06
		หญิง	17,595	52.58	3,515	59.03	3,662	41.99	5,973	54.01	1,675	35.05	2,770	93.96
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22) เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	รวม	43,880	66.93	9,272	79.44	7,353	43.39	17,549	79.88	2,799	29.74	6,907	124.16
		ชาย	30,034	93.58	6,579	115.10	4,975	60.50	11,702	107.26	2,013	43.47	4,765	182.21
		หญิง	13,846	41.38	2,693	45.22	2,378	27.26	5,847	52.88	786	16.45	2,142	72.66
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25) เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	รวม	6,076	9.27	1,303	11.16	1,206	7.12	1,438	6.55	649	6.90	1,480	26.60
		ชาย	3,244	10.11	722	12.63	596	7.25	772	7.08	375	8.10	779	29.79
		หญิง	2,832	8.46	581	9.76	610	6.99	666	6.02	274	5.73	701	23.78

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	รวม	6,821	10.40	1,286	11.02	1,148	6.78	2,928	13.33	547	5.81	912	16.39
		ชาย	3,554	11.07	747	13.07	514	6.25	1,658	15.20	236	5.10	399	15.26
		หญิง	3,267	9.76	539	9.05	634	7.27	1,270	11.48	311	6.51	513	17.40
066	Malignant neoplasm of larynx (C32) เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	รวม	4,436	6.77	779	6.67	1,305	7.70	1,026	4.67	535	5.69	791	14.22
		ชาย	4,207	13.11	736	12.88	1,249	15.19	961	8.81	514	11.10	747	28.57
		หญิง	229	0.68	43	0.72	56	0.64	65	0.59	21	0.44	44	1.49
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	รวม	33,091	50.48	8,874	76.03	7,051	41.61	9,562	43.53	3,755	39.90	3,849	69.19
		ชาย	20,199	62.94	4,992	87.33	4,359	53.01	6,079	55.72	2,470	53.33	2,299	87.91
		หญิง	12,892	38.53	3,882	65.19	2,692	30.86	3,483	31.50	1,285	26.89	1,550	52.58
068	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	รวม	2,102	3.21	404	3.46	339	2.00	611	2.78	172	1.83	576	10.35
		ชาย	1,398	4.36	253	4.43	236	2.87	406	3.72	101	2.18	402	15.37
		หญิง	704	2.10	151	2.54	103	1.18	205	1.85	71	1.49	174	5.90
069	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage (C40-C41) เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	รวม	2,642	4.03	434	3.72	245	1.45	797	3.63	296	3.15	870	15.64
		ชาย	1,583	4.93	287	5.02	147	1.79	472	4.33	188	4.06	489	18.70
		หญิง	1,059	3.16	147	2.47	98	1.12	325	2.94	108	2.26	381	12.92
070	Malignant melanoma of skin (C43) เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	รวม	722	1.10	120	1.03	98	0.58	324	1.47	57	0.61	123	2.21
		ชาย	429	1.34	75	1.31	38	0.46	232	2.13	28	0.60	56	2.14
		หญิง	293	0.88	45	0.76	60	0.69	92	0.83	29	0.61	67	2.27

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
071	Other malignant neoplasms of skin (C44) เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	รวม	2,278	3.47	413	3.54	493	2.91	732	3.33	255	2.71	385	6.92
		ชาย	1,096	3.41	195	3.41	217	2.64	370	3.39	126	2.72	188	7.19
		หญิง	1,182	3.53	218	3.66	276	3.16	362	3.27	129	2.70	197	6.68
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49) เนื้องอกร้ายที่เมโสทีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	รวม	4,747	7.24	921	7.89	767	4.53	1,138	5.18	529	5.62	1,392	25.02
		ชาย	1,843	5.74	327	5.72	298	3.62	509	4.67	240	5.18	469	17.93
		หญิง	2,904	8.68	594	9.97	469	5.38	629	5.69	289	6.05	923	31.31
073	Malignant neoplasm of breast (C50) เนื้องอกร้ายที่เต้านม	รวม	35,858	54.70	8,895	76.21	7,262	42.86	10,722	48.81	4,027	42.79	4,952	89.01
		ชาย	233	0.73	76	1.33	57	0.69	57	0.52	20	0.43	23	0.88
		หญิง	35,625	106.46	8,819	148.09	7,205	82.61	10,665	96.45	4,007	83.85	4,929	167.19
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53) เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	รวม	15,835	24.15	3,278	28.09	3,975	23.46	4,250	19.35	1,423	15.12	2,909	52.29
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	15,835	47.32	3,278	55.05	3,975	45.57	4,250	38.43	1,423	29.78	2,909	98.68
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก	รวม	9,083	13.86	1,578	13.52	1,827	10.78	2,581	11.75	695	7.39	2,402	43.18
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,083	27.14	1,578	26.50	1,827	20.95	2,581	23.34	695	14.54	2,402	81.48
076	Other malignant neoplasms of female genital organs (C51-C52, C56-C58) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	รวม	17,656	26.93	2,769	23.73	3,413	20.14	5,557	25.30	1,396	14.83	4,521	81.27
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	17,656	52.76	2,769	46.50	3,413	39.13	5,557	50.25	1,396	29.21	4,521	153.36

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
077	Malignant neoplasm of prostate (C61) เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	รวม	6,963	10.62	1,281	10.98	1,380	8.14	1,738	7.91	1,014	10.78	1,550	27.86
		ชาย	6,963	21.70	1,281	22.41	1,380	16.78	1,738	15.93	1,014	21.89	1,550	59.27
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	2,112	3.22	365	3.13	382	2.25	766	3.49	282	3.00	317	5.70
		ชาย	2,112	6.58	365	6.39	382	4.65	766	7.02	282	6.09	317	12.12
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	รวม	9,463	14.43	1,869	16.01	1,923	11.35	2,544	11.58	1,351	14.36	1,776	31.92
		ชาย	7,562	23.56	1,454	25.44	1,525	18.55	2,106	19.30	1,144	24.70	1,333	50.97
		หญิง	1,901	5.68	415	6.97	398	4.56	438	3.96	207	4.33	443	15.03
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	รวม	2,974	4.54	520	4.46	514	3.03	797	3.63	441	4.69	702	12.62
		ชาย	1,877	5.85	360	6.30	273	3.32	531	4.87	299	6.46	414	15.83
		หญิง	1,097	3.28	160	2.69	241	2.76	266	2.41	142	2.97	288	9.77
081	Malignant neoplasm of the eye and adnexa (C69) เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	รวม	672	1.03	82	0.70	20	0.12	152	0.69	86	0.91	332	5.97
		ชาย	411	1.28	54	0.94	13	0.16	92	0.84	71	1.53	181	6.92
		หญิง	261	0.78	28	0.47	7	0.08	60	0.54	15	0.31	151	5.12
082	Malignant neoplasm of brain (C71) เนื้องอกร้ายของสมอง	รวม	3,763	5.74	593	5.08	596	3.52	1,146	5.22	463	4.92	965	17.35
		ชาย	2,075	6.47	327	5.72	326	3.96	640	5.87	245	5.29	537	20.53
		หญิง	1,688	5.04	266	4.47	270	3.10	506	4.58	218	4.56	428	14.52

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72) เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	292	0.45	42	0.36	66	0.39	112	0.51	19	0.20	53	0.95
		ชาย	116	0.36	18	0.31	22	0.27	34	0.31	9	0.19	33	1.26
		หญิง	176	0.53	24	0.40	44	0.50	78	0.71	10	0.21	20	0.68
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุเนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	รวม	28,810	43.95	5,588	47.88	5,059	29.86	8,644	39.35	2,515	26.73	7,004	125.90
		ชาย	12,576	39.18	2,591	45.33	2,273	27.64	3,874	35.51	1,070	23.10	2,768	105.85
		หญิง	16,234	48.51	2,997	50.33	2,786	31.94	4,770	43.14	1,445	30.24	4,236	143.69
085	Hodgkin's disease (C81) โรคฮอดจ์กิน	รวม	2,054	3.13	275	2.36	394	2.33	724	3.30	202	2.15	459	8.25
		ชาย	1,181	3.68	170	2.97	242	2.94	408	3.74	123	2.66	238	9.10
		หญิง	873	2.61	105	1.76	152	1.74	316	2.86	79	1.65	221	7.50
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85) เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดจ์กิน	รวม	19,189	29.27	3,690	31.62	3,505	20.69	6,466	29.43	1,976	21.00	3,552	63.85
		ชาย	10,948	34.11	2,183	38.19	1,903	23.14	3,807	34.90	1,164	25.13	1,891	72.31
		หญิง	8,241	24.63	1,507	25.31	1,602	18.37	2,659	24.05	812	16.99	1,661	56.34
087	Leukaemia (C91-C95) ลิวคีเมีย	รวม	19,508	29.76	3,202	27.44	4,118	24.30	6,415	29.20	2,953	31.38	2,820	50.69
		ชาย	10,856	33.82	1,851	32.38	2,331	28.35	3,518	32.25	1,614	34.85	1,542	58.97
		หญิง	8,652	25.86	1,351	22.69	1,787	20.49	2,897	26.20	1,339	28.02	1,278	43.35
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์ระบบสร้างเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อ	รวม	5,303	8.09	965	8.27	1,088	6.42	2,014	9.17	498	5.29	738	13.27
		ชาย	2,756	8.59	520	9.10	495	6.02	1,082	9.92	296	6.39	363	13.88
		หญิง	2,547	7.61	445	7.47	593	6.80	932	8.43	202	4.23	375	12.72

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06) มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	รวม	1,003	1.53	176	1.51	352	2.08	245	1.12	113	1.20	117	2.10
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,003	3.00	176	2.96	352	4.04	245	2.22	113	2.36	117	3.97
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23) เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	รวม	688	1.05	120	1.03	105	0.62	243	1.11	101	1.07	119	2.14
		ชาย	296	0.92	44	0.77	55	0.67	89	0.82	44	0.95	64	2.45
		หญิง	392	1.17	76	1.28	50	0.57	154	1.39	57	1.19	55	1.87
091	Benign neoplasm of breast (D24) เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	รวม	1,189	1.81	252	2.16	192	1.13	375	1.71	212	2.25	158	2.84
		ชาย	6	0.02	4	0.07	0	0.00	1	0.01	1	0.02	0	0.00
		หญิง	1,183	3.54	248	4.16	192	2.20	374	3.38	211	4.42	158	5.36
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	15,825	24.14	2,253	19.30	2,895	17.09	6,789	30.90	2,063	21.92	1,825	32.81
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	15,825	47.29	2,253	37.83	2,895	33.19	6,789	61.39	2,063	43.17	1,825	61.91
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	2,393	3.65	425	3.64	392	2.31	802	3.65	356	3.78	418	7.51
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,393	7.15	425	7.14	392	4.49	802	7.25	356	7.45	418	14.18
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	157	0.24	18	0.15	33	0.19	41	0.19	25	0.27	40	0.72
		ชาย	84	0.26	10	0.17	23	0.28	23	0.21	19	0.41	9	0.34
		หญิง	73	0.22	8	0.13	10	0.11	18	0.16	6	0.13	31	1.05

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	1,163	1.77	163	1.40	279	1.65	269	1.22	150	1.59	302	5.43
		ชาย	467	1.46	61	1.07	111	1.35	123	1.13	60	1.30	112	4.28
		หญิง	696	2.08	102	1.71	168	1.93	146	1.32	90	1.88	190	6.44
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	44,138	67.33	8,599	73.68	8,767	51.74	15,306	69.67	4,797	50.98	6,669	119.88
		ชาย	18,826	58.66	3,755	65.69	3,746	45.56	6,768	62.04	1,991	42.99	2,566	98.12
		หญิง	25,312	75.64	4,844	81.34	5,021	57.57	8,538	77.21	2,806	58.72	4,103	139.18
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน (D50 - D89)														
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	11,880	18.12	2,279	19.53	3,171	18.71	4,715	21.46	1,316	13.98	399	7.17
		ชาย	4,222	13.15	855	14.96	1,054	12.82	1,708	15.66	467	10.08	138	5.28
		หญิง	7,658	22.89	1,424	23.91	2,117	24.27	3,007	27.19	849	17.77	261	8.85
098	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	รวม	161,276	246.01	44,340	379.91	35,734	210.89	60,713	276.37	15,193	161.45	5,296	95.20
		ชาย	69,928	217.88	20,331	355.68	15,460	188.02	25,065	229.75	6,529	140.98	2,543	97.24
		หญิง	91,348	272.99	24,009	403.17	20,274	232.45	35,648	322.37	8,664	181.30	2,753	93.38
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77) ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	รวม	23,461	35.79	4,968	42.57	5,321	31.40	8,658	39.41	2,745	29.17	1,769	31.80
		ชาย	10,898	33.96	2,398	41.95	2,147	26.11	4,277	39.20	1,229	26.54	847	32.39
		หญิง	12,563	37.54	2,570	43.16	3,174	36.39	4,381	39.62	1,516	31.72	922	31.27

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	รวม	1,058	1.61	156	1.34	263	1.55	239	1.09	77	0.82	323	5.81
		ชาย	815	2.54	113	1.98	227	2.76	202	1.85	54	1.17	219	8.37
		หญิง	243	0.73	43	0.72	36	0.41	37	0.33	23	0.48	104	3.53
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00 - E90)														
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders (E00-E02) การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับ ต่อมไทรอยด์	รวม	39	0.06	10	0.09	8	0.05	14	0.06	5	0.05	2	0.04
		ชาย	10	0.03	5	0.09	1	0.01	4	0.04	0	0.00	0	0.00
		หญิง	29	0.09	5	0.08	7	0.08	10	0.09	5	0.10	2	0.07
102	Thyrotoxicosis (E05) โรคพิษไทรอยด์	รวม	5,071	7.74	867	7.43	1,055	6.23	2,127	9.68	642	6.82	380	6.83
		ชาย	1,596	4.97	254	4.44	325	3.95	651	5.97	223	4.82	143	5.47
		หญิง	3,475	10.38	613	10.29	730	8.37	1,476	13.35	419	8.77	237	8.04
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อื่น ๆ	รวม	8,314	12.68	1,545	13.24	1,471	8.68	3,096	14.09	1,256	13.35	946	17.00
		ชาย	1,132	3.53	220	3.85	228	2.77	376	3.45	166	3.58	142	5.43
		หญิง	7,182	21.46	1,325	22.25	1,243	14.25	2,720	24.60	1,090	22.81	804	27.27
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	รวม	124,364	189.70	22,161	189.88	26,357	155.55	54,547	248.30	15,872	168.67	5,427	97.55
		ชาย	50,622	157.73	9,610	168.12	10,414	126.65	21,934	201.05	6,219	134.28	2,445	93.50
		หญิง	73,742	220.37	12,551	210.76	15,943	182.79	32,613	294.92	9,653	201.99	2,982	101.15
105	Malnutrition (E40-E46) ทุพโภชนาการ	รวม	560	0.85	86	0.74	110	0.65	102	0.46	119	1.26	143	2.57
		ชาย	298	0.93	45	0.79	45	0.55	53	0.49	60	1.30	95	3.63
		หญิง	262	0.78	41	0.69	65	0.75	49	0.44	59	1.23	48	1.63

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
106	Vitamin A deficiency (E50) การขาดวิตามินเอ	รวม	10	0.02	1	0.01	1	0.01	4	0.02	3	0.03	1	0.02
		ชาย	3	0.01	1	0.02	0	0.00	0	0.00	2	0.04	0	0.00
		หญิง	7	0.02	0	0.00	1	0.01	4	0.04	1	0.02	1	0.03
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) การขาดวิตามินอื่น ๆ	รวม	401	0.61	74	0.63	73	0.43	171	0.78	35	0.37	48	0.86
		ชาย	309	0.96	58	1.01	54	0.66	136	1.25	24	0.52	37	1.41
		หญิง	92	0.27	16	0.27	19	0.22	35	0.32	11	0.23	11	0.37
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการ และภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	4	0.01	2	0.02	0	0.00	2	0.01	0	0.00	0	0.00
		ชาย	3	0.01	1	0.02	0	0.00	2	0.02	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
109	Obesity (E66) โรคอ้วน	รวม	975	1.49	90	0.77	84	0.50	96	0.44	403	4.28	302	5.43
		ชาย	397	1.24	52	0.91	32	0.39	41	0.38	115	2.48	157	6.00
		หญิง	578	1.73	38	0.64	52	0.60	55	0.50	288	6.03	145	4.92
110	Volume depletion (E86) การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	รวม	944	1.44	176	1.51	200	1.18	385	1.75	75	0.80	108	1.94
		ชาย	466	1.45	92	1.61	89	1.08	208	1.91	31	0.67	46	1.76
		หญิง	478	1.43	84	1.41	111	1.27	177	1.60	44	0.92	62	2.10
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและ เมตาบอลิซึมอื่น ๆ	รวม	79,617	121.45	19,606	167.99	19,026	112.28	30,249	137.70	6,466	68.71	4,270	76.76
		ชาย	34,707	108.14	8,707	152.32	7,985	97.11	13,409	122.91	2,770	59.81	1,836	70.21
		หญิง	44,910	134.21	10,899	183.02	11,041	126.59	16,840	152.29	3,696	77.34	2,434	82.56

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F00 - F99)														
112	Dementia (F00-F03) สมองเสื่อม	รวม	1,615	2.46	301	2.58	337	1.99	642	2.92	126	1.34	209	3.76
		ชาย	724	2.26	142	2.48	168	2.04	271	2.48	60	1.30	83	3.17
		หญิง	891	2.66	159	2.67	169	1.94	371	3.36	66	1.38	126	4.27
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาท ที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	รวม	46,908	71.55	10,387	89.00	7,463	44.04	25,826	117.56	2,137	22.71	1,095	19.68
		ชาย	42,565	132.62	9,401	164.47	6,556	79.73	23,598	216.30	2,019	43.59	991	37.90
		หญิง	4,343	12.98	986	16.56	907	10.40	2,228	20.15	118	2.47	104	3.53
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาท ที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท อื่น ๆ	รวม	17,443	26.61	2,683	22.99	3,253	19.20	6,628	30.17	3,473	36.91	1,406	25.27
		ชาย	15,287	47.63	2,334	40.83	2,749	33.43	5,849	53.61	3,176	68.58	1,179	45.08
		หญิง	2,156	6.44	349	5.86	504	5.78	779	7.04	297	6.21	227	7.70
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภท และความหลงผิด	รวม	38,056	58.05	5,304	45.45	6,101	36.01	18,153	82.63	4,221	44.86	4,277	76.88
		ชาย	26,648	83.03	3,493	61.11	3,844	46.75	13,504	123.78	3,124	67.45	2,683	102.60
		หญิง	11,408	34.09	1,811	30.41	2,257	25.88	4,649	42.04	1,097	22.96	1,594	54.07
116	Mood [affective] disorders (F30-F39) ความผิดปกติทางอารมณ์	รวม	15,034	22.93	3,436	29.44	2,255	13.31	5,796	26.38	2,156	22.91	1,391	25.00
		ชาย	4,400	13.71	1,050	18.37	672	8.17	1,520	13.93	709	15.31	449	17.17
		หญิง	10,634	31.78	2,386	40.07	1,583	18.15	4,276	38.67	1,447	30.28	942	31.95
117	Neurotic, stress-related, and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ และความเครียด	รวม	7,307	11.15	1,420	12.17	1,355	8.00	2,954	13.45	1,242	13.20	336	6.04
		ชาย	2,266	7.06	431	7.54	549	6.68	753	6.90	378	8.16	155	5.93
		หญิง	5,041	15.06	989	16.61	806	9.24	2,201	19.90	864	18.08	181	6.14

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	2,517	3.84	252	2.16	328	1.94	426	1.94	80	0.85	1,431	25.72
		ชาย	1,593	4.96	164	2.87	206	2.51	236	2.16	41	0.89	946	36.17
		หญิง	924	2.76	88	1.48	122	1.40	190	1.72	39	0.82	485	16.45
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99) ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	12,250	18.69	2,194	18.80	2,842	16.77	3,047	13.87	651	6.92	3,516	63.20
		ชาย	8,066	25.13	1,473	25.77	2,054	24.98	1,702	15.60	367	7.92	2,470	94.45
		หญิง	4,184	12.50	721	12.11	788	9.03	1,345	12.16	284	5.94	1,046	35.48
โรกระบบประสาท (G00 - G99)														
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09) การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	12,202	18.61	2,691	23.06	2,223	13.12	5,477	24.93	1,104	11.73	707	12.71
		ชาย	7,225	22.51	1,595	27.90	1,280	15.57	3,344	30.65	653	14.10	353	13.50
		หญิง	4,977	14.87	1,096	18.40	943	10.81	2,133	19.29	451	9.44	354	12.01
121	Parkinson's disease (G20) โรคพาร์กินสัน	รวม	1,308	2.00	264	2.26	208	1.23	522	2.38	140	1.49	174	3.13
		ชาย	655	2.04	147	2.57	100	1.22	243	2.23	67	1.45	98	3.75
		หญิง	653	1.95	117	1.96	108	1.24	279	2.52	73	1.53	76	2.58
122	Alzheimer's disease (G30) โรคอัลไซเมอร์	รวม	579	0.88	153	1.31	148	0.87	151	0.69	50	0.53	77	1.38
		ชาย	236	0.74	72	1.26	43	0.52	68	0.62	19	0.41	34	1.30
		หญิง	343	1.03	81	1.36	105	1.20	83	0.75	31	0.65	43	1.46
123	Multiple sclerosis (G35) โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	รวม	206	0.31	47	0.40	44	0.26	59	0.27	8	0.09	48	0.86
		ชาย	55	0.17	13	0.23	17	0.21	10	0.09	2	0.04	13	0.50
		หญิง	151	0.45	34	0.57	27	0.31	49	0.44	6	0.13	35	1.19

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
124	Epilepsy (G40-G41) ลมบ้าหมู	รวม	43,510	66.37	8,408	72.04	10,311	60.85	15,706	71.50	6,451	68.55	2,634	47.35
		ชาย	28,111	87.59	5,521	96.59	6,637	80.72	10,338	94.76	4,013	86.65	1,602	61.26
		หญิง	15,399	46.02	2,887	48.48	3,674	42.12	5,368	48.54	2,438	51.02	1,032	35.01
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44) โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	รวม	8,316	12.69	1,220	10.45	1,307	7.71	4,176	19.01	1,383	14.70	230	4.13
		ชาย	2,760	8.60	361	6.32	394	4.79	1,516	13.90	428	9.24	61	2.33
		หญิง	5,556	16.60	859	14.42	913	10.47	2,660	24.05	955	19.98	169	5.73
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45) โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว และกลุ่มอาการต่อเนื่อง	รวม	12,138	18.52	2,424	20.77	2,942	17.36	4,004	18.23	1,971	20.95	797	14.33
		ชาย	6,494	20.23	1,288	22.53	1,623	19.74	2,057	18.85	1,101	23.77	425	16.25
		หญิง	5,644	16.87	1,136	19.08	1,319	15.12	1,947	17.61	870	18.21	372	12.62
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59) ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท และปมประสาท	รวม	5,292	8.07	1,157	9.91	998	5.89	1,759	8.01	737	7.83	641	11.52
		ชาย	1,986	6.19	387	6.77	423	5.14	651	5.97	239	5.16	286	10.94
		หญิง	3,306	9.88	770	12.93	575	6.59	1,108	10.02	498	10.42	355	12.04
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83) สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	รวม	7,275	11.10	1,356	11.62	1,624	9.58	2,582	11.75	1,083	11.51	630	11.32
		ชาย	4,462	13.90	866	15.15	981	11.93	1,614	14.79	635	13.71	366	14.00
		หญิง	2,813	8.41	490	8.23	643	7.37	968	8.75	448	9.37	264	8.96
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99) โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	รวม	30,156	46.00	6,583	56.40	4,999	29.50	12,846	58.48	2,440	25.93	3,288	59.10
		ชาย	18,608	57.98	4,084	71.45	2,945	35.82	8,408	77.07	1,363	29.43	1,808	69.14
		หญิง	11,548	34.51	2,499	41.96	2,054	23.55	4,438	40.13	1,077	22.54	1,480	50.20

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00 - H59)														
130	Inflammation of eyelid (H00-H01) การอักเสบของหนังตา	รวม	1,608	2.45	248	2.12	323	1.91	719	3.27	253	2.69	65	1.17
		ชาย	744	2.32	124	2.17	146	1.78	346	3.17	100	2.16	28	1.07
		หญิง	864	2.58	124	2.08	177	2.03	373	3.37	153	3.20	37	1.26
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อตาอื่น ๆ	รวม	13,632	20.79	2,566	21.99	4,006	23.64	5,686	25.88	1,111	11.81	263	4.73
		ชาย	4,686	14.60	909	15.90	1,378	16.76	1,897	17.39	360	7.77	142	5.43
		หญิง	8,946	26.73	1,657	27.82	2,628	30.13	3,789	34.26	751	15.71	121	4.10
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	รวม	6,707	10.23	1,296	11.10	1,397	8.24	2,385	10.86	761	8.09	868	15.60
		ชาย	4,098	12.77	860	15.05	796	9.68	1,472	13.49	527	11.38	443	16.94
		หญิง	2,609	7.80	436	7.32	601	6.89	913	8.26	234	4.90	425	14.42
133	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	191,292	291.79	38,605	330.77	55,723	328.85	51,710	235.39	23,570	250.47	21,684	389.78
		ชาย	83,421	259.92	17,128	299.65	23,442	285.09	23,302	213.59	10,016	216.27	9,533	364.54
		หญิง	107,871	322.37	21,477	360.65	32,281	370.11	28,408	256.90	13,554	283.62	12,151	412.17
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	รวม	6,115	9.33	1,184	10.14	1,448	8.55	1,116	5.08	583	6.20	1,784	32.07
		ชาย	3,741	11.66	770	13.47	920	11.19	659	6.04	356	7.69	1,036	39.62
		หญิง	2,374	7.09	414	6.95	528	6.05	457	4.13	227	4.75	748	25.37
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	7,525	11.48	1,914	16.40	1,635	9.65	2,120	9.65	656	6.97	1,200	21.57
		ชาย	3,445	10.73	838	14.66	788	9.58	847	7.76	310	6.69	662	25.31
		หญิง	4,080	12.19	1,076	18.07	847	9.71	1,273	11.51	346	7.24	538	18.25

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
136	Strabismus (H49-H50)	รวม	2,359	3.60	250	2.14	517	3.05	469	2.13	296	3.15	827	14.87
	ตาเหล่	ชาย	1,197	3.73	116	2.03	259	3.15	229	2.10	155	3.35	438	16.75
		หญิง	1,162	3.47	134	2.25	258	2.96	240	2.17	141	2.95	389	13.20
137	Disorders of refraction and accommodation (H52)	รวม	77	0.12	11	0.09	19	0.11	17	0.08	10	0.11	20	0.36
	ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	ชาย	31	0.10	3	0.05	7	0.09	6	0.05	3	0.06	12	0.46
		หญิง	46	0.14	8	0.13	12	0.14	11	0.10	7	0.15	8	0.27
138	Blindness and low vision (H54)	รวม	48	0.07	10	0.09	14	0.08	9	0.04	4	0.04	11	0.20
	ตาบอดและสายตาเลือนราง	ชาย	29	0.09	7	0.12	10	0.12	4	0.04	1	0.02	7	0.27
		หญิง	19	0.06	3	0.05	4	0.05	5	0.05	3	0.06	4	0.14
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59)	รวม	18,078	27.58	2,932	25.12	4,462	26.33	5,597	25.48	2,036	21.64	3,051	54.84
	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	ชาย	8,249	25.70	1,347	23.57	2,038	24.79	2,445	22.41	971	20.97	1,448	55.37
		หญิง	9,829	29.37	1,585	26.62	2,424	27.79	3,152	28.50	1,065	22.29	1,603	54.37
		โรคของหูและปุ่มกกหู (H60 - H95)												
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75)	รวม	4,950	7.55	942	8.07	955	5.64	1,380	6.28	1,007	10.70	666	11.97
	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	ชาย	2,381	7.42	477	8.34	470	5.72	641	5.88	460	9.93	333	12.73
		หญิง	2,569	7.68	465	7.81	485	5.56	739	6.68	547	11.45	333	11.30
141	Hearing loss (H90-H91)	รวม	686	1.05	73	0.63	120	0.71	209	0.95	86	0.91	198	3.56
	การสูญเสียการได้ยิน	ชาย	319	0.99	39	0.68	48	0.58	92	0.84	35	0.76	105	4.02
		หญิง	367	1.10	34	0.57	72	0.83	117	1.06	51	1.07	93	3.15

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95) โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	19,463	29.69	3,071	26.31	4,472	26.39	6,796	30.94	4,145	44.05	979	17.60
		ชาย	5,792	18.05	953	16.67	1,274	15.49	2,023	18.54	1,214	26.21	328	12.54
		หญิง	13,671	40.86	2,118	35.57	3,198	36.67	4,773	43.16	2,931	61.33	651	22.08
โรกระบบไหลเวียนโลหิต (I00 - I99)														
143	Acute rheumatic fever (I00-I02) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	รวม	266	0.41	26	0.22	41	0.24	104	0.47	78	0.83	17	0.31
		ชาย	157	0.49	15	0.26	24	0.29	63	0.58	44	0.95	11	0.42
		หญิง	109	0.33	11	0.18	17	0.19	41	0.37	34	0.71	6	0.20
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09) โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	รวม	3,976	6.06	741	6.35	695	4.10	1,580	7.19	412	4.38	548	9.85
		ชาย	1,497	4.66	266	4.65	255	3.10	634	5.81	146	3.15	196	7.49
		หญิง	2,479	7.41	475	7.98	440	5.04	946	8.55	266	5.57	352	11.94
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	รวม	45,238	69.01	7,976	68.34	9,080	53.59	19,481	88.68	7,170	76.19	1,531	27.52
		ชาย	17,239	53.71	3,124	54.65	3,410	41.47	7,610	69.75	2,493	53.83	602	23.02
		หญิง	27,999	83.67	4,852	81.48	5,670	65.01	11,871	107.35	4,677	97.87	929	31.51
146	Other hypertensive diseases (I11-I15) โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	รวม	2,425	3.70	362	3.10	521	3.07	757	3.45	463	4.92	322	5.79
		ชาย	1,086	3.38	169	2.96	239	2.91	335	3.07	212	4.58	131	5.01
		หญิง	1,339	4.00	193	3.24	282	3.23	422	3.82	251	5.25	191	6.48
147	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	รวม	74,306	113.35	12,441	106.60	22,285	131.52	18,682	85.04	14,082	149.65	6,816	122.52
		ชาย	44,586	138.92	6,926	121.17	13,002	158.12	11,088	101.63	9,221	199.10	4,349	166.30
		หญิง	29,720	88.82	5,515	92.61	9,283	106.43	7,594	68.67	4,861	101.72	2,467	83.68

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	รวม	72,944	111.27	10,015	85.81	23,344	137.77	12,733	57.96	12,834	136.38	14,018	251.98
		ชาย	46,119	143.70	5,645	98.76	14,454	175.78	7,744	70.98	8,847	191.03	9,429	360.56
		หญิง	26,825	80.17	4,370	73.38	8,890	101.93	4,989	45.12	3,987	83.43	4,589	155.66
149	Pulmonary embolism (I26) ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	รวม	2,463	3.76	392	3.36	667	3.94	751	3.42	268	2.85	385	6.92
		ชาย	853	2.66	167	2.92	220	2.68	248	2.27	91	1.96	127	4.86
		หญิง	1,610	4.81	225	3.78	447	5.12	503	4.55	177	3.70	258	8.75
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ	รวม	52,666	80.34	10,070	86.28	12,924	76.27	19,218	87.48	5,599	59.50	4,855	87.27
		ชาย	21,893	68.21	4,278	74.84	5,284	64.26	7,756	71.09	2,387	51.54	2,188	83.67
		หญิง	30,773	91.96	5,792	97.26	7,640	87.60	11,462	103.65	3,212	67.21	2,667	90.47
151	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	รวม	116,715	178.04	22,903	196.24	33,242	196.18	32,349	147.26	20,380	216.57	7,841	140.95
		ชาย	50,628	157.74	9,385	164.19	13,926	169.36	14,818	135.82	8,985	194.01	3,514	134.37
		หญิง	66,087	197.50	13,518	227.00	19,316	221.46	17,531	158.54	11,395	238.44	4,327	146.77
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52) โรคหัวใจอื่น ๆ	รวม	23,125	35.27	4,404	37.73	5,581	32.94	7,097	32.31	2,462	26.16	3,581	64.37
		ชาย	13,428	41.84	2,543	44.49	3,254	39.57	4,280	39.23	1,358	29.32	1,993	76.21
		หญิง	9,697	28.98	1,861	31.25	2,327	26.68	2,817	25.47	1,104	23.10	1,588	53.87
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62) เลือดออกในสมอง	รวม	45,481	69.38	9,732	83.38	12,528	73.94	13,054	59.42	5,918	62.89	4,249	76.38
		ชาย	27,071	84.35	5,788	101.26	7,396	89.95	7,988	73.22	3,401	73.44	2,498	95.52
		หญิง	18,410	55.02	3,944	66.23	5,132	58.84	5,066	45.81	2,517	52.67	1,751	59.40

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
154	Cerebral infraction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	115,888	176.77	19,815	169.78	28,951	170.86	40,619	184.90	17,759	188.72	8,744	157.18
		ชาย	62,853	195.83	10,800	188.94	15,841	192.65	21,710	198.99	9,642	208.19	4,860	185.85
		หญิง	53,035	158.49	9,015	151.38	13,110	150.31	18,909	171.00	8,117	169.85	3,884	131.75
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจาก เลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจาก การขาดเลือด	รวม	18,512	28.24	3,480	29.82	3,978	23.48	7,149	32.54	3,095	32.89	810	14.56
		ชาย	9,708	30.25	1,769	30.95	2,173	26.43	3,695	33.87	1,621	35.00	450	17.21
		หญิง	8,804	26.31	1,711	28.73	1,805	20.69	3,454	31.24	1,474	30.84	360	12.21
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69) โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	รวม	7,896	12.04	1,681	14.40	1,607	9.48	2,288	10.42	1,114	11.84	1,206	21.68
		ชาย	4,118	12.83	871	15.24	856	10.41	1,244	11.40	564	12.18	583	22.29
		หญิง	3,778	11.29	810	13.60	751	8.61	1,044	9.44	550	11.51	623	21.13
157	Atherosclerosis (I70) ภาวะหลอดเลือดแข็ง	รวม	1,181	1.80	124	1.06	165	0.97	244	1.11	62	0.66	586	10.53
		ชาย	670	2.09	66	1.15	94	1.14	143	1.31	32	0.69	335	12.81
		หญิง	511	1.53	58	0.97	71	0.81	101	0.91	30	0.63	251	8.51
158	Other peripheral vascular diseases (I73) โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	รวม	691	1.05	84	0.72	125	0.74	121	0.55	110	1.17	251	4.51
		ชาย	404	1.26	43	0.75	66	0.80	65	0.60	68	1.47	162	6.19
		หญิง	287	0.86	41	0.69	59	0.68	56	0.51	42	0.88	89	3.02
159	Arterial embolism and thrombosis (I74) ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	รวม	3,615	5.51	724	6.20	795	4.69	1,010	4.60	451	4.79	635	11.41
		ชาย	2,097	6.53	424	7.42	460	5.59	581	5.33	263	5.68	369	14.11
		หญิง	1,518	4.54	300	5.04	335	3.84	429	3.88	188	3.93	266	9.02

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79) โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และแคปิลลารีอื่น ๆ	รวม	7,225	11.02	1,547	13.25	1,207	7.12	1,929	8.78	1,040	11.05	1,502	27.00
		ชาย	4,632	14.43	879	15.38	745	9.06	1,238	11.35	738	15.94	1,032	39.46
		หญิง	2,593	7.75	668	11.22	462	5.30	691	6.25	302	6.32	470	15.94
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82) หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบ มีลิ่มเลือดก่อนเลือดและลิ่มเลือด ในหลอดเลือดดำ	รวม	5,226	7.97	1,054	9.03	1,150	6.79	1,969	8.96	621	6.60	432	7.77
		ชาย	2,033	6.33	413	7.23	372	4.52	812	7.44	264	5.70	172	6.58
		หญิง	3,193	9.54	641	10.76	778	8.92	1,157	10.46	357	7.47	260	8.82
162	Varicose veins of lower extremities (I83) หลอดเลือดดำขอดของระยะส่วนล่าง	รวม	1,112	1.70	226	1.94	278	1.64	223	1.02	169	1.80	216	3.88
		ชาย	415	1.29	81	1.42	98	1.19	106	0.97	62	1.34	68	2.60
		หญิง	697	2.08	145	2.43	180	2.06	117	1.06	107	2.24	148	5.02
163	Haemorrhoids (I84, K64) ริดสีดวงทวาร	รวม	13,073	19.94	3,059	26.21	2,770	16.35	4,560	20.76	1,760	18.70	924	16.61
		ชาย	7,232	22.53	1,694	29.64	1,512	18.39	2,484	22.77	1,023	22.09	519	19.85
		หญิง	5,841	17.46	1,365	22.92	1,258	14.42	2,076	18.77	737	15.42	405	13.74
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99) โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	19,327	29.48	5,783	49.55	4,852	28.63	5,349	24.35	1,718	18.26	1,625	29.21
		ชาย	11,581	36.08	3,569	62.44	2,908	35.37	3,259	29.87	994	21.46	851	32.54
		หญิง	7,746	23.15	2,214	37.18	1,944	22.29	2,090	18.90	724	15.15	774	26.25
โรกระบบหายใจ (J00 - J99)														
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	รวม	52,152	79.55	11,029	94.50	12,181	71.89	17,522	79.76	9,715	103.24	1,705	30.65
		ชาย	27,197	84.74	5,859	102.50	6,605	80.33	9,002	82.51	4,854	104.81	877	33.54
		หญิง	24,955	74.58	5,170	86.82	5,576	63.93	8,520	77.05	4,861	101.72	828	28.09

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04) กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบ เฉียบพลัน	รวม	610	0.93	137	1.17	111	0.66	216	0.98	79	0.84	67	1.20
		ชาย	338	1.05	74	1.29	66	0.80	115	1.05	50	1.08	33	1.26
		หญิง	272	0.81	63	1.06	45	0.52	101	0.91	29	0.61	34	1.15
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน แบบเฉียบพลันอื่น ๆ	รวม	44,733	68.24	7,449	63.82	11,058	65.26	15,936	72.54	8,589	91.27	1,701	30.58
		ชาย	25,302	78.83	4,266	74.63	6,603	80.30	8,970	82.22	4,484	96.82	979	37.44
		หญิง	19,431	58.07	3,183	53.45	4,455	51.08	6,966	62.99	4,105	85.90	722	24.49
168	Influenza (J10-J11) ไข้หวัดใหญ่	รวม	87,238	133.07	15,293	131.03	23,308	137.55	31,554	143.64	11,624	123.53	5,459	98.13
		ชาย	45,223	140.90	8,220	143.80	12,157	147.85	16,085	147.44	5,891	127.20	2,870	109.75
		หญิง	42,015	125.56	7,073	118.77	11,151	127.85	15,469	139.89	5,733	119.96	2,589	87.82
169	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	รวม	351,297	535.86	62,760	537.73	75,242	444.05	135,659	617.53	62,304	662.09	15,332	275.60
		ชาย	190,585	593.82	34,718	607.37	40,507	492.63	72,742	666.76	34,290	740.40	8,328	318.46
		หญิง	160,712	480.28	28,042	470.89	34,735	398.25	62,917	568.97	28,014	586.20	7,004	237.58
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็ก อักเสบเฉียบพลัน	รวม	145,498	221.94	29,846	255.72	28,926	170.71	53,351	242.86	28,747	305.49	4,628	83.19
		ชาย	79,755	248.50	16,582	290.09	15,638	190.18	29,310	268.66	15,726	339.56	2,499	95.56
		หญิง	65,743	196.47	13,264	222.73	13,288	152.35	24,041	217.41	13,021	272.47	2,129	72.22
171	Chronic sinusitis (J32) ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	รวม	2,579	3.93	591	5.06	519	3.06	577	2.63	348	3.70	544	9.78
		ชาย	1,255	3.91	306	5.35	246	2.99	263	2.41	170	3.67	270	10.32
		หญิง	1,324	3.96	285	4.79	273	3.13	314	2.84	178	3.72	274	9.29

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34) โรคอื่นของจมูกและไซนัส	รวม	3,060	4.67	582	4.99	610	3.60	924	4.21	455	4.84	489	8.79
		ชาย	1,805	5.62	338	5.91	353	4.29	541	4.96	257	5.55	316	12.08
		หญิง	1,255	3.75	244	4.10	257	2.95	383	3.46	198	4.14	173	5.87
173	Chronic disease of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิล และต่อมน้ำเหลืองในคอ	รวม	7,498	11.44	1,283	10.99	1,532	9.04	2,319	10.56	1,156	12.28	1,208	21.71
		ชาย	4,014	12.51	672	11.76	847	10.30	1,170	10.72	584	12.61	741	28.34
		หญิง	3,484	10.41	611	10.26	685	7.85	1,149	10.39	572	11.97	467	15.84
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	5,572	8.50	1,099	9.42	865	5.10	1,707	7.77	868	9.22	1,033	18.57
		ชาย	3,294	10.26	637	11.14	526	6.40	1,031	9.45	520	11.23	580	22.18
		หญิง	2,278	6.81	462	7.76	339	3.89	676	6.11	348	7.28	453	15.37
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	รวม	159,190	242.83	42,933	367.85	32,298	190.61	44,273	201.53	35,142	373.45	4,544	81.68
		ชาย	119,679	372.89	27,734	485.19	25,294	307.61	35,687	327.11	27,475	593.25	3,489	133.42
		หญิง	39,511	118.08	15,199	255.23	7,004	80.30	8,586	77.64	7,667	160.43	1,055	35.79
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	62,162	94.82	9,116	78.11	14,522	85.70	20,078	91.40	15,886	168.82	2,560	46.02
		ชาย	23,635	73.64	3,665	64.12	5,454	66.33	7,640	70.03	5,882	127.01	994	38.01
		หญิง	38,527	115.14	5,451	91.54	9,068	103.97	12,438	112.48	10,004	209.34	1,566	53.12
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	9,449	14.41	1,562	13.38	1,585	9.35	4,453	20.27	1,306	13.88	543	9.76
		ชาย	4,586	14.29	826	14.45	776	9.44	2,115	19.39	592	12.78	277	10.59
		หญิง	4,863	14.53	736	12.36	809	9.28	2,338	21.14	714	14.94	266	9.02

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	57	0.09	7	0.06	7	0.04	30	0.14	5	0.05	8	0.14
		ชาย	48	0.15	6	0.10	4	0.05	29	0.27	2	0.04	7	0.27
		หญิง	9	0.03	1	0.02	3	0.03	1	0.01	3	0.06	1	0.03
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	รวม	48,338	73.73	10,056	86.16	11,626	68.61	16,080	73.20	5,990	63.65	4,586	82.44
		ชาย	29,677	92.47	6,262	109.55	6,903	83.95	10,222	93.70	3,663	79.09	2,627	100.46
		หญิง	18,661	55.77	3,794	63.71	4,723	54.15	5,858	52.97	2,327	48.69	1,959	66.45
โรกระบบย่อยอาหาร (K00 - K93)														
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	1,290	1.97	199	1.71	333	1.97	331	1.51	296	3.15	131	2.35
		ชาย	684	2.13	103	1.80	183	2.23	168	1.54	161	3.48	69	2.64
		หญิง	606	1.81	96	1.61	150	1.72	163	1.47	135	2.82	62	2.10
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	5,789	8.83	1,120	9.60	1,044	6.16	2,465	11.22	822	8.74	338	6.08
		ชาย	2,835	8.83	571	9.99	551	6.70	1,139	10.44	385	8.31	189	7.23
		หญิง	2,954	8.83	549	9.22	493	5.65	1,326	11.99	437	9.14	149	5.05
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อม้ำลายและ ขากรรไกร	รวม	12,985	19.81	2,488	21.32	2,060	12.16	5,959	27.13	1,657	17.61	821	14.76
		ชาย	6,458	20.12	1,280	22.39	1,000	12.16	2,912	26.69	859	18.55	407	15.56
		หญิง	6,527	19.51	1,208	20.29	1,060	12.15	3,047	27.55	798	16.70	414	14.04
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนมัม	รวม	30,050	45.84	7,255	62.16	8,083	47.70	10,180	46.34	2,335	24.81	2,197	39.49
		ชาย	20,995	65.42	5,031	88.01	5,438	66.13	7,482	68.58	1,626	35.11	1,418	54.22
		หญิง	9,055	27.06	2,224	37.35	2,645	30.33	2,698	24.40	709	14.84	779	26.42

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้น อักเสบ	รวม	67,393	102.80	11,724	100.45	16,267	96.00	24,960	113.62	11,103	117.99	3,339	60.02
		ชาย	34,171	106.47	6,112	106.93	8,103	98.55	12,925	118.47	5,371	115.97	1,660	63.48
		หญิง	33,222	99.28	5,612	94.24	8,164	93.60	12,035	108.83	5,732	119.94	1,679	56.95
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะ และดูโอดENUM	รวม	65,568	100.02	10,726	91.90	10,482	61.86	31,440	143.12	10,908	115.92	2,012	36.17
		ชาย	30,324	94.48	4,990	87.30	4,949	60.19	14,490	132.82	4,870	105.15	1,025	39.20
		หญิง	35,244	105.33	5,736	96.32	5,533	63.44	16,950	153.28	6,038	126.35	987	33.48
186	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	83,975	128.09	17,112	146.62	18,169	107.23	31,846	144.97	11,912	126.59	4,936	88.73
		ชาย	40,032	124.73	8,325	145.64	9,037	109.90	14,460	132.54	5,700	123.08	2,510	95.98
		หญิง	43,943	131.32	8,787	147.55	9,132	104.70	17,386	157.22	6,212	129.99	2,426	82.29
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	33,138	50.55	7,353	63.00	7,303	43.10	10,189	46.38	5,244	55.73	3,049	54.81
		ชาย	31,327	97.61	6,970	121.94	6,911	84.05	9,682	88.75	4,911	106.04	2,853	109.10
		หญิง	1,811	5.41	383	6.43	392	4.49	507	4.58	333	6.97	196	6.65
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	4,311	6.58	836	7.16	1,192	7.03	941	4.28	685	7.28	657	11.81
		ชาย	1,869	5.82	363	6.35	505	6.14	463	4.24	269	5.81	269	10.29
		หญิง	2,442	7.30	473	7.94	687	7.88	478	4.32	416	8.70	388	13.16
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	997	1.52	193	1.65	185	1.09	284	1.29	108	1.15	227	4.08
		ชาย	530	1.65	99	1.73	86	1.05	155	1.42	70	1.51	120	4.59
		หญิง	467	1.40	94	1.58	99	1.14	129	1.17	38	0.80	107	3.63

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	24,377	37.18	5,289	45.32	5,222	30.82	8,702	39.61	3,476	36.94	1,688	30.34
		ชาย	15,061	46.93	3,249	56.84	3,112	37.85	5,544	50.82	2,253	48.65	903	34.53
		หญิง	9,316	27.84	2,040	34.26	2,110	24.19	3,158	28.56	1,223	25.59	785	26.63
191	Diverticular disease of intestine (K57) โรคติ่งเนื้อของลำไส้	รวม	7,723	11.78	1,934	16.57	2,131	12.58	1,970	8.97	791	8.41	897	16.12
		ชาย	3,908	12.18	1,011	17.69	1,001	12.17	1,069	9.80	385	8.31	442	16.90
		หญิง	3,815	11.40	923	15.50	1,130	12.96	901	8.15	406	8.50	455	15.43
192	Other diseases of intestines and peritoneum (K52-K55, K58-K63, K65-K67) โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	รวม	62,388	95.17	13,413	114.92	13,832	81.63	22,661	103.15	7,570	80.44	4,912	88.30
		ชาย	35,013	109.09	7,562	132.29	7,481	90.98	12,818	117.49	4,222	91.16	2,930	112.04
		หญิง	27,375	81.81	5,851	98.25	6,351	72.82	9,843	89.01	3,348	70.06	1,982	67.23
193	Alcoholic liver disease (K70) โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	รวม	15,635	23.85	3,256	27.90	3,711	21.90	6,734	30.65	1,147	12.19	787	14.15
		ชาย	12,201	38.02	2,555	44.70	2,678	32.57	5,305	48.63	1,040	22.46	623	23.82
		หญิง	3,434	10.26	701	11.77	1,033	11.84	1,429	12.92	107	2.24	164	5.56
194	Other diseases of liver (K71-K77) โรคอื่น ๆ ของตับ	รวม	33,063	50.43	6,266	53.69	7,124	42.04	14,060	64.00	3,305	35.12	2,308	41.49
		ชาย	19,781	61.63	3,919	68.56	4,065	49.44	8,500	77.91	1,997	43.12	1,300	49.71
		หญิง	13,282	39.69	2,347	39.41	3,059	35.07	5,560	50.28	1,308	27.37	1,008	34.19
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81) โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	รวม	64,951	99.08	12,015	102.95	14,209	83.86	25,498	116.07	6,281	66.75	6,948	124.89
		ชาย	25,154	78.37	4,649	81.33	5,560	67.62	9,881	90.57	2,091	45.15	2,973	113.69
		หญิง	39,797	118.93	7,366	123.69	8,649	99.16	15,617	141.23	4,190	87.68	3,975	134.83

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	รวม	17,226	26.28	3,488	29.89	4,360	25.73	5,989	27.26	1,726	18.34	1,663	29.89
		ชาย	12,313	38.36	2,514	43.98	3,004	36.53	4,619	42.34	1,146	24.74	1,030	39.39
		หญิง	4,913	14.68	974	16.36	1,356	15.55	1,370	12.39	580	12.14	633	21.47
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	71,878	109.64	17,139	146.85	17,033	100.52	25,544	116.28	7,352	78.13	4,810	86.46
		ชาย	44,897	139.89	11,141	194.91	10,330	125.63	16,233	148.79	4,436	95.78	2,757	105.43
		หญิง	26,981	80.63	5,998	100.72	6,703	76.85	9,311	84.20	2,916	61.02	2,053	69.64
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00 - L99)														
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	118,215	180.32	23,908	204.85	25,300	149.31	44,608	203.06	20,096	213.56	4,303	77.35
		ชาย	66,177	206.19	13,619	238.26	13,514	164.35	25,790	236.39	10,868	234.66	2,386	91.24
		หญิง	52,038	155.51	10,289	172.78	11,786	135.13	18,818	170.17	9,228	193.10	1,917	65.03
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99) โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	40,728	62.13	8,400	71.97	9,400	55.47	14,708	66.95	5,673	60.29	2,547	45.78
		ชาย	20,727	64.58	4,311	75.42	4,598	55.92	7,696	70.54	2,897	62.55	1,225	46.84
		หญิง	20,001	59.77	4,089	68.66	4,802	55.06	7,012	63.41	2,776	58.09	1,322	44.84
โรกระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00 - M99)														
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14) ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	รวม	19,347	29.51	4,084	34.99	3,259	19.23	8,880	40.42	2,211	23.50	913	16.41
		ชาย	11,947	37.22	2,515	44.00	1,940	23.59	5,591	51.25	1,426	30.79	475	18.16
		หญิง	7,400	22.11	1,569	26.35	1,319	15.12	3,289	29.74	785	16.43	438	14.86
201	Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม	รวม	26,850	40.96	6,971	59.73	8,466	49.96	3,935	17.91	2,080	22.10	5,398	97.03
		ชาย	5,378	16.76	1,517	26.54	1,557	18.94	943	8.64	363	7.84	998	38.16
		หญิง	21,472	64.17	5,454	91.59	6,909	79.21	2,992	27.06	1,717	35.93	4,400	149.25

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา	รวม	1,151	1.76	200	1.71	206	1.22	199	0.91	98	1.04	448	8.05
		ชาย	508	1.58	81	1.42	75	0.91	114	1.04	53	1.14	185	7.07
		หญิง	643	1.92	119	2.00	131	1.50	85	0.77	45	0.94	263	8.92
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	รวม	16,540	25.23	3,517	30.13	3,469	20.47	5,616	25.56	1,762	18.72	2,176	39.11
		ชาย	10,298	32.09	2,051	35.88	2,266	27.56	3,422	31.37	1,148	24.79	1,411	53.96
		หญิง	6,242	18.65	1,466	24.62	1,203	13.79	2,194	19.84	614	12.85	765	25.95
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	รวม	10,749	16.40	2,231	19.12	1,947	11.49	3,816	17.37	1,391	14.78	1,364	24.52
		ชาย	2,286	7.12	456	7.98	477	5.80	831	7.62	250	5.40	272	10.40
		หญิง	8,463	25.29	1,775	29.81	1,470	16.85	2,985	26.99	1,141	23.88	1,092	37.04
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลัง อื่น ๆ ผิดปกติ	รวม	6,269	9.56	1,356	11.62	1,182	6.98	2,159	9.83	697	7.41	875	15.73
		ชาย	3,108	9.68	630	11.02	598	7.27	1,082	9.92	378	8.16	420	16.06
		หญิง	3,161	9.45	726	12.19	584	6.70	1,077	9.74	319	6.68	455	15.43
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	35,691	54.44	9,010	77.20	6,384	37.68	13,537	61.62	3,007	31.95	3,753	67.46
		ชาย	13,983	43.57	3,380	59.13	2,438	29.65	5,281	48.41	1,364	29.45	1,520	58.12
		หญิง	21,708	64.87	5,630	94.54	3,946	45.24	8,256	74.66	1,643	34.38	2,233	75.74
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	51,546	78.63	10,520	90.14	8,668	51.15	22,906	104.27	6,659	70.76	2,793	50.21
		ชาย	28,260	88.05	5,765	100.86	4,941	60.09	12,757	116.93	3,465	74.82	1,332	50.94
		หญิง	23,286	69.59	4,755	79.85	3,727	42.73	10,149	91.78	3,194	66.84	1,461	49.56

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	รวม	5,397	8.23	1,051	9.01	1,160	6.85	1,604	7.30	688	7.31	894	16.07
		ชาย	2,747	8.56	511	8.94	618	7.52	815	7.47	384	8.29	419	16.02
		หญิง	2,650	7.92	540	9.07	542	6.21	789	7.14	304	6.36	475	16.11
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	9,511	14.51	2,021	17.32	1,996	11.78	3,954	18.00	987	10.49	553	9.94
		ชาย	5,949	18.54	1,241	21.71	1,302	15.83	2,424	22.22	632	13.65	350	13.38
		หญิง	3,562	10.64	780	13.10	694	7.96	1,530	13.84	355	7.43	203	6.89
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	รวม	7,776	11.86	1,568	13.43	1,728	10.20	2,237	10.18	1,270	13.50	973	17.49
		ชาย	4,150	12.93	798	13.96	857	10.42	1,305	11.96	693	14.96	497	19.01
		หญิง	3,626	10.84	770	12.93	871	9.99	932	8.43	577	12.07	476	16.15
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00 - N99)														
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	2,641	4.03	399	3.42	365	2.15	626	2.85	1,109	11.79	142	2.55
		ชาย	1,573	4.90	250	4.37	218	2.65	359	3.29	674	14.55	72	2.75
		หญิง	1,068	3.19	149	2.50	147	1.69	267	2.41	435	9.10	70	2.37
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	6,435	9.82	1,127	9.66	1,261	7.44	2,140	9.74	1,222	12.99	685	12.31
		ชาย	3,527	10.99	563	9.85	724	8.80	1,156	10.60	719	15.52	365	13.96
		หญิง	2,908	8.69	564	9.47	537	6.16	984	8.90	503	10.53	320	10.85
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	68,078	103.85	15,599	133.65	15,621	92.19	23,913	108.85	9,275	98.56	3,670	65.97
		ชาย	23,849	74.31	6,061	106.03	4,590	55.82	9,115	83.55	2,837	61.26	1,246	47.65
		หญิง	44,229	132.18	9,538	160.17	11,031	126.47	14,798	133.82	6,438	134.72	2,424	82.22

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
214	Renal failure (N17-N19)	รวม	176,805	269.70	35,626	305.25	32,549	192.09	86,203	392.40	15,742	167.29	6,685	120.17
	ไตวาย	ชาย	78,560	244.77	16,993	297.28	14,703	178.81	36,326	332.97	7,244	156.41	3,294	125.96
		หญิง	98,245	293.60	18,633	312.89	17,846	204.61	49,877	451.04	8,498	177.82	3,391	115.02
215	Urolithiasis (N20-N23)	รวม	40,282	61.45	9,744	83.49	5,157	30.43	18,102	82.40	5,256	55.85	2,023	36.36
	นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	ชาย	24,663	76.84	6,348	111.05	2,878	35.00	11,279	103.38	2,995	64.67	1,163	44.47
		หญิง	15,619	46.68	3,396	57.03	2,279	26.13	6,823	61.70	2,261	47.31	860	29.17
216	Cystitis (N30)	รวม	12,477	19.03	2,530	21.68	2,583	15.24	5,238	23.84	1,791	19.03	335	6.02
	กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	ชาย	3,521	10.97	756	13.23	702	8.54	1,507	13.81	449	9.69	107	4.09
		หญิง	8,956	26.76	1,774	29.79	1,881	21.57	3,731	33.74	1,342	28.08	228	7.73
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39)	รวม	119,036	181.58	26,535	227.35	29,705	175.31	40,019	182.17	14,970	159.08	7,807	140.33
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	ชาย	46,591	145.17	10,658	186.46	11,016	133.97	16,384	150.18	5,398	116.56	3,135	119.88
		หญิง	72,445	216.50	15,877	266.61	18,689	214.28	23,635	213.73	9,572	200.30	4,672	158.48
218	Hyperplasia of prostate (N40)	รวม	10,668	16.27	2,351	20.14	2,296	13.55	2,908	13.24	1,491	15.84	1,622	29.16
	ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	ชาย	10,668	33.24	2,351	41.13	2,296	27.92	2,908	26.65	1,491	32.19	1,622	62.02
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42)	รวม	439	0.67	75	0.64	74	0.44	134	0.61	23	0.24	133	2.39
	ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	ชาย	439	1.37	75	1.31	74	0.90	134	1.23	23	0.50	133	5.09
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อันตะ	รวม	2,334	3.56	460	3.94	476	2.81	758	3.45	387	4.11	253	4.55
		ชาย	2,334	7.27	460	8.05	476	5.79	758	6.95	387	8.36	253	9.67
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก	รวม	3,183	4.86	688	5.89	728	4.30	1,155	5.26	447	4.75	165	2.97
		ชาย	3,183	9.92	688	12.04	728	8.85	1,155	10.59	447	9.65	165	6.31
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
222	Other diseases of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	9,199	14.03	1,721	14.75	1,869	11.03	3,799	17.29	1,344	14.28	466	8.38
		ชาย	9,199	28.66	1,721	30.11	1,869	22.73	3,799	34.82	1,344	29.02	466	17.82
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of the breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	7,779	11.87	1,609	13.79	1,487	8.78	2,522	11.48	1,617	17.18	544	9.78
		ชาย	411	1.28	89	1.56	65	0.79	132	1.21	99	2.14	26	0.99
		หญิง	7,368	22.02	1,520	25.52	1,422	16.30	2,390	21.61	1,518	31.76	518	17.57
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	2,063	3.15	287	2.46	531	3.13	791	3.60	274	2.91	180	3.24
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,063	6.17	287	4.82	531	6.09	791	7.15	274	5.73	180	6.11
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	180	0.27	45	0.39	27	0.16	48	0.22	36	0.38	24	0.43
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	180	0.54	45	0.76	27	0.31	48	0.43	36	0.75	24	0.81

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	11,402	17.39	1,848	15.83	2,641	15.59	4,311	19.62	2,157	22.92	445	8.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	11,402	34.07	1,848	31.03	2,641	30.28	4,311	38.98	2,157	45.14	445	15.09
227	Endometriosis (N80) เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่	รวม	8,113	12.38	1,133	9.71	1,436	8.47	3,093	14.08	1,315	13.97	1,136	20.42
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,113	24.25	1,133	19.03	1,436	16.46	3,093	27.97	1,315	27.52	1,136	38.53
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	3,267	4.98	633	5.42	619	3.65	1,204	5.48	258	2.74	553	9.94
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,267	9.76	633	10.63	619	7.10	1,204	10.89	258	5.40	553	18.76
229	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่และเอ็นยึดมดลูก	รวม	5,612	8.56	973	8.34	1,412	8.33	1,694	7.71	1,002	10.65	531	9.54
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5,612	16.77	973	16.34	1,412	16.19	1,694	15.32	1,002	20.97	531	18.01
230	Disorders of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	6,093	9.29	962	8.24	1,181	6.97	2,547	11.59	1,263	13.42	140	2.52
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,093	18.21	962	16.15	1,181	13.54	2,547	23.03	1,263	26.43	140	4.75
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน	รวม	3,624	5.53	741	6.35	814	4.80	1,227	5.59	597	6.34	245	4.40
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,624	10.83	741	12.44	814	9.33	1,227	11.10	597	12.49	245	8.31

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	29	0.04	8	0.07	3	0.02	11	0.05	3	0.03	4	0.07
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	29	0.09	8	0.13	3	0.03	11	0.10	3	0.06	4	0.14
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะ และสืบพันธุ์	รวม	16,600	25.32	2,968	25.43	3,364	19.85	5,846	26.61	3,080	32.73	1,342	24.12
		ชาย	218	0.68	29	0.51	9	0.11	15	0.14	14	0.30	151	5.77
		หญิง	16,382	48.96	2,939	49.35	3,355	38.47	5,831	52.73	3,066	64.16	1,191	40.40
การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00 - O99)														
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	10,024	15.29	1,264	10.83	2,040	12.04	3,536	16.10	2,479	26.34	705	12.67
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,024	29.96	1,264	21.23	2,040	23.39	3,536	31.98	2,479	51.87	705	23.91
235	Medical abortion (O04) การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	รวม	1,823	2.78	302	2.59	177	1.04	967	4.40	305	3.24	72	1.29
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,823	5.45	302	5.07	177	2.03	967	8.74	305	6.38	72	2.44
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08) การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	รวม	23,041	35.15	3,801	32.57	5,558	32.80	6,146	27.98	6,231	66.22	1,305	23.46
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	23,041	68.86	3,801	63.83	5,558	63.72	6,146	55.58	6,231	130.39	1,305	44.27

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด	รวม	16,331	24.91	2,356	20.19	3,628	21.41	4,858	22.11	4,813	51.15	676	12.15
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,331	48.80	2,356	39.56	3,628	41.60	4,858	43.93	4,813	100.71	676	22.93
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	รวม	3,920	5.98	633	5.42	766	4.52	1,247	5.68	1,065	11.32	209	3.76
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,920	11.71	633	10.63	766	8.78	1,247	11.28	1,065	22.29	209	7.09
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะคลอด	รวม	120,588	183.94	19,335	165.66	26,244	154.88	40,001	182.09	28,744	305.46	6,264	112.60
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	120,588	360.37	19,335	324.68	26,244	300.90	40,001	361.73	28,744	601.48	6,264	212.48
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	15,181	23.16	2,556	21.90	2,845	16.79	5,897	26.84	3,092	32.86	791	14.22
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	15,181	45.37	2,556	42.92	2,845	32.62	5,897	53.33	3,092	64.70	791	26.83
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	6,219	9.49	1,031	8.83	1,443	8.52	1,802	8.20	1,789	19.01	154	2.77
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,219	18.59	1,031	17.31	1,443	16.54	1,802	16.30	1,789	37.44	154	5.22

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	106,886	163.04	16,119	138.11	22,290	131.55	32,892	149.73	30,760	326.88	4,825	86.73
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	106,886	319.42	16,119	270.68	22,290	255.56	32,892	297.45	30,760	643.66	4,825	163.67
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดียว	รวม	132,718	202.45	21,404	183.39	29,664	175.06	44,902	204.40	31,841	338.37	4,907	88.21
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	132,718	396.62	21,404	359.42	29,664	340.11	44,902	406.06	31,841	666.28	4,907	166.45
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุ รายละเอียด	รวม	29,564	45.10	4,274	36.62	5,965	35.20	9,049	41.19	8,458	89.88	1,818	32.68
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	29,564	88.35	4,274	71.77	5,965	68.39	9,049	81.83	8,458	176.99	1,818	61.67
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00 - P96)														
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจาก ปัจจัยทางมารดา และโรคแทรก ในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้นและน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	55,767	85.07	7,856	67.31	14,962	88.30	15,689	71.42	10,488	111.45	6,772	121.73
		ชาย	27,921	87.00	3,931	68.77	7,487	91.05	7,835	71.82	5,191	112.09	3,477	132.96
		หญิง	27,846	83.22	3,925	65.91	7,475	85.70	7,854	71.02	5,297	110.84	3,295	111.77
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	3,485	5.32	551	4.72	755	4.46	975	4.44	335	3.56	869	15.62
		ชาย	1,971	6.14	300	5.25	438	5.33	550	5.04	196	4.23	487	18.62
		หญิง	1,514	4.52	251	4.21	317	3.63	425	3.84	139	2.91	382	12.96
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด	รวม	3,995	6.09	651	5.58	846	4.99	1,310	5.96	580	6.16	608	10.93
		ชาย	2,256	7.03	383	6.70	474	5.76	748	6.86	325	7.02	326	12.47
		หญิง	1,739	5.20	268	4.50	372	4.27	562	5.08	255	5.34	282	9.57
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	33,788	51.54	3,396	29.10	10,172	60.03	11,842	53.91	5,330	56.64	3,048	54.79
		ชาย	20,633	64.29	2,053	35.92	6,242	75.91	7,147	65.51	3,332	71.95	1,859	71.09
		หญิง	13,155	39.31	1,343	22.55	3,930	45.06	4,695	42.46	1,998	41.81	1,189	40.33
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	รวม	18,685	28.50	2,299	19.70	5,049	29.80	7,772	35.38	2,728	28.99	837	15.05
		ชาย	10,062	31.35	1,231	21.54	2,675	32.53	4,200	38.50	1,488	32.13	468	17.90
		หญิง	8,623	25.77	1,068	17.93	2,374	27.22	3,572	32.30	1,240	25.95	369	12.52
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39) การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	1,977	3.02	291	2.49	519	3.06	654	2.98	432	4.59	81	1.46
		ชาย	1,129	3.52	160	2.80	293	3.56	374	3.43	246	5.31	56	2.14
		หญิง	848	2.53	131	2.20	226	2.59	280	2.53	186	3.89	25	0.85

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55) โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์ และแรกเกิด	รวม	4,394	6.70	492	4.22	1,360	8.03	1,462	6.66	711	7.56	369	6.63
		ชาย	2,144	6.68	230	4.02	681	8.28	700	6.42	360	7.77	173	6.62
		หญิง	2,250	6.72	262	4.40	679	7.78	762	6.89	351	7.34	196	6.65
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	114,233	174.25	19,740	169.13	30,052	177.35	36,304	165.26	17,406	184.97	10,731	192.89
		ชาย	61,564	191.82	10,711	187.38	16,203	197.05	19,405	177.87	9,341	201.69	5,904	225.77
		หญิง	52,669	157.40	9,029	151.62	13,849	158.78	16,899	152.82	8,065	168.76	4,827	163.74
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00 - Q99)														
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	278	0.42	37	0.32	35	0.21	96	0.44	19	0.20	91	1.64
		ชาย	128	0.40	21	0.37	12	0.15	52	0.48	7	0.15	36	1.38
		หญิง	150	0.45	16	0.27	23	0.26	44	0.40	12	0.25	55	1.87
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	รวม	872	1.33	179	1.53	140	0.83	204	0.93	79	0.84	270	4.85
		ชาย	418	1.30	90	1.57	62	0.75	101	0.93	33	0.71	132	5.05
		หญิง	454	1.36	89	1.49	78	0.89	103	0.93	46	0.96	138	4.68
256	Congenital malformations of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	9,122	13.91	1,359	11.64	1,191	7.03	2,024	9.21	1,120	11.90	3,428	61.62
		ชาย	4,391	13.68	623	10.90	559	6.80	971	8.90	576	12.44	1,662	63.55
		หญิง	4,731	14.14	736	12.36	632	7.25	1,053	9.52	544	11.38	1,766	59.90
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	2,914	4.44	414	3.55	575	3.39	883	4.02	614	6.52	428	7.69
		ชาย	1,592	4.96	239	4.18	322	3.92	466	4.27	317	6.84	248	9.48
		หญิง	1,322	3.95	175	2.94	253	2.90	417	3.77	297	6.21	180	6.11

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตัน และตีบ	รวม	149	0.23	15	0.13	35	0.21	34	0.15	28	0.30	37	0.67
		ชาย	72	0.22	8	0.14	15	0.18	19	0.17	13	0.28	17	0.65
		หญิง	77	0.23	7	0.12	20	0.23	15	0.14	15	0.31	20	0.68
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	19,758	30.14	2,656	22.76	5,067	29.90	5,985	27.24	3,515	37.35	2,535	45.57
		ชาย	11,587	36.10	1,559	27.27	2,974	36.17	3,574	32.76	2,081	44.93	1,399	53.50
		หญิง	8,171	24.42	1,097	18.42	2,093	24.00	2,411	21.80	1,434	30.01	1,136	38.53
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	1,507	2.30	253	2.17	361	2.13	451	2.05	194	2.06	248	4.46
		ชาย	1,507	4.70	253	4.43	361	4.39	451	4.13	194	4.19	248	9.48
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ	รวม	1,901	2.90	311	2.66	256	1.51	471	2.14	267	2.84	596	10.71
		ชาย	1,322	4.12	198	3.46	148	1.80	333	3.05	191	4.12	452	17.28
		หญิง	579	1.73	113	1.90	108	1.24	138	1.25	76	1.59	144	4.88
262	Congenital deformities of hip (Q65) ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	รวม	189	0.29	21	0.18	23	0.14	31	0.14	20	0.21	94	1.69
		ชาย	77	0.24	7	0.12	4	0.05	11	0.10	8	0.17	47	1.80
		หญิง	112	0.33	14	0.24	19	0.22	20	0.18	12	0.25	47	1.59
263	Congenital deformities of feet (Q66) ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	รวม	1,165	1.78	155	1.33	276	1.63	311	1.42	266	2.83	157	2.82
		ชาย	605	1.89	84	1.47	116	1.41	169	1.55	148	3.20	88	3.37
		หญิง	560	1.67	71	1.19	160	1.83	142	1.28	118	2.47	69	2.34

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	รวม	2,660	4.06	373	3.20	425	2.51	717	3.26	350	3.72	795	14.29
		ชาย	1,484	4.62	192	3.36	230	2.80	403	3.69	183	3.95	476	18.20
		หญิง	1,176	3.51	181	3.04	195	2.24	314	2.84	167	3.49	319	10.82
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	4,840	7.38	713	6.11	756	4.46	1,162	5.29	716	7.61	1,493	26.84
		ชาย	2,472	7.70	357	6.25	397	4.83	577	5.29	366	7.90	775	29.64
		หญิง	2,368	7.08	356	5.98	359	4.12	585	5.29	350	7.32	718	24.36
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified (Q90-Q99) ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	451	0.69	78	0.67	101	0.60	129	0.59	63	0.67	80	1.44
		ชาย	175	0.55	29	0.51	36	0.44	53	0.49	22	0.48	35	1.34
		หญิง	276	0.82	49	0.82	65	0.75	76	0.69	41	0.86	45	1.53
อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00 - R99)														
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	40,751	62.16	8,269	70.85	7,003	41.33	16,682	75.94	7,933	84.30	864	15.53
		ชาย	17,270	53.81	3,528	61.72	2,895	35.21	7,187	65.88	3,304	71.34	356	13.61
		หญิง	23,481	70.17	4,741	79.61	4,108	47.10	9,495	85.86	4,629	96.86	508	17.23
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	84,532	128.94	14,458	123.88	11,672	68.88	43,262	196.93	12,785	135.86	2,355	42.33
		ชาย	43,607	135.87	7,698	134.67	5,898	71.73	22,047	202.08	6,680	144.24	1,284	49.10
		หญิง	40,925	122.30	6,760	113.52	5,774	66.20	21,215	191.85	6,105	127.75	1,071	36.33
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้	รวม	222,435	339.30	40,834	349.87	46,945	277.05	84,880	386.38	39,633	421.17	10,143	182.33
		ชาย	106,936	333.19	20,401	356.90	23,224	282.44	39,983	366.49	18,106	390.95	5,222	199.69
		หญิง	115,499	345.16	20,433	343.12	23,721	271.97	44,897	406.01	21,527	450.46	4,921	166.92
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00 - T98)														
271	Fracture of skull and facial bones (S02) กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	14,751	22.50	2,420	20.73	4,429	26.14	4,254	19.36	2,359	25.07	1,289	23.17
		ชาย	11,197	34.89	1,835	32.10	3,274	39.82	3,384	31.02	1,652	35.67	1,052	40.23
		หญิง	3,554	10.62	585	9.82	1,155	13.24	870	7.87	707	14.79	237	8.04
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	รวม	18,908	28.84	4,575	39.20	4,910	28.98	4,935	22.46	3,131	33.27	1,357	24.39
		ชาย	11,833	36.87	2,846	49.79	2,968	36.10	3,205	29.38	2,003	43.25	811	31.01
		หญิง	7,075	21.14	1,729	29.03	1,942	22.27	1,730	15.64	1,128	23.60	546	18.52
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว	รวม	39,285	59.92	9,973	85.45	11,232	66.29	9,557	43.50	4,752	50.50	3,771	67.79
		ชาย	16,299	50.78	3,858	67.49	4,834	58.79	4,028	36.92	2,026	43.75	1,553	59.39
		หญิง	22,986	68.69	6,115	102.69	6,398	73.36	5,529	50.00	2,726	57.04	2,218	75.24
274	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	105,425	160.81	22,799	195.34	26,658	157.32	34,590	157.46	13,178	140.04	8,200	147.40
		ชาย	68,501	213.43	14,260	249.47	17,449	212.21	22,983	210.66	8,462	182.71	5,347	204.47
		หญิง	36,924	110.35	8,539	143.39	9,209	105.58	11,607	104.96	4,716	98.68	2,853	96.78

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
275	Fractures involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	27	0.04	4	0.03	10	0.06	6	0.03	6	0.06	1	0.02
		ชาย	19	0.06	2	0.03	8	0.10	3	0.03	5	0.11	1	0.04
		หญิง	8	0.02	2	0.03	2	0.02	3	0.03	1	0.02	0	0.00
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43,S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ขัด บริเวณร่างกาย หลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	11,749	17.92	2,232	19.12	2,845	16.79	3,971	18.08	1,667	17.71	1,034	18.59
		ชาย	7,720	24.05	1,471	25.73	1,909	23.22	2,695	24.70	951	20.53	694	26.54
		หญิง	4,029	12.04	761	12.78	936	10.73	1,276	11.54	716	14.98	340	11.53
277	Injury of the eye and orbit (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	6,612	10.09	1,439	12.33	1,450	8.56	2,378	10.82	1,082	11.50	263	4.73
		ชาย	5,236	16.31	1,179	20.63	1,103	13.41	1,859	17.04	894	19.30	201	7.69
		หญิง	1,376	4.11	260	4.37	347	3.98	519	4.69	188	3.93	62	2.10
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	72,728	110.94	12,154	104.14	15,406	90.92	28,461	129.56	13,724	145.84	2,983	53.62
		ชาย	47,707	148.64	8,073	141.23	10,140	123.32	19,308	176.98	8,174	176.50	2,012	76.94
		หญิง	25,021	74.77	4,081	68.53	5,266	60.38	9,153	82.77	5,550	116.14	971	32.94
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	11,362	17.33	2,147	18.40	2,929	17.29	3,746	17.05	1,843	19.59	697	12.53
		ชาย	9,272	28.89	1,740	30.44	2,352	28.60	3,121	28.61	1,476	31.87	583	22.29
		หญิง	2,090	6.25	407	6.83	577	6.62	625	5.65	367	7.68	114	3.87

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	4,963	7.57	1,022	8.76	1,256	7.41	1,877	8.54	596	6.33	212	3.81
		ชาย	4,022	12.53	820	14.35	1,003	12.20	1,566	14.35	462	9.98	171	6.54
		หญิง	941	2.81	202	3.39	253	2.90	311	2.81	134	2.80	41	1.39
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	98,451	150.18	19,663	168.47	22,503	132.80	34,228	155.81	17,859	189.78	4,198	75.46
		ชาย	66,525	207.28	13,374	233.97	14,521	176.60	24,165	221.50	11,633	251.18	2,832	108.29
		หญิง	31,926	95.41	6,289	105.61	7,982	91.52	10,063	91.00	6,226	130.28	1,366	46.34
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	รวม	5,869	8.95	967	8.29	1,321	7.80	1,980	9.01	1,275	13.55	326	5.86
		ชาย	3,374	10.51	578	10.11	757	9.21	1,151	10.55	698	15.07	190	7.27
		หญิง	2,495	7.46	389	6.53	564	6.47	829	7.50	577	12.07	136	4.61
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	9,101	13.88	1,773	15.19	2,091	12.34	3,420	15.57	1,366	14.52	451	8.11
		ชาย	5,755	17.93	1,118	19.56	1,283	15.60	2,222	20.37	865	18.68	267	10.21
		หญิง	3,346	10.00	655	11.00	808	9.26	1,198	10.83	501	10.48	184	6.24

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยา และชีววัตถุ	รวม	18,746	28.59	3,836	32.87	5,434	32.07	5,851	26.63	2,587	27.49	1,038	18.66
		ชาย	6,897	21.49	1,435	25.10	1,906	23.18	2,208	20.24	978	21.12	370	14.15
		หญิง	11,849	35.41	2,401	40.32	3,528	40.45	3,643	32.94	1,609	33.67	668	22.66
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	39,299	59.95	7,002	59.99	10,799	63.73	11,612	52.86	9,161	97.35	725	13.03
		ชาย	22,918	71.41	4,323	75.63	6,093	74.10	6,617	60.65	5,497	118.69	388	14.84
		หญิง	16,381	48.95	2,679	44.99	4,706	53.96	4,995	45.17	3,664	76.67	337	11.43
286	Maltreatment syndrome (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	284	0.43	55	0.47	50	0.30	113	0.51	29	0.31	37	0.67
		ชาย	31	0.10	8	0.14	5	0.06	8	0.07	2	0.04	8	0.31
		หญิง	253	0.76	47	0.79	45	0.52	105	0.95	27	0.56	29	0.98
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่ไม่ได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	32,400	49.42	5,464	46.82	9,179	54.17	10,728	48.83	6,147	65.32	882	15.85
		ชาย	17,537	54.64	2,995	52.40	4,954	60.25	5,922	54.28	3,157	68.17	509	19.46
		หญิง	14,863	44.42	2,469	41.46	4,225	48.44	4,806	43.46	2,990	62.57	373	12.65
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บ บางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษา ทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	88,736	135.36	17,308	148.30	16,642	98.21	38,210	173.94	10,217	108.57	6,359	114.31
		ชาย	50,680	157.91	10,180	178.09	9,228	112.23	22,232	203.78	5,754	124.24	3,286	125.66
		หญิง	38,056	113.73	7,128	119.70	7,414	85.00	15,978	144.49	4,463	93.39	3,073	104.24

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าสุดของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00 - Z99)														
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	รวม	11,116	16.96	1,643	14.08	3,415	20.15	2,861	13.02	1,702	18.09	1,495	26.87
		ชาย	5,010	15.61	729	12.75	1,536	18.68	1,246	11.42	825	17.81	674	25.77
		หญิง	6,106	18.25	914	15.35	1,879	21.54	1,615	14.60	877	18.35	821	27.85
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	229	0.35	40	0.34	35	0.21	121	0.55	32	0.34	1	0.02
		ชาย	133	0.41	29	0.51	21	0.26	61	0.56	21	0.45	1	0.04
		หญิง	96	0.29	11	0.18	14	0.16	60	0.54	11	0.23	0	0.00
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	รวม	1,627	2.48	318	2.72	537	3.17	492	2.24	168	1.79	112	2.01
		ชาย	821	2.56	157	2.75	271	3.30	260	2.38	86	1.86	47	1.80
		หญิง	806	2.41	161	2.70	266	3.05	232	2.10	82	1.72	65	2.20
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	6,488	9.90	1,112	9.53	2,667	15.74	1,344	6.12	1,121	11.91	244	4.39
		ชาย	67	0.21	8	0.14	23	0.28	20	0.18	7	0.15	9	0.34
		หญิง	6,421	19.19	1,104	18.54	2,644	30.31	1,324	11.97	1,114	23.31	235	7.97
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอดและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	282	0.43	102	0.87	60	0.35	63	0.29	55	0.58	2	0.04
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	282	0.84	102	1.71	60	0.69	63	0.57	55	1.15	2	0.07

ตารางที่ 34 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (เฉพาะการวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และสาเหตุการป่วย
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั่วประเทศ		เหนือ		กลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	290,578	443.24	44,251	379.15	74,326	438.64	89,735	408.48	64,118	681.37	18,148	326.22
		ชาย	144,880	451.41	22,260	389.43	36,766	447.13	44,606	408.86	32,188	695.01	9,060	346.45
		หญิง	145,698	435.41	21,991	369.28	37,560	430.64	45,129	408.11	31,930	668.15	9,088	308.27
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	1,302	1.99	247	2.12	173	1.02	483	2.20	365	3.88	34	0.61
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,302	3.89	247	4.15	173	1.98	483	4.37	365	7.64	34	1.15
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	28,514	43.49	6,424	55.04	5,101	30.10	11,232	51.13	3,573	37.97	2,184	39.26
		ชาย	17,121	53.34	3,830	67.00	3,264	39.70	7,113	65.20	1,696	36.62	1,218	46.58
		หญิง	11,393	34.05	2,594	43.56	1,837	21.06	4,119	37.25	1,877	39.28	966	32.77
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	1,218	1.86	193	1.65	127	0.75	160	0.73	680	7.23	58	1.04
		ชาย	629	1.96	102	1.78	68	0.83	66	0.60	356	7.69	37	1.41
		หญิง	589	1.76	91	1.53	59	0.68	94	0.85	324	6.78	21	0.71

ผู้ป่วยใน

(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย
และเพศ ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2561 - 2562

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	10,281,989	91,842.51	9,585,853	89,374.35
		ชาย	4,887,272	98,173.61	4,533,387	94,996.08
		หญิง	5,394,717	86,772.99	5,052,466	84,867.97
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)						
001	Cholera (A00) อหิวาตกโรค	รวม	45	0.40	56	0.52
		ชาย	17	0.34	26	0.54
		หญิง	28	0.45	30	0.50
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	รวม	639	5.71	558	5.20
		ชาย	296	5.95	272	5.70
		หญิง	343	5.52	286	4.80
003	Shigellosis (A03) โรคบิดจากเชื้อชิกेलลา	รวม	32	0.29	38	0.35
		ชาย	13	0.26	15	0.31
		หญิง	19	0.31	23	0.39
004	Amoebiasis (A06) โรคบิดมีตัว	รวม	992	8.86	873	8.14
		ชาย	409	8.22	374	7.84
		หญิง	583	9.38	499	8.38
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	127,725	1,140.89	122,544	1,142.55
		ชาย	47,500	954.16	44,874	940.32
		หญิง	80,225	1,290.40	77,670	1,304.65
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	12,905	115.27	12,544	116.95
		ชาย	5,021	100.86	4,812	100.83
		หญิง	7,884	126.81	7,732	129.88
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	32,940	294.23	32,381	301.91
		ชาย	22,088	443.70	21,302	446.38
		หญิง	10,852	174.55	11,079	186.10
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	5,579	49.83	5,541	51.66
		ชาย	3,149	63.26	3,223	67.54
		หญิง	2,430	39.09	2,318	38.94
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	3	0.03	0	0.00
		ชาย	1	0.02	0	0.00
		หญิง	2	0.03	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อบรูเซลลา	รวม	17	0.15	11	0.10
		ชาย	11	0.22	7	0.15
		หญิง	6	0.10	4	0.07
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	186	1.66	173	1.61
		ชาย	127	2.55	118	2.47
		หญิง	59	0.95	55	0.92
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	118	1.05	131	1.22
		ชาย	70	1.41	78	1.63
		หญิง	48	0.77	53	0.89
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	18	0.16	14	0.13
		ชาย	8	0.16	4	0.08
		หญิง	10	0.16	10	0.17
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	0	0.00	1	0.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	1	0.02
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	รวม	32	0.29	31	0.29
		ชาย	17	0.34	15	0.31
		หญิง	15	0.24	16	0.27
017	Septicaemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	95,092	849.40	86,354	805.13
		ชาย	45,249	908.94	40,980	858.73
		หญิง	49,843	801.72	45,374	762.16
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	19,049	170.15	17,170	160.09
		ชาย	10,165	204.19	9,211	193.01
		หญิง	8,884	142.90	7,959	133.69
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	32	0.29	34	0.32
		ชาย	19	0.38	21	0.44
		หญิง	13	0.21	13	0.22
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	1,148	10.25	1,170	10.91
		ชาย	651	13.08	642	13.45
		หญิง	497	7.99	528	8.87
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	18	0.16	19	0.18
		ชาย	13	0.26	12	0.25
		หญิง	5	0.08	7	0.12
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	รวม	6	0.05	3	0.03
		ชาย	3	0.06	3	0.06
		หญิง	3	0.05	0	0.00
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่	รวม	367	3.28	346	3.23
		ชาย	150	3.01	121	2.54
		หญิง	217	3.49	225	3.78
025	Relapsing fevers (A68) โรคไข้กลับซ้ำ	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
026	Trachoma (A71) ริดสีดวงตา	รวม	8	0.07	7	0.07
		ชาย	3	0.06	3	0.06
		หญิง	5	0.08	4	0.07
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	3,844	34.34	4,479	41.76
		ชาย	1,930	38.77	2,308	48.36
		หญิง	1,914	30.79	2,171	36.47
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	69	0.62	61	0.57
		ชาย	47	0.94	34	0.71
		หญิง	22	0.35	27	0.45
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	0	0.00	1	0.01
		ชาย	0	0.00	1	0.02
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	260	2.32	198	1.85
		ชาย	124	2.49	97	2.03
		หญิง	136	2.19	101	1.70
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	49	0.44	35	0.33
		ชาย	24	0.48	18	0.38
		หญิง	25	0.40	17	0.29
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	รวม	7,444	66.49	4,778	44.55
		ชาย	3,229	64.86	1,995	41.80
		หญิง	4,215	67.80	2,783	46.75
033	Herpesviral infections (B00) เริม	รวม	2,059	18.39	1,991	18.56
		ชาย	903	18.14	838	17.56
		หญิง	1,156	18.59	1,153	19.37
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	5,527	49.37	5,364	50.01
		ชาย	2,390	48.01	2,387	50.02
		หญิง	3,137	50.46	2,977	50.01
035	Measles (B05) หัด	รวม	23	0.21	14	0.13
		ชาย	9	0.18	6	0.13
		หญิง	14	0.23	8	0.13
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	3	0.03	4	0.04
		ชาย	1	0.02	2	0.04
		หญิง	2	0.03	2	0.03
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	1,942	17.35	2,054	19.15
		ชาย	1,198	24.06	1,273	26.68
		หญิง	744	11.97	781	13.12
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	25,341	226.36	22,487	209.66
		ชาย	15,302	307.38	13,827	289.74
		หญิง	10,039	161.48	8,660	145.46
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	รวม	5,727	51.16	5,199	48.47
		ชาย	3,141	63.10	2,977	62.38
		หญิง	2,586	41.60	2,222	37.32

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
040	Mumps (B26) คางทูม	รวม	13	0.12	12	0.11
		ชาย	6	0.12	4	0.08
		หญิง	7	0.11	8	0.13
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	รวม	3,641	32.52	2,673	24.92
		ชาย	1,462	29.37	1,132	23.72
		หญิง	2,179	35.05	1,541	25.88
042	Mycoses (B35-B49) โรคติดเชื้อรา	รวม	8,577	76.61	8,566	79.87
		ชาย	4,353	87.44	4,395	92.10
		หญิง	4,224	67.94	4,171	70.06
043	Malaria (B50-B54) มาลาเรีย	รวม	162	1.45	217	2.02
		ชาย	96	1.93	132	2.77
		หญิง	66	1.06	85	1.43
044	Leishmaniasis (B55) โรคพยาธิเม็ดเลือด	รวม	3	0.03	2	0.02
		ชาย	2	0.04	2	0.04
		หญิง	1	0.02	0	0.00
045	Trypanosomiasis (B56-B57) โรคทริพาโนโซม	รวม	4	0.04	7	0.07
		ชาย	3	0.06	1	0.02
		หญิง	1	0.02	6	0.10
046	Schistosomiasis (B65) โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้	รวม	8	0.07	10	0.09
		ชาย	4	0.08	4	0.08
		หญิง	4	0.06	6	0.10
047	Other fluke infections (B66) โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	รวม	280	2.50	297	2.77
		ชาย	144	2.89	161	3.37
		หญิง	136	2.19	136	2.28
048	Echinococcosis (B67) โรคพยาธิเอโคไนค็อกคัส	รวม	4	0.04	9	0.08
		ชาย	2	0.04	3	0.06
		หญิง	2	0.03	6	0.10
049	Dracunculiasis (B72) โรคพยาธิจิ้งจอก	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
050	Onchocerciasis (B73) โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	รวม	1	0.01	0	0.00
		ชาย	1	0.02	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
051	Filariasis (B74) โรคพยาธิฟิลาเรีย	รวม	4	0.04	7	0.07
		ชาย	4	0.08	2	0.04
		หญิง	0	0.00	5	0.08
052	Hookworm diseases (B76) โรคพยาธิปากขอ	รวม	153	1.37	209	1.95
		ชาย	76	1.53	93	1.95
		หญิง	77	1.24	116	1.95
053	Other helminthiasis (B68-B71, B75, B77-B83) โรคพยาธิตัวติดอื่น ๆ	รวม	3,435	30.68	3,486	32.50
		ชาย	2,263	45.46	2,222	46.56
		หญิง	1,172	18.85	1,264	21.23
054	Sequelae of tuberculosis (B90) ผลตามหลังวัณโรค	รวม	20,229	180.69	19,061	177.72
		ชาย	13,146	264.07	12,268	257.07
		หญิง	7,083	113.93	6,793	114.10
055	Sequelae of poliomyelitis (B91) ผลตามหลังโรคโปลิโอ	รวม	13	0.12	16	0.15
		ชาย	9	0.18	9	0.19
		หญิง	4	0.06	7	0.12
056	Sequelae of leprosy (B92) ผลตามหลังโรคเรื้อน	รวม	30	0.27	35	0.33
		ชาย	19	0.38	23	0.48
		หญิง	11	0.18	12	0.20
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	รวม	1,593	14.23	1,850	17.25
		ชาย	876	17.60	968	20.28
		หญิง	717	11.53	882	14.82
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00 - D48)						
058	Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14) เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย	รวม	13,246	118.32	12,560	117.10
		ชาย	9,092	182.64	8,504	178.20
		หญิง	4,154	66.82	4,056	68.13
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	5,823	52.01	5,454	50.85
		ชาย	5,007	100.58	4,612	96.64
		หญิง	816	13.13	842	14.14

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
060	Malignant neoplasm of stomach (C16)	รวม	7,554	67.48	7,335	68.39
	เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	ชาย	4,624	92.89	4,454	93.33
		หญิง	2,930	47.13	2,881	48.39
061	Malignant neoplasm of colon (C18)	รวม	47,169	421.33	42,530	396.53
	เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	ชาย	25,741	517.08	23,111	484.29
		หญิง	21,428	344.67	19,419	326.19
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21)	รวม	31,698	283.14	28,018	261.23
	เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัมและซิกมอยด์ เร็กตัม	ชาย	19,505	391.81	17,140	359.16
	ทวารหนักและช่องทวารหนัก	หญิง	12,193	196.12	10,878	182.72
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22)	รวม	36,776	328.50	35,679	332.66
	เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	ชาย	23,668	475.43	23,462	491.64
		หญิง	13,108	210.84	12,217	205.21
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25)	รวม	4,741	42.35	4,241	39.54
	เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	ชาย	2,359	47.39	2,052	43.00
		หญิง	2,382	38.31	2,189	36.77
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26)	รวม	5,755	51.41	5,147	47.99
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	ชาย	2,988	60.02	2,598	54.44
		หญิง	2,767	44.51	2,549	42.82
066	Malignant neoplasm of larynx (C32)	รวม	3,703	33.08	3,411	31.80
	เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	ชาย	3,482	69.95	3,210	67.26
		หญิง	221	3.55	201	3.38
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34)	รวม	32,236	287.94	30,852	287.65
	เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	ชาย	20,211	405.99	19,391	406.33
		หญิง	12,025	193.42	11,461	192.51
068	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39)	รวม	990	8.84	954	8.89
	เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	ชาย	556	11.17	573	12.01
		หญิง	434	6.98	381	6.40
069	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage (C40-C41)	รวม	628	5.61	729	6.80
	เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	ชาย	368	7.39	396	8.30
		หญิง	260	4.18	333	5.59

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
070	Malignant melanoma of skin (C43) เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	รวม	613	5.48	604	5.63
		ชาย	374	7.51	330	6.92
		หญิง	239	3.84	274	4.60
071	Other malignant neoplasms of skin (C44) เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	รวม	2,260	20.19	2,189	20.41
		ชาย	1,071	21.51	1,065	22.32
		หญิง	1,189	19.12	1,124	18.88
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49) เนื้องอกร้ายที่เมโสธีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	รวม	2,569	22.95	2,552	23.79
		ชาย	949	19.06	940	19.70
		หญิง	1,620	26.06	1,612	27.08
073	Malignant neoplasm of breast (C50) เนื้องอกร้ายที่เต้านม	รวม	21,717	193.98	20,137	187.75
		ชาย	258	5.18	258	5.41
		หญิง	21,459	345.16	19,879	333.91
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53) เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	รวม	10,869	97.09	10,561	98.47
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,869	174.83	10,561	177.40
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก	รวม	6,511	58.16	5,886	54.88
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	6,511	104.73	5,886	98.87
076	Other malignant neoplasms of female genital organs (C51-C52, C56-C58) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	รวม	8,267	73.84	8,109	75.60
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	8,267	132.97	8,109	136.21
077	Malignant neoplasm of prostate (C61) เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	รวม	11,590	103.53	10,528	98.16
		ชาย	11,590	232.82	10,528	220.61
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	1,094	9.77	984	9.17
		ชาย	1,094	21.98	984	20.62
		หญิง	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	รวม	10,410	92.99	10,078	93.96
		ชาย	8,322	167.17	8,081	169.34
		หญิง	2,088	33.59	1,997	33.54

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	รวม	2,656	23.72	2,595	24.19
		ชาย	1,721	34.57	1,640	34.37
		หญิง	935	15.04	955	16.04
081	Malignant neoplasm of the eye and adnexa (C69) เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	รวม	99	0.88	162	1.51
		ชาย	56	1.12	96	2.01
		หญิง	43	0.69	66	1.11
082	Malignant neoplasm of brain (C71) เนื้องอกร้ายของสมอง	รวม	1,294	11.56	1,275	11.89
		ชาย	658	13.22	673	14.10
		หญิง	636	10.23	602	10.11
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72) เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	119	1.06	142	1.32
		ชาย	50	1.00	62	1.30
		หญิง	69	1.11	80	1.34
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิ ที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	รวม	100,192	894.95	94,487	880.96
		ชาย	53,142	1,067.50	49,172	1,030.39
		หญิง	47,050	756.79	45,315	761.17
085	Hodgkin's disease (C81) โรคฮอดจกิน	รวม	401	3.58	420	3.92
		ชาย	255	5.12	246	5.15
		หญิง	146	2.35	174	2.92
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85) เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดจกิน	รวม	13,353	119.27	12,976	120.98
		ชาย	7,417	148.99	7,532	157.83
		หญิง	5,936	95.48	5,444	91.44
087	Leukaemia (C91-C95) ลิวคีเมีย	รวม	7,387	65.98	6,998	65.25
		ชาย	3,947	79.29	3,605	75.54
		หญิง	3,440	55.33	3,393	56.99
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อ	รวม	4,853	43.35	4,482	41.79
		ชาย	2,504	50.30	2,313	48.47
		หญิง	2,349	37.78	2,169	36.43
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06) มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	รวม	160	1.43	180	1.68
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	160	2.57	180	3.02

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23) เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	รวม	227	2.03	206	1.92
		ชาย	90	1.81	87	1.82
		หญิง	137	2.20	119	2.00
091	Benign neoplasm of breast (D24) เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	รวม	163	1.46	118	1.10
		ชาย	2	0.04	1	0.02
		หญิง	161	2.59	117	1.97
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	1,471	13.14	1,513	14.11
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,471	23.66	1,513	25.41
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	543	4.85	549	5.12
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	543	8.73	549	9.22
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	156	1.39	148	1.38
		ชาย	94	1.89	82	1.72
		หญิง	62	1.00	66	1.11
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาท ส่วนกลาง	รวม	729	6.51	714	6.66
		ชาย	298	5.99	320	6.71
		หญิง	431	6.93	394	6.62
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิด ที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	33,361	297.99	30,728	286.49
		ชาย	16,204	325.50	14,883	311.87
		หญิง	17,157	275.97	15,845	266.15
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50 - D89)						
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	55,623	496.85	55,018	512.96
		ชาย	23,359	469.23	22,690	475.46
		หญิง	32,264	518.96	32,328	543.02
098	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	รวม	391,760	3,499.34	370,450	3,453.92
		ชาย	166,227	3,339.10	155,976	3,268.44
		หญิง	225,533	3,627.66	214,474	3,602.59

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77) ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	รวม	84,625	755.90	75,673	705.54
		ชาย	43,937	882.59	39,803	834.06
		หญิง	40,688	654.46	35,870	602.52
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	รวม	297	2.65	223	2.08
		ชาย	148	2.97	123	2.58
		หญิง	149	2.40	100	1.68
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00 - E90)						
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders (E00-E02) การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมไทรอยด์	รวม	867	7.74	764	7.12
		ชาย	298	5.99	256	5.36
		หญิง	569	9.15	508	8.53
102	Thyrotoxicosis (E05) โรคพิษไทรอยด์	รวม	16,557	147.89	15,779	147.12
		ชาย	4,229	84.95	3,840	80.47
		หญิง	12,328	198.29	11,939	200.54
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อื่น ๆ	รวม	24,958	222.93	23,167	216.00
		ชาย	6,241	125.37	5,813	121.81
		หญิง	18,717	301.06	17,354	291.50
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	รวม	672,657	6,008.42	628,514	5,859.99
		ชาย	260,748	5,237.80	241,036	5,050.85
		หญิง	411,909	6,625.48	387,478	6,508.60
105	Malnutrition (E40-E46) ทุพโภชนาการ	รวม	23,026	205.68	13,338	124.36
		ชาย	12,253	246.13	7,006	146.81
		หญิง	10,773	173.28	6,332	106.36
106	Vitamin A deficiency (E50) การขาดวิตามินเอ	รวม	34	0.30	28	0.26
		ชาย	13	0.26	14	0.29
		หญิง	21	0.34	14	0.24
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) การขาดวิตามินอื่น ๆ	รวม	1,782	15.92	1,428	13.31
		ชาย	705	14.16	517	10.83
		หญิง	1,077	17.32	911	15.30
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการ และภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	27	0.24	40	0.37
		ชาย	12	0.24	12	0.25
		หญิง	15	0.24	28	0.47

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
109	Obesity (E66)	รวม	2,625	23.45	2,636	24.58
	โรคอ้วน	ชาย	675	13.56	742	15.55
		หญิง	1,950	31.37	1,894	31.81
110	Volume depletion (E86)	รวม	8,350	74.59	8,833	82.36
	การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	ชาย	3,674	73.80	3,859	80.86
		หญิง	4,676	75.21	4,974	83.55
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders	รวม	1,422,301	12,704.52	1,295,956	12,082.93
	(E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90)	ชาย	613,684	12,327.44	554,307	11,615.38
	ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ	หญิง	808,617	13,006.45	741,649	12,457.73
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F00 - F99)						
112	Dementia (F00-F03)	รวม	13,585	121.35	12,060	112.44
	สมองเสื่อม	ชาย	5,711	114.72	5,052	105.86
		หญิง	7,874	126.65	7,008	117.72
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10)	รวม	18,810	168.02	16,363	152.56
	ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	ชาย	15,386	309.07	13,373	280.23
		หญิง	3,424	55.07	2,990	50.22
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19)	รวม	2,383	21.29	1,737	16.20
	ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	ชาย	1,934	38.85	1,424	29.84
		หญิง	449	7.22	313	5.26
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29)	รวม	12,799	114.33	11,947	111.39
	จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	ชาย	5,898	118.48	5,562	116.55
		หญิง	6,901	111.00	6,385	107.25
116	Mood [affective] disorders (F30-F39)	รวม	17,698	158.09	16,431	153.20
	ความผิดปกติทางอารมณ์	ชาย	5,562	111.73	5,169	108.32
		หญิง	12,136	195.21	11,262	189.17
117	Neurotic, stress-related, and somatoform disorders (F40-F48)	รวม	8,677	77.51	8,428	78.58
	โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ และความเครียด	ชาย	2,413	48.47	2,261	47.38
		หญิง	6,264	100.76	6,167	103.59
118	Mental retardation (F70-F79)	รวม	233	2.08	166	1.55
	ภาวะปัญญาอ่อน	ชาย	119	2.39	77	1.61
		หญิง	114	1.83	89	1.49

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
119	Other mental and behavioral disorders	รวม	35,424	316.42	31,054	289.53
	(F04-F09, F50-F69, F80-F99)	ชาย	18,111	363.81	15,972	334.69
	ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	หญิง	17,313	278.48	15,082	253.34
โรกระบบประสาท (G00 - G99)						
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09)	รวม	7,275	64.98	6,868	64.03
	การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	ชาย	4,029	80.93	3,761	78.81
		หญิง	3,246	52.21	3,107	52.19
121	Parkinson's disease (G20)	รวม	18,710	167.12	17,175	160.13
	โรคพาร์กินสัน	ชาย	9,265	186.11	8,196	171.75
		หญิง	9,445	151.92	8,979	150.82
122	Alzheimer's disease (G30)	รวม	9,023	80.60	7,783	72.57
	โรคอัลไซเมอร์	ชาย	3,282	65.93	2,892	60.60
		หญิง	5,741	92.34	4,891	82.16
123	Multiple sclerosis (G35)	รวม	93	0.83	92	0.86
	โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	ชาย	42	0.84	28	0.59
		หญิง	51	0.82	64	1.08
124	Epilepsy (G40-G41)	รวม	24,969	223.03	22,646	211.14
	ลมบ้าหมู	ชาย	14,500	291.27	12,897	270.25
		หญิง	10,469	168.39	9,749	163.76
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44)	รวม	3,891	34.76	3,931	36.65
	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	ชาย	1,280	25.71	1,349	28.27
		หญิง	2,611	42.00	2,582	43.37
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)	รวม	8,756	78.21	8,271	77.12
	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราว	ชาย	4,633	93.07	4,373	91.64
		หญิง	4,123	66.32	3,898	65.48
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)	รวม	5,724	51.13	5,605	52.26
	ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท	ชาย	2,425	48.71	2,519	52.79
		หญิง	3,299	53.06	3,086	51.84
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83)	รวม	28,207	251.96	24,767	230.92
	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	ชาย	15,728	315.94	13,886	290.98
		หญิง	12,479	200.72	10,881	182.77

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
129	Other diseases of the nervous system	รวม	55,486	495.62	52,748	491.80
	(G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37,	ชาย	27,080	543.97	25,738	539.33
	G46-G47, G60-G73, G90-G99)	หญิง	28,406	456.91	27,010	453.70
	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ					
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00 - H59)						
130	Inflammation of eyelid (H00-H01) การอักเสบของหนังตา	รวม	669	5.98	687	6.41
		ชาย	280	5.62	274	5.74
		หญิง	389	6.26	413	6.94
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ	รวม	13,002	116.14	11,501	107.23
		ชาย	4,812	96.66	4,216	88.35
		หญิง	8,190	131.73	7,285	122.37
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาว และกระจกตาอื่น ๆ	รวม	5,350	47.79	5,256	49.00
		ชาย	2,789	56.02	2,673	56.01
		หญิง	2,561	41.19	2,583	43.39
133	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	163,884	1,463.87	155,632	1,451.05
		ชาย	69,041	1,386.87	65,761	1,378.01
		หญิง	94,843	1,525.53	89,871	1,509.59
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	รวม	2,870	25.64	2,877	26.82
		ชาย	1,772	35.60	1,730	36.25
		หญิง	1,098	17.66	1,147	19.27
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	17,105	152.79	16,327	152.23
		ชาย	7,903	158.75	7,496	157.08
		หญิง	9,202	148.01	8,831	148.34
136	Strabismus (H49-H50) ตาเหล่	รวม	691	6.17	651	6.07
		ชาย	290	5.83	297	6.22
		หญิง	401	6.45	354	5.95
137	Disorders of refraction and accommodation (H52) ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	รวม	546	4.88	523	4.88
		ชาย	239	4.80	234	4.90
		หญิง	307	4.94	289	4.85
138	Blindness and low vision (H54) ตาบอดและสายตาเลือนราง	รวม	159,816	1,427.54	151,082	1,408.62
		ชาย	66,974	1,345.35	63,461	1,329.81
		หญิง	92,842	1,493.35	87,621	1,471.80

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
139	Other diseases of the eye and adnexa	รวม	23,708	211.77	22,789	212.47
	(H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36,	ชาย	10,419	209.29	9,953	208.56
	H43-H48, H51, H53, H55-H59)	หญิง	13,289	213.75	12,836	215.61
	โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ					
โรคของหูและปุ่มกกหู (H60 - H95)						
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75)	รวม	1,872	16.72	1,711	15.95
	หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	ชาย	871	17.50	768	16.09
		หญิง	1,001	16.10	943	15.84
141	Hearing loss (H90-H91)	รวม	1,616	14.43	1,637	15.26
	การสูญเสียการได้ยิน	ชาย	837	16.81	879	18.42
		หญิง	779	12.53	758	12.73
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95)	รวม	15,205	135.82	14,581	135.95
	โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	ชาย	4,723	94.87	4,788	100.33
		หญิง	10,482	168.60	9,793	164.50
โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00 - I99)						
143	Acute rheumatic fever (I00-I02)	รวม	115	1.03	139	1.30
	ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	ชาย	41	0.82	50	1.05
		หญิง	74	1.19	89	1.49
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09)	รวม	13,528	120.84	13,409	125.02
	โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	ชาย	5,030	101.04	5,102	106.91
		หญิง	8,498	136.69	8,307	139.54
145	Essential (primary) hypertension (I10)	รวม	1,154,169	10,309.46	1,077,341	10,044.66
	ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	ชาย	495,414	9,951.68	460,159	9,642.53
		หญิง	658,755	10,595.95	617,182	10,367.01
146	Other hypertensive diseases (I11-I15)	รวม	5,541	49.49	5,924	55.23
	โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	ชาย	2,380	47.81	2,476	51.88
		หญิง	3,161	50.84	3,448	57.92
147	Acute myocardial infarction (I21-I22)	รวม	66,408	593.18	63,770	594.56
	กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	ชาย	35,473	712.57	33,923	710.85
		หญิง	30,935	497.58	29,847	501.35
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25)	รวม	197,385	1,763.12	190,474	1,775.90
	โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	ชาย	109,444	2,198.47	104,004	2,179.38
		หญิง	87,941	1,414.51	86,470	1,452.47

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
149	Pulmonary embolism (I26) ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	รวม	5,162	46.11	4,494	41.90
		ชาย	1,910	38.37	1,641	34.39
		หญิง	3,252	52.31	2,853	47.92
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ	รวม	208,480	1,862.22	186,101	1,735.13
		ชาย	97,987	1,968.32	86,739	1,817.60
		หญิง	110,493	1,777.26	99,362	1,669.02
151	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	รวม	157,313	1,405.18	154,325	1,438.86
		ชาย	65,139	1,308.49	63,820	1,337.33
		หญิง	92,174	1,482.60	90,505	1,520.24
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52) โรคหัวใจอื่น ๆ	รวม	78,364	699.98	76,033	708.90
		ชาย	36,041	723.98	34,421	721.28
		หญิง	42,323	680.76	41,612	698.97
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62) เลือดออกในสมอง	รวม	36,381	324.97	34,751	324.00
		ชาย	19,402	389.74	18,607	389.91
		หญิง	16,979	273.10	16,144	271.18
154	Cerebral infarction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	91,373	816.18	85,111	793.54
		ชาย	47,709	958.36	44,130	924.73
		หญิง	43,664	702.33	40,981	688.37
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมอง หรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	รวม	20,907	186.75	20,456	190.72
		ชาย	10,899	218.93	10,767	225.62
		หญิง	10,008	160.98	9,689	162.75
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69) โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	รวม	102,469	915.29	92,578	863.16
		ชาย	55,655	1,117.98	49,993	1,047.59
		หญิง	46,814	752.99	42,585	715.31
157	Atherosclerosis (I70) ภาวะหลอดเลือดแข็ง	รวม	1,888	16.86	1,891	17.63
		ชาย	967	19.42	966	20.24
		หญิง	921	14.81	925	15.54
158	Other peripheral vascular diseases (I73) โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	รวม	1,963	17.53	1,953	18.21
		ชาย	1,055	21.19	1,003	21.02
		หญิง	908	14.61	950	15.96

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
159	Arterial embolism and thrombosis (I74) ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	รวม	4,777	42.67	5,145	47.97
		ชาย	2,607	52.37	2,689	56.35
		หญิง	2,170	34.90	2,456	41.25
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79) โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และแคปิลลารีอื่น ๆ	รวม	12,878	115.03	12,372	115.35
		ชาย	8,092	162.55	7,686	161.06
		หญิง	4,786	76.98	4,686	78.71
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82) หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด ก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ	รวม	17,342	154.91	15,586	145.32
		ชาย	6,943	139.47	6,187	129.65
		หญิง	10,399	167.27	9,399	157.88
162	Varicose veins of lower extremities (I83) หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	รวม	750	6.70	648	6.04
		ชาย	324	6.51	298	6.24
		หญิง	426	6.85	350	5.88
163	Haemorrhoids (I84, K64) ริดสีดวงทวาร	รวม	10,481	93.62	8,835	82.37
		ชาย	5,743	115.36	5,048	105.78
		หญิง	4,738	76.21	3,787	63.61
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99) โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	30,211	269.86	27,159	253.22
		ชาย	16,576	332.97	14,891	312.04
		หญิง	13,635	219.32	12,268	206.07
โรกระบบหายใจ (J00 - J99)						
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	รวม	3,282	29.32	3,677	34.28
		ชาย	1,223	24.57	1,304	27.33
		หญิง	2,059	33.12	2,373	39.86
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04) กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	รวม	295	2.64	291	2.71
		ชาย	128	2.57	148	3.10
		หญิง	167	2.69	143	2.40
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	รวม	8,630	77.09	9,041	84.29
		ชาย	3,375	67.80	3,481	72.94
		หญิง	5,255	84.53	5,560	93.39
168	Influenza (J10-J11) ไข้หวัดใหญ่	รวม	11,652	104.08	7,508	70.00
		ชาย	4,730	95.01	3,096	64.88
		หญิง	6,922	111.34	4,412	74.11

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
169	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	รวม	259,356	2,316.66	252,571	2,354.86
		ชาย	139,522	2,802.66	135,050	2,829.94
		หญิง	119,834	1,927.51	117,521	1,974.04
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	รวม	33,971	303.44	35,238	328.54
		ชาย	14,139	284.02	14,895	312.12
		หญิง	19,832	318.99	20,343	341.71
171	Chronic sinusitis (J32) ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	รวม	2,215	19.79	2,283	21.29
		ชาย	1,089	21.88	1,115	23.36
		หญิง	1,126	18.11	1,168	19.62
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34) โรคอื่นของจมูกและไซนัส	รวม	4,286	38.28	4,041	37.68
		ชาย	2,066	41.50	1,975	41.39
		หญิง	2,220	35.71	2,066	34.70
173	Chronic disease of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	รวม	209	1.87	217	2.02
		ชาย	79	1.59	88	1.84
		หญิง	130	2.09	129	2.17
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	3,735	33.36	3,253	30.33
		ชาย	1,921	38.59	1,645	34.47
		หญิง	1,814	29.18	1,608	27.01
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	รวม	213,467	1,906.77	213,577	1,991.30
		ชาย	159,810	3,210.20	159,553	3,343.40
		หญิง	53,657	863.06	54,024	907.46
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	47,046	420.23	44,983	419.40
		ชาย	9,578	192.40	8,960	187.75
		หญิง	37,468	602.67	36,023	605.09
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	11,709	104.59	11,525	107.45
		ชาย	5,307	106.60	5,043	105.67
		หญิง	6,402	102.97	6,482	108.88
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	100	0.89	116	1.08
		ชาย	74	1.49	86	1.80
		หญิง	26	0.42	30	0.50

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
179	Other diseases of the respiratory system	รวม	208,213	1,859.84	195,004	1,818.13
	(J22, J66-J99)	ชาย	114,770	2,305.46	107,549	2,253.66
	โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	หญิง	93,443	1,503.01	87,455	1,469.01
โรกระบบย่อยอาหาร (K00 - K93)						
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	2,256	20.15	1,973	18.40
		ชาย	1,057	21.23	913	19.13
		หญิง	1,199	19.29	1,060	17.81
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	5,836	52.13	5,676	52.92
		ชาย	2,614	52.51	2,643	55.38
		หญิง	3,222	51.83	3,033	50.95
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	รวม	6,859	61.27	6,717	62.63
		ชาย	2,912	58.50	2,912	61.02
		หญิง	3,947	63.49	3,805	63.91
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนิม	รวม	25,881	231.18	26,376	245.92
		ชาย	15,848	318.35	16,079	336.93
		หญิง	10,033	161.38	10,297	172.96
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ	รวม	27,014	241.30	26,104	243.38
		ชาย	13,139	263.93	12,657	265.22
		หญิง	13,875	223.18	13,447	225.87
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนิม	รวม	62,260	556.13	73,492	685.21
		ชาย	25,446	511.15	29,293	613.83
		หญิง	36,814	592.15	44,199	742.43
186	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	15,106	134.93	15,706	146.44
		ชาย	6,808	136.76	6,869	143.94
		หญิง	8,298	133.47	8,837	148.44
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	20,305	181.37	19,606	182.80
		ชาย	19,482	391.35	18,861	395.23
		หญิง	823	13.24	745	12.51
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	4,259	38.04	3,947	36.80
		ชาย	1,745	35.05	1,678	35.16
		หญิง	2,514	40.44	2,269	38.11

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	625	5.58	503	4.69
		ชาย	305	6.13	223	4.67
		หญิง	320	5.15	280	4.70
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	22,389	199.99	21,616	201.54
		ชาย	13,423	269.64	13,001	272.43
		หญิง	8,966	144.22	8,615	144.71
191	Diverticular disease of intestine (K57) โรคติ่งเนื้อของลำไส้	รวม	8,537	76.26	7,525	70.16
		ชาย	4,317	86.72	3,771	79.02
		หญิง	4,220	67.88	3,754	63.06
192	Other diseases of intestines and peritoneum (K52-K55, K58-K63, K65-K67) โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	รวม	63,968	571.39	58,476	545.20
		ชาย	32,279	648.41	29,490	617.96
		หญิง	31,689	509.71	28,986	486.89
193	Alcoholic liver disease (K70) โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	รวม	14,559	130.05	12,859	119.89
		ชาย	10,218	205.26	8,926	187.04
		หญิง	4,341	69.82	3,933	66.06
194	Other diseases of liver (K71-K77) โรคอื่น ๆ ของตับ	รวม	72,334	646.11	68,799	641.45
		ชาย	38,464	772.65	36,751	770.11
		หญิง	33,870	544.79	32,048	538.32
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81) โรคนิ่วในกระบังน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	รวม	43,671	390.09	42,155	393.03
		ชาย	18,775	377.14	17,971	376.58
		หญิง	24,896	400.45	24,184	406.23
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas (K85-K86) ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	รวม	6,870	61.37	6,283	58.58
		ชาย	3,718	74.69	3,412	71.50
		หญิง	3,152	50.70	2,871	48.23
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93) โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	83,239	743.52	80,682	752.24
		ชาย	46,589	935.86	45,521	953.88
		หญิง	36,650	589.51	35,161	590.61
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00 - L99)						
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	รวม	68,537	612.20	68,742	640.92
		ชาย	35,328	709.66	35,359	740.94
		หญิง	33,209	534.16	33,383	560.75

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99)	รวม	61,182	546.50	58,000	540.77
	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	28,782	578.16	27,402	574.20
		หญิง	32,400	521.15	30,598	513.96
โรกระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00 - M99)						
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14) ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	รวม	147,144	1,314.34	135,241	1,260.93
		ชาย	94,929	1,906.90	86,915	1,821.28
		หญิง	52,215	839.87	48,326	811.75
201	Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม	รวม	31,010	276.99	28,850	268.98
		ชาย	6,821	137.02	6,473	135.64
		หญิง	24,189	389.08	22,377	375.87
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา	รวม	513	4.58	422	3.93
		ชาย	161	3.23	120	2.51
		หญิง	352	5.66	302	5.07
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	รวม	9,245	82.58	8,889	82.88
		ชาย	4,299	86.36	4,141	86.77
		หญิง	4,946	79.56	4,748	79.75
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	รวม	7,178	64.12	6,368	59.37
		ชาย	1,851	37.18	1,678	35.16
		หญิง	5,327	85.68	4,690	78.78
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	รวม	2,277	20.34	2,208	20.59
		ชาย	1,124	22.58	1,083	22.69
		หญิง	1,153	18.55	1,125	18.90
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	44,566	398.08	40,183	374.65
		ชาย	18,004	361.66	16,379	343.22
		หญิง	26,562	427.24	23,804	399.84
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	41,714	372.60	41,745	389.21
		ชาย	19,830	398.34	19,606	410.84
		หญิง	21,884	352.00	22,139	371.88
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	รวม	10,892	97.29	10,449	97.42
		ชาย	2,206	44.31	2,138	44.80
		หญิง	8,686	139.71	8,311	139.60

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	5,694	50.86	5,399	50.34
		ชาย	3,249	65.26	2,988	62.61
		หญิง	2,445	39.33	2,411	40.50
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	รวม	5,434	48.54	5,189	48.38
		ชาย	2,303	46.26	2,199	46.08
		หญิง	3,131	50.36	2,990	50.22
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00 - N99)						
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	391	3.49	391	3.65
		ชาย	182	3.66	169	3.54
		หญิง	209	3.36	222	3.73
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	18,333	163.76	21,033	196.10
		ชาย	7,393	148.51	8,268	173.25
		หญิง	10,940	175.97	12,765	214.42
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	57,040	509.50	56,057	522.65
		ชาย	22,789	457.78	22,110	463.31
		หญิง	34,251	550.92	33,947	570.22
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	627,699	5,606.84	573,091	5,343.25
		ชาย	298,819	6,002.56	271,360	5,686.29
		หญิง	328,880	5,289.97	301,731	5,068.28
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	28,959	258.67	27,469	256.11
		ชาย	18,096	363.51	17,200	360.42
		หญิง	10,863	174.73	10,269	172.49
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	13,448	120.12	13,005	121.25
		ชาย	4,239	85.15	4,196	87.93
		หญิง	9,209	148.13	8,809	147.97
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	170,999	1,527.43	154,241	1,438.08
		ชาย	70,143	1,409.01	62,864	1,317.30
		หญิง	100,856	1,622.25	91,377	1,534.89
218	Hyperplasia of prostate (N40) ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	รวม	85,022	759.45	77,283	720.55
		ชาย	85,022	1,707.89	77,283	1,619.45
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	586	5.23	617	5.75
		ชาย	586	11.77	617	12.93
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อั้นพะ	รวม	769	6.87	758	7.07
		ชาย	769	15.45	758	15.88
		หญิง	0	0.00	0	0.00
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้ หรือเปิดลำบาก	รวม	1,012	9.04	846	7.89
		ชาย	1,012	20.33	846	17.73
		หญิง	0	0.00	0	0.00
222	Other diseases of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	3,744	33.44	3,512	32.74
		ชาย	3,744	75.21	3,512	73.59
		หญิง	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of the breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	1,735	15.50	1,752	16.33
		ชาย	173	3.48	191	4.00
		หญิง	1,562	25.12	1,561	26.22
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	95	0.85	135	1.26
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	95	1.53	135	2.27
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	104	0.93	118	1.10
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	104	1.67	118	1.98
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	1,952	17.44	1,862	17.36
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,952	31.40	1,862	31.28
227	Endometriosis (N80) เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	รวม	310	2.77	341	3.18
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	310	4.99	341	5.73
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	3,583	32.00	3,755	35.01
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,583	57.63	3,755	63.07

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
229	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่ และเอ็นยึดมดลูก	รวม	1,044	9.33	1,004	9.36
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,044	16.79	1,004	16.86
230	Disorders of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	37	0.33	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	37	0.60	0	0.00
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน	รวม	1,942	17.35	1,877	17.50
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,942	31.24	1,877	31.53
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	รวม	3,246	28.99	2,923	27.25
		ชาย	117	2.35	0	0.00
		หญิง	3,129	50.33	2,923	49.10
การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00 - O99)						
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
235	Medical abortion (O04) การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08) การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนดและตกเลือดก่อนคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	รวม	1	0.01	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	1	0.01	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	2	0.02	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2	0.03	0	0.00
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดียว	รวม	1	0.01	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มิได้ระบุรายละเอียด	รวม	1	0.01	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.02	0	0.00
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00 - P96)						
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บเจ็บจากการคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39) การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55) โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00 - Q99)						
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	6	0.05	5	0.05
		ชาย	3	0.06	0	0.00
		หญิง	3	0.05	5	0.08
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	รวม	43	0.38	55	0.51
		ชาย	19	0.38	22	0.46
		หญิง	24	0.39	33	0.55
256	Congenital malformations of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	1,731	15.46	1,595	14.87
		ชาย	661	13.28	616	12.91
		หญิง	1,070	17.21	979	16.44
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	24	0.21	12	0.11
		ชาย	9	0.18	7	0.15
		หญิง	15	0.24	5	0.08

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตัน และตีบ	รวม	4	0.04	2	0.02
		ชาย	3	0.06	2	0.04
		หญิง	1	0.02	0	0.00
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	240	2.14	188	1.75
		ชาย	97	1.95	81	1.70
		หญิง	143	2.30	107	1.80
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	29	0.26	26	0.24
		ชาย	29	0.58	26	0.54
		หญิง	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ	รวม	594	5.31	576	5.37
		ชาย	299	6.01	281	5.89
		หญิง	295	4.75	295	4.96
262	Congenital deformities of hip (Q65) ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	รวม	26	0.23	13	0.12
		ชาย	4	0.08	4	0.08
		หญิง	22	0.35	9	0.15
263	Congenital deformities of feet (Q66) ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	รวม	7	0.06	6	0.06
		ชาย	4	0.08	2	0.04
		หญิง	3	0.05	4	0.07
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	รวม	85	0.76	89	0.83
		ชาย	38	0.76	44	0.92
		หญิง	47	0.76	45	0.76
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	443	3.96	398	3.71
		ชาย	217	4.36	196	4.11
		หญิง	226	3.64	202	3.39
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified (Q90-Q99) ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	58	0.52	37	0.34
		ชาย	20	0.40	16	0.34
		หญิง	38	0.61	21	0.35
อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00 - R99)						
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	22,803	203.68	11,480	107.03
		ชาย	9,155	183.90	4,811	100.81
		หญิง	13,648	219.53	6,669	112.02

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	49,886	445.60	41,340	385.44
		ชาย	23,572	473.51	19,708	412.98
		หญิง	26,314	423.26	21,632	363.36
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	1,176	10.50	1,223	11.40
		ชาย	507	10.18	492	10.31
		หญิง	669	10.76	731	12.28
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจ ทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้	รวม	409,846	3,660.90	379,462	3,537.94
		ชาย	200,801	4,033.61	184,532	3,866.83
		หญิง	209,045	3,362.45	194,930	3,274.30
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00 - T98)						
271	Fracture of skull and facial bones (S02) กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	5,698	50.90	4,991	46.53
		ชาย	3,985	80.05	3,522	73.80
		หญิง	1,713	27.55	1,469	24.68
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	รวม	14,515	129.65	13,296	123.97
		ชาย	7,919	159.07	7,114	149.07
		หญิง	6,596	106.10	6,182	103.84
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว	รวม	29,150	260.38	27,109	252.75
		ชาย	8,114	162.99	7,481	156.76
		หญิง	21,036	338.36	19,628	329.70
274	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	30,744	274.62	28,504	265.76
		ชาย	14,549	292.25	13,176	276.10
		หญิง	16,195	260.49	15,328	257.47
275	Fractures involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	19	0.17	17	0.16
		ชาย	6	0.12	7	0.15
		หญิง	13	0.21	10	0.17
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่ง ที่ระบุเฉพาะ	รวม	4,862	43.43	4,484	41.81
		ชาย	2,372	47.65	2,181	45.70
		หญิง	2,490	40.05	2,303	38.68
277	Injury of the eye and orbit (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	2,754	24.60	2,596	24.20
		ชาย	1,857	37.30	1,713	35.90
		หญิง	897	14.43	883	14.83

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
 (ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	37,265	332.86	29,557	275.58
		ชาย	20,749	416.80	16,840	352.88
		หญิง	16,516	265.66	12,717	213.61
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	5,586	49.90	5,073	47.30
		ชาย	4,397	88.33	4,017	84.18
		หญิง	1,189	19.12	1,056	17.74
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจาก ตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	1,440	12.86	1,299	12.11
		ชาย	1,126	22.62	985	20.64
		หญิง	314	5.05	314	5.27
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะ และหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	52,145	465.78	47,679	444.54
		ชาย	30,333	609.32	27,360	573.32
		หญิง	21,812	350.84	20,319	341.31
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของ ร่างกาย	รวม	1,475	13.18	1,412	13.16
		ชาย	816	16.39	761	15.95
		หญิง	659	10.60	651	10.94
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	4,141	36.99	3,715	34.64
		ชาย	2,170	43.59	1,820	38.14
		หญิง	1,971	31.70	1,895	31.83
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เคมีชีววัตถุ และชีววัตถุ	รวม	9,663	86.31	9,150	85.31
		ชาย	4,162	83.60	3,898	81.68
		หญิง	5,501	88.48	5,252	88.22
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	9,281	82.90	9,878	92.10
		ชาย	4,691	94.23	5,049	105.80
		หญิง	4,590	73.83	4,829	81.11
286	Maltreatment syndrome (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	20	0.18	16	0.15
		ชาย	5	0.10	9	0.19
		หญิง	15	0.24	7	0.12

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562
(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	5,804	51.84	5,701	53.15
		ชาย	2,677	53.77	2,616	54.82
		หญิง	3,127	50.30	3,085	51.82
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรม และอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	72,306	645.86	70,008	652.72
		ชาย	38,124	765.82	36,544	765.77
		หญิง	34,182	549.81	33,464	562.11
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าสุดของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	867	7.74	717	6.68
		ชาย	490	9.84	418	8.76
		หญิง	377	6.06	299	5.02
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00 - Z99)						
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	รวม	18,347	163.88	18,654	173.92
		ชาย	8,070	162.11	8,041	168.50
		หญิง	10,277	165.30	10,613	178.27
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	862	7.70	620	5.78
		ชาย	472	9.48	391	8.19
		หญิง	390	6.27	229	3.85
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อ	รวม	552	4.93	568	5.30
		ชาย	284	5.70	307	6.43
		หญิง	268	4.31	261	4.38
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	61	0.54	60	0.56
		ชาย	4	0.08	8	0.17
		หญิง	57	0.92	52	0.87
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอดและการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 35 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
 จำแนกตามเพศและสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	0	0.00
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการ หรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	223,596	1,997.24	197,977	1,845.85
		ชาย	114,524	2,300.51	101,081	2,118.13
		หญิง	109,072	1,754.40	96,896	1,627.59
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	90,036	804.23	77,670	724.16
		ชาย	50,194	1,008.28	43,045	902.00
		หญิง	39,842	640.85	34,625	581.61

ผู้ป่วยใน

(รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกตามสาเหตุการป่วย
และเพศ ปี พ.ศ. 2561 – 2562

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
รวมทุกกลุ่มโรค		รวม	21,423,245	32,678.78	20,519,449	31,372.27
		ชาย	10,351,739	32,253.49	9,832,700	30,685.22
		หญิง	11,071,506	33,086.69	10,686,749	32,032.17
กลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด (A00 - B99)						
001	Cholera (A00) อหิวาตกโรค	รวม	138	0.21	125	0.19
		ชาย	67	0.21	59	0.18
		หญิง	71	0.21	66	0.20
002	Typhoid and paratyphoid fever (A01) ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	รวม	2,797	4.27	2,858	4.37
		ชาย	1,518	4.73	1,562	4.87
		หญิง	1,279	3.82	1,296	3.88
003	Shigellosis (A03) โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	รวม	90	0.14	113	0.17
		ชาย	42	0.13	53	0.17
		หญิง	48	0.14	60	0.18
004	Amoebiasis (A06) โรคบิดมีตัว	รวม	3,449	5.26	3,144	4.81
		ชาย	1,651	5.14	1,534	4.79
		หญิง	1,798	5.37	1,610	4.83
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	รวม	440,445	671.85	451,705	690.61
		ชาย	205,276	639.59	210,030	655.45
		หญิง	235,169	702.79	241,675	724.39
006	Other intestinal infectious diseases (A02, A04-A05, A07-A08) โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	รวม	63,108	96.26	66,926	102.32
		ชาย	30,516	95.08	32,331	100.90
		หญิง	32,592	97.40	34,595	103.69
007	Respiratory tuberculosis (A15-A16) วัณโรคทางเดินหายใจ	รวม	69,073	105.36	68,957	105.43
		ชาย	49,131	153.08	48,506	151.37
		หญิง	19,942	59.60	20,451	61.30
008	Other Tuberculosis (A17-A19) วัณโรคอื่น ๆ	รวม	16,689	25.46	16,760	25.62
		ชาย	10,294	32.07	10,479	32.70
		หญิง	6,395	19.11	6,281	18.83
009	Plaque (A20) กาฬโรค	รวม	13	0.02	0	0.00
		ชาย	6	0.02	0	0.00
		หญิง	7	0.02	0	0.00

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
010	Brucellosis (A23) โรคติดเชื้อบรูเซลลา	รวม	36	0.05	27	0.04
		ชาย	21	0.07	15	0.05
		หญิง	15	0.04	12	0.04
011	Leprosy (A30) โรคเรื้อน	รวม	302	0.46	285	0.44
		ชาย	204	0.64	194	0.61
		หญิง	98	0.29	91	0.27
012	Tetanus neonatorum (A33) บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	รวม	1	0.00	2	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	2	0.01
013	Other tetanus (A34-A35) บาดทะยักอื่น ๆ	รวม	202	0.31	188	0.29
		ชาย	140	0.44	110	0.34
		หญิง	62	0.19	78	0.23
014	Diphtheria (A36) โรคคอตีบ	รวม	78	0.12	73	0.11
		ชาย	34	0.11	34	0.11
		หญิง	44	0.13	39	0.12
015	Whooping cough (A37) โรคไอกรน	รวม	85	0.13	131	0.20
		ชาย	42	0.13	73	0.23
		หญิง	43	0.13	58	0.17
016	Meningococcal infection (A39) การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	รวม	96	0.15	105	0.16
		ชาย	57	0.18	62	0.19
		หญิง	39	0.12	43	0.13
017	Septicaemia (A40-A41) โลหิตเป็นพิษ	รวม	152,210	232.18	142,055	217.19
		ชาย	77,435	241.27	72,362	225.82
		หญิง	74,775	223.46	69,693	208.90
018	Other bacterial diseases (A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49) โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	รวม	63,149	96.33	58,110	88.84
		ชาย	36,511	113.76	34,434	107.46
		หญิง	26,638	79.61	23,676	70.97
019	Congenital syphilis (A50) ซิฟิลิสแต่กำเนิด	รวม	1,806	2.75	1,216	1.86
		ชาย	960	2.99	644	2.01
		หญิง	846	2.53	572	1.71

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
020	Early syphilis (A51) ซิฟิลิสระยะเริ่ม	รวม	386	0.59	328	0.50
		ชาย	209	0.65	196	0.61
		หญิง	177	0.53	132	0.40
021	Other syphilis (A52-A53) ซิฟิลิสอื่น ๆ	รวม	4,203	6.41	3,591	5.49
		ชาย	1,866	5.81	1,793	5.60
		หญิง	2,337	6.98	1,798	5.39
022	Gonococcal infection (A54) การติดเชื้อหนองใน	รวม	381	0.58	443	0.68
		ชาย	265	0.83	309	0.96
		หญิง	116	0.35	134	0.40
023	Sexually transmitted chlamydial diseases (A55-A56) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	รวม	50	0.08	44	0.07
		ชาย	30	0.09	26	0.08
		หญิง	20	0.06	18	0.05
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission (A57-A64) โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่	รวม	2,762	4.21	2,800	4.28
		ชาย	729	2.27	677	2.11
		หญิง	2,033	6.08	2,123	6.36
025	Relapsing fevers (A68) โรคไข้กลับซ้ำ	รวม	2	0.00	0	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00
026	Trachoma (A71) ริดสีดวงตา	รวม	13	0.02	8	0.01
		ชาย	4	0.01	4	0.01
		หญิง	9	0.03	4	0.01
027	Typhus fever (A75) ไข้รากสาดใหญ่	รวม	13,252	20.21	16,033	24.51
		ชาย	7,440	23.18	9,100	28.40
		หญิง	5,812	17.37	6,933	20.78
028	Acute poliomyelitis (A80) โรคโปลิโอเฉียบพลัน	รวม	272	0.41	283	0.43
		ชาย	192	0.60	164	0.51
		หญิง	80	0.24	119	0.36
029	Rabies (A82) โรคพิษสุนัขบ้า	รวม	3	0.00	12	0.02
		ชาย	2	0.01	9	0.03
		หญิง	1	0.00	3	0.01

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
030	Viral encephalitis (A83-A86) สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	รวม	876	1.34	737	1.13
		ชาย	484	1.51	425	1.33
		หญิง	392	1.17	312	0.94
031	Yellow fever (A95) ไข้เหลือง	รวม	154	0.23	153	0.23
		ชาย	89	0.28	88	0.27
		หญิง	65	0.19	65	0.19
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	รวม	176,128	268.66	126,482	193.38
		ชาย	91,335	284.58	65,570	204.63
		หญิง	84,793	253.40	60,912	182.58
033	Herpesviral infections (B00) เริม	รวม	6,083	9.28	5,875	8.98
		ชาย	2,820	8.79	2,696	8.41
		หญิง	3,263	9.75	3,179	9.53
034	Varicella and zoster (B01-B02) อีสุกอีใสและงูสวัด	รวม	11,780	17.97	12,147	18.57
		ชาย	5,690	17.73	5,858	18.28
		หญิง	6,090	18.20	6,289	18.85
035	Measles (B05) หัด	รวม	4,936	7.53	4,442	6.79
		ชาย	2,689	8.38	2,305	7.19
		หญิง	2,247	6.72	2,137	6.41
036	Rubella (B06) หัดเยอรมัน	รวม	63	0.10	63	0.10
		ชาย	27	0.08	30	0.09
		หญิง	36	0.11	33	0.10
037	Acute hepatitis B (B16) ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	รวม	5,950	9.08	6,466	9.89
		ชาย	3,809	11.87	4,265	13.31
		หญิง	2,141	6.40	2,201	6.60
038	Other viral hepatitis (B15, B17-B19) ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	รวม	63,379	96.68	56,723	86.72
		ชาย	42,906	133.68	39,111	122.05
		หญิง	20,473	61.18	17,612	52.79
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease (B20-B24) ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	รวม	66,057	100.76	67,260	102.83
		ชาย	39,133	121.93	39,454	123.13
		หญิง	26,924	80.46	27,806	83.34

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
040	Mumps (B26) คางทูม	รวม	190	0.29	134	0.20
		ชาย	117	0.36	70	0.22
		หญิง	73	0.22	64	0.19
041	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	รวม	61,690	94.10	48,798	74.61
		ชาย	32,521	101.33	26,229	81.85
		หญิง	29,169	87.17	22,569	67.65
042	Mycoses (B35-B49) โรคติดเชื้อรา	รวม	28,061	42.80	29,029	44.38
		ชาย	15,789	49.19	16,141	50.37
		หญิง	12,272	36.67	12,888	38.63
043	Malaria (B50-B54) มาลาเรีย	รวม	1,396	2.13	2,238	3.42
		ชาย	936	2.92	1,721	5.37
		หญิง	460	1.37	517	1.55
044	Leishmaniasis (B55) โรคพยาธิเม็ดเลือด	รวม	10	0.02	11	0.02
		ชาย	6	0.02	7	0.02
		หญิง	4	0.01	4	0.01
045	Trypanosomiasis (B56-B57) โรคทริพาโนโซม	รวม	17	0.03	26	0.04
		ชาย	10	0.03	8	0.02
		หญิง	7	0.02	18	0.05
046	Schistosomiasis (B65) โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้	รวม	11	0.02	17	0.03
		ชาย	6	0.02	6	0.02
		หญิง	5	0.01	11	0.03
047	Other fluke infections (B66) โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	รวม	461	0.70	548	0.84
		ชาย	258	0.80	307	0.96
		หญิง	203	0.61	241	0.72
048	Echinococcosis (B67) โรคพยาธิเอคโคโคคัส	รวม	9	0.01	17	0.03
		ชาย	5	0.02	8	0.02
		หญิง	4	0.01	9	0.03
049	Dracunculiasis (B72) โรคพยาธิจิ้งจอก	รวม	2	0.00	1	0.00
		ชาย	2	0.01	0	0.00
		หญิง	0	0.00	1	0.00

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
050	Onchocerciasis (B73) โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	รวม	1	0.00	1	0.00
		ชาย	1	0.00	0	0.00
		หญิง	0	0.00	1	0.00
051	Filariasis (B74) โรคพยาธิฟิลาเรีย	รวม	15	0.02	22	0.03
		ชาย	14	0.04	13	0.04
		หญิง	1	0.00	9	0.03
052	Hookworm diseases (B76) โรคพยาธิปากขอ	รวม	326	0.50	383	0.59
		ชาย	185	0.58	199	0.62
		หญิง	141	0.42	184	0.55
053	Other helminthiasis (B68-B71, B75, B77-B83) โรคพยาธิตัวติดอื่น ๆ	รวม	6,982	10.65	7,631	11.67
		ชาย	4,582	14.28	4,982	15.55
		หญิง	2,400	7.17	2,649	7.94
054	Sequelae of tuberculosis (B90) ผลตามหลังวัณโรค	รวม	29,593	45.14	27,977	42.77
		ชาย	20,340	63.37	19,005	59.31
		หญิง	9,253	27.65	8,972	26.89
055	Sequelae of poliomyelitis (B91) ผลตามหลังโรคโปลิโอ	รวม	65	0.10	70	0.11
		ชาย	43	0.13	36	0.11
		หญิง	22	0.07	34	0.10
056	Sequelae of leprosy (B92) ผลตามหลังโรคเรื้อน	รวม	34	0.05	38	0.06
		ชาย	21	0.07	25	0.08
		หญิง	13	0.04	13	0.04
057	Other infectious and parasitic diseases (A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	รวม	9,560	14.58	10,709	16.37
		ชาย	5,567	17.35	6,063	18.92
		หญิง	3,993	11.93	4,646	13.93
โรคเนื้องอกร้ายและเนื้องอกไม่ร้าย (C00 - D48)						
058	Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14) เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย	รวม	27,821	42.44	26,761	40.92
		ชาย	20,674	64.42	19,848	61.94
		หญิง	7,147	21.36	6,913	20.72
059	Malignant neoplasm of oesophagus (C15) เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	รวม	10,929	16.67	10,290	15.73
		ชาย	9,665	30.11	9,003	28.10
		หญิง	1,264	3.78	1,287	3.86

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
060	Malignant neoplasm of stomach (C16) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	รวม	12,606	19.23	12,660	19.36
		ชาย	7,169	22.34	7,238	22.59
		หญิง	5,437	16.25	5,422	16.25
061	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	รวม	72,684	110.87	65,815	100.62
		ชาย	37,750	117.62	34,579	107.91
		หญิง	34,934	104.40	31,236	93.63
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal (C19-C21) เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัมและซิกมอยด์ เร็กตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก	รวม	50,211	76.59	45,140	69.01
		ชาย	29,797	92.84	26,553	82.86
		หญิง	20,414	61.01	18,587	55.71
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts (C22) เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	รวม	57,695	88.01	57,100	87.30
		ชาย	39,372	122.67	39,038	121.83
		หญิง	18,323	54.76	18,062	54.14
064	Malignant neoplasm of pancreas (C25) เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	รวม	7,525	11.48	6,814	10.42
		ชาย	4,048	12.61	3,434	10.72
		หญิง	3,477	10.39	3,380	10.13
065	Other malignant neoplasms of digestive organs (C17, C23-C24, C26) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	รวม	8,576	13.08	7,691	11.76
		ชาย	4,434	13.82	3,934	12.28
		หญิง	4,142	12.38	3,757	11.26
066	Malignant neoplasm of larynx (C32) เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	รวม	6,094	9.30	5,633	8.61
		ชาย	5,728	17.85	5,285	16.49
		หญิง	366	1.09	348	1.04
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung (C33-C34) เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	รวม	45,681	69.68	45,106	68.96
		ชาย	27,971	87.15	27,690	86.41
		หญิง	17,710	52.93	17,416	52.20
068	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (C30-C31, C37-C39) เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะช่องอก	รวม	2,625	4.00	2,513	3.84
		ชาย	1,684	5.25	1,677	5.23
		หญิง	941	2.81	836	2.51
069	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage (C40-C41) เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	รวม	3,398	5.18	3,595	5.50
		ชาย	1,994	6.21	1,980	6.18
		หญิง	1,404	4.20	1,615	4.84
070	Malignant melanoma of skin (C43) เนื้องอกร้ายที่เมลาโนมาของผิวหนัง	รวม	1,003	1.53	935	1.43
		ชาย	591	1.84	483	1.51
		หญิง	412	1.23	452	1.35

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
071	Other malignant neoplasms of skin (C44) เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	รวม	3,078	4.70	3,092	4.73
		ชาย	1,516	4.72	1,588	4.96
		หญิง	1,562	4.67	1,504	4.51
072	Malignant neoplasm of mesothelial and soft tissue (C45-C49) เนื้องอกร้ายที่เมโสเธลิอัลและเนื้อเยื่ออ่อน	รวม	6,041	9.21	5,901	9.02
		ชาย	2,447	7.62	2,334	7.28
		หญิง	3,594	10.74	3,567	10.69
073	Malignant neoplasm of breast (C50) เนื้องอกร้ายที่เต้านม	รวม	50,635	77.24	48,934	74.82
		ชาย	374	1.17	388	1.21
		หญิง	50,261	150.20	48,546	145.51
074	Malignant neoplasm of cervix uteri (C53) เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	รวม	24,646	37.59	24,094	72.22
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,646	73.65	24,094	72.22
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus (C54-C55) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีระบุส่วนของมดลูก	รวม	11,327	17.28	10,550	31.62
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	11,327	33.85	10,550	31.62
076	Other malignant neoplasms of female genital organs (C51-C52, C56-C58) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	รวม	20,759	31.67	19,942	59.77
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	20,759	62.04	19,942	59.77
077	Malignant neoplasm of prostate (C61) เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	รวม	12,469	19.02	11,388	35.54
		ชาย	12,469	38.85	11,388	35.54
		หญิง	0	0.00	0	0.00
078	Other malignant neoplasms of male genital organs (C60, C62-C63) เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	2,710	4.13	2,335	7.29
		ชาย	2,710	8.44	2,335	7.29
		หญิง	0	0.00	0	0.00
079	Malignant neoplasm of bladder (C67) เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	รวม	12,888	19.66	12,511	19.13
		ชาย	10,277	32.02	9,989	31.17
		หญิง	2,611	7.80	2,522	7.56
080	Other malignant neoplasm of urinary tract (C64-C66, C68) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	รวม	4,267	6.51	4,215	6.44
		ชาย	2,758	8.59	2,755	8.60
		หญิง	1,509	4.51	1,460	4.38

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
081	Malignant neoplasm of the eye and adnexa (C69) เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	รวม	804	1.23	870	1.33
		ชาย	506	1.58	491	1.53
		หญิง	298	0.89	379	1.14
082	Malignant neoplasm of brain (C71) เนื้องอกร้ายของสมอง	รวม	4,941	7.54	4,833	7.39
		ชาย	2,680	8.35	2,613	8.15
		หญิง	2,261	6.76	2,220	6.65
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system (C70, C72) เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	444	0.68	467	0.71
		ชาย	202	0.63	187	0.58
		หญิง	242	0.72	280	0.84
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites (C73-C80, C97) เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิ ที่มีได้ระบุรายละเอียดและเกิดขึ้นหลายแห่ง	รวม	184,724	281.78	178,737	273.27
		ชาย	89,273	278.15	85,320	266.26
		หญิง	95,451	285.25	93,417	280.01
085	Hodgkin's disease (C81) โรคฮอดจกิน	รวม	2,331	3.56	2,114	3.23
		ชาย	1,346	4.19	1,135	3.54
		หญิง	985	2.94	979	2.93
086	Non-Hodgkin's lymphoma (C82-C85) เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดจกิน	รวม	25,300	38.59	25,076	38.34
		ชาย	14,450	45.02	14,693	45.85
		หญิง	10,850	32.42	10,383	31.12
087	Leukaemia (C91-C95) ลิวคีเมีย	รวม	24,942	38.05	24,269	37.10
		ชาย	13,878	43.24	13,321	41.57
		หญิง	11,064	33.06	10,948	32.82
088	Other malignant neoplasm of lymphoid, haematopoietic and related tissue (C88-C90, C96) เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟอัยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อ	รวม	7,682	11.72	7,352	11.24
		ชาย	4,029	12.55	3,828	11.95
		หญิง	3,653	10.92	3,524	10.56
089	Carcinoma in situ of cervix uteri (D06) มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	รวม	1,096	1.67	1,111	3.33
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,096	3.28	1,111	3.33
090	Benign neoplasm of skin (D22-D23) เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	รวม	937	1.43	989	1.51
		ชาย	400	1.25	412	1.29
		หญิง	537	1.60	577	1.73

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
091	Benign neoplasm of breast (D24) เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	รวม	1,310	2.00	1,366	2.09
		ชาย	10	0.03	12	0.04
		หญิง	1,300	3.88	1,354	4.06
092	Leiomyoma of uterus (D25) ไลโอไมโอมาที่มดลูก	รวม	24,465	37.32	24,773	74.25
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	24,465	73.11	24,773	74.25
093	Benign neoplasm of ovary (D27) เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	รวม	3,250	4.96	3,181	9.53
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	3,250	9.71	3,181	9.53
094	Benign neoplasm of urinary organs (D30) เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	รวม	240	0.37	238	0.36
		ชาย	131	0.41	127	0.40
		หญิง	109	0.33	111	0.33
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system (D33) เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาท ส่วนกลาง	รวม	1,809	2.76	1,755	2.68
		ชาย	728	2.27	743	2.32
		หญิง	1,081	3.23	1,012	3.03
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour (D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29 D31-D32, D34-D48) เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิด ที่ไม่ทราบพฤติกรรม	รวม	65,307	99.62	62,429	95.45
		ชาย	28,845	89.87	27,594	86.11
		หญิง	36,462	108.97	34,835	104.41
โรคเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (D50 - D89)						
097	Iron deficiency anaemia (D50) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	รวม	115,739	176.55	114,823	175.55
		ชาย	50,672	157.88	49,977	155.96
		หญิง	65,067	194.45	64,846	194.37
098	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	รวม	838,983	1,279.78	788,167	1,205.03
		ชาย	386,279	1,203.55	360,299	1,124.40
		หญิง	452,704	1,352.89	427,868	1,282.48
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood forming organs (D65-D77) ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	รวม	181,948	277.54	168,461	257.56
		ชาย	103,988	324.00	96,925	302.48
		หญิง	77,960	232.98	71,536	214.42
100	Certain disorders involving the immune mechanism (D80-D89) ความผิดปกติที่เกี่ยวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	รวม	2,320	3.54	2,208	3.38
		ชาย	1,530	4.77	1,478	4.61
		หญิง	790	2.36	730	2.19

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม (E00 - E90)						
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders (E00-E02) การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมไทรอยด์	รวม	1,509	2.30	1,365	2.09
		ชาย	575	1.79	495	1.54
		หญิง	934	2.79	870	2.61
102	Thyrotoxicosis (E05) โรคพิษไทรอยด์	รวม	37,574	57.31	36,380	55.62
		ชาย	10,663	33.22	9,924	30.97
		หญิง	26,911	80.42	26,456	79.30
103	Other disorders of thyroid (E03-E04, E06-E07) ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อื่น ๆ	รวม	45,881	69.99	43,397	66.35
		ชาย	11,233	35.00	10,656	33.25
		หญิง	34,648	103.54	32,741	98.14
104	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	รวม	1,002,310	1,528.91	941,226	1,439.04
		ชาย	412,552	1,285.41	384,309	1,199.33
		หญิง	589,758	1,762.47	556,917	1,669.29
105	Malnutrition (E40-E46) ทุพโภชนาการ	รวม	41,166	62.79	23,993	36.68
		ชาย	22,761	70.92	13,321	41.57
		หญิง	18,405	55.00	10,672	31.99
106	Vitamin A deficiency (E50) การขาดวิตามินเอ	รวม	121	0.18	99	0.15
		ชาย	59	0.18	54	0.17
		หญิง	62	0.19	45	0.13
107	Other vitamin deficiencies (E51-E56) การขาดวิตามินอื่น ๆ	รวม	4,827	7.36	3,949	6.04
		ชาย	2,401	7.48	1,885	5.88
		หญิง	2,426	7.25	2,064	6.19
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies (E64) ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการ และภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	รวม	61	0.09	75	0.11
		ชาย	29	0.09	25	0.08
		หญิง	32	0.10	50	0.15
109	Obesity (E66) โรคอ้วน	รวม	19,689	30.03	17,911	27.38
		ชาย	6,712	20.91	6,122	19.11
		หญิง	12,977	38.78	11,789	35.34
110	Volume depletion (E86) การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	รวม	59,234	90.35	64,018	97.88
		ชาย	30,874	96.20	33,265	103.81
		หญิง	28,360	84.75	30,753	92.18

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
111	Other Endocrine, nutritional and metabolic disorders (E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิกอื่น ๆ	รวม	2,381,615	3,632.89	2,172,092	3,320.92
		ชาย	1,148,564	3,578.64	1,040,312	3,246.53
		หญิง	1,233,051	3,684.92	1,131,780	3,392.37
โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรม (F00 - F99)						
112	Dementia (F00-F03) สมองเสื่อม	รวม	14,274	21.77	12,704	19.42
		ชาย	6,129	19.10	5,429	16.94
		หญิง	8,145	24.34	7,275	21.81
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol (F10) ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพยาแอลกอฮอล์	รวม	125,318	191.16	116,152	177.59
		ชาย	111,883	348.60	103,968	324.46
		หญิง	13,435	40.15	12,184	36.52
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use (F11-F19) ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	รวม	46,441	70.84	41,070	62.79
		ชาย	40,327	125.65	35,754	111.58
		หญิง	6,114	18.27	5,316	15.93
115	Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders (F20-F29) จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	รวม	69,350	105.79	66,314	101.39
		ชาย	45,697	142.38	43,045	134.33
		หญิง	23,653	70.69	23,269	69.75
116	Mood [affective] disorders (F30-F39) ความผิดปกติทางอารมณ์	รวม	50,952	77.72	45,766	69.97
		ชาย	15,681	48.86	14,509	45.28
		หญิง	35,271	105.41	31,257	93.69
117	Neurotic, stress-related, and somatoform disorders (F40-F48) โรคประสาท อาการทางกายที่เกิดจากจิตใจ และความเครียด	รวม	27,069	41.29	26,805	40.98
		ชาย	8,423	26.24	8,209	25.62
		หญิง	18,646	55.72	18,596	55.74
118	Mental retardation (F70-F79) ภาวะปัญญาอ่อน	รวม	6,876	10.49	6,961	10.64
		ชาย	4,001	12.47	3,973	12.40
		หญิง	2,875	8.59	2,988	8.96
119	Other mental and behavioral disorders (F04-F09, F50-F69, F80-F99) ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	รวม	61,402	93.66	54,190	82.85
		ชาย	36,230	112.88	32,451	101.27
		หญิง	25,172	75.23	21,739	65.16
โรกระบบประสาท (G00 - G99)						
120	Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09) การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	รวม	26,962	41.13	27,923	42.69
		ชาย	16,255	50.65	16,985	53.01
		หญิง	10,707	32.00	10,938	32.79

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
121	Parkinson's disease (G20)	รวม	20,227	30.85	18,533	28.34
	โรคพาร์กินสัน	ชาย	10,027	31.24	8,826	27.54
		หญิง	10,200	30.48	9,707	29.10
122	Alzheimer's disease (G30)	รวม	9,171	13.99	7,924	12.12
	โรคอัลไซเมอร์	ชาย	3,331	10.38	2,954	9.22
		หญิง	5,840	17.45	4,970	14.90
123	Multiple sclerosis (G35)	รวม	381	0.58	389	0.59
	โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	ชาย	114	0.36	102	0.32
		หญิง	267	0.80	287	0.86
124	Epilepsy (G40-G41)	รวม	92,714	141.42	88,171	134.81
	ลมบ้าหมู	ชาย	57,758	179.96	54,186	169.10
		หญิง	34,956	104.46	33,985	101.87
125	Migraine and other headache syndromes (G43-G44)	รวม	14,504	22.12	15,072	23.04
	โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	ชาย	4,464	13.91	4,747	14.81
		หญิง	10,040	30.00	10,325	30.95
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45)	รวม	14,404	21.97	13,510	20.66
	โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	ชาย	7,687	23.95	7,220	22.53
		หญิง	6,717	20.07	6,290	18.85
127	Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)	รวม	12,878	19.64	12,948	19.80
	ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาทและปมประสาท	ชาย	5,524	17.21	5,565	17.37
		หญิง	7,354	21.98	7,383	22.13
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80-G83)	รวม	53,719	81.94	49,911	76.31
	สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	ชาย	32,578	101.51	30,527	95.27
		หญิง	21,141	63.18	19,384	58.10
129	Other diseases of the nervous system (G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99)	รวม	115,350	175.95	110,124	168.37
	โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	ชาย	63,980	199.35	60,714	189.47
		หญิง	51,370	153.52	49,410	148.10
โรคของตาและส่วนประกอบของตา (H00 - H59)						
130	Inflammation of eyelid (H00-H01)	รวม	2,966	4.52	3,037	4.64
	การอักเสบของหนังตา	ชาย	1,425	4.44	1,479	4.62
		หญิง	1,541	4.61	1,558	4.67

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva (H10-H13) เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ	รวม	23,311	35.56	21,093	32.25
		ชาย	9,581	29.85	8,781	27.40
		หญิง	13,730	41.03	12,312	36.90
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea (H15-H19) กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาว และกระจกตาดอื่น ๆ	รวม	11,029	16.82	10,903	16.67
		ชาย	6,527	20.34	6,394	19.95
		หญิง	4,502	13.45	4,509	13.52
133	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	รวม	203,114	309.83	194,218	296.94
		ชาย	89,589	279.14	85,762	267.64
		หญิง	113,525	339.26	108,456	325.08
134	Retinal detachments and breaks (H33) จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	รวม	8,177	12.47	8,396	12.84
		ชาย	4,846	15.10	4,804	14.99
		หญิง	3,331	9.95	3,592	10.77
135	Glaucoma (H40-H42) ต้อหิน	รวม	23,494	35.84	22,735	34.76
		ชาย	11,450	35.68	11,061	34.52
		หญิง	12,044	35.99	11,674	34.99
136	Strabismus (H49-H50) ตาเหล่	รวม	3,607	5.50	3,481	5.32
		ชาย	1,775	5.53	1,675	5.23
		หญิง	1,832	5.47	1,806	5.41
137	Disorders of refraction and accommodation (H52) ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	รวม	1,296	1.98	1,226	1.87
		ชาย	593	1.85	557	1.74
		หญิง	703	2.10	669	2.01
138	Blindness and low vision (H54) ตาบอดและสายตาสั้นกลาง	รวม	199,056	303.64	189,299	289.42
		ชาย	87,107	271.40	82,771	258.31
		หญิง	111,949	334.55	106,528	319.30
139	Other diseases of the eye and adnexa (H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59) โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	รวม	51,483	78.53	49,439	75.59
		ชาย	24,581	76.59	23,199	72.40
		หญิง	26,902	80.40	26,240	78.65
โรคของหูและปุ่มกกหู (H60 - H95)						
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid (H65-H75) หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลาง และปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	9,855	15.03	9,988	15.27
		ชาย	5,096	15.88	5,173	16.14
		หญิง	4,759	14.22	4,815	14.43

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
141	Hearing loss (H90-H91)	รวม	3,810	5.81	3,684	5.63
	การสูญเสียการได้ยิน	ชาย	2,035	6.34	1,958	6.11
		หญิง	1,775	5.30	1,726	5.17
142	Other diseases of the ear and mastoid process (H60-H62, H80-H83, H92-H95) โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	รวม	27,163	41.43	26,310	40.23
		ชาย	8,621	26.86	8,641	26.97
		หญิง	18,542	55.41	17,669	52.96
โรกระบบไหลเวียนโลหิต (I00 - I99)						
143	Acute rheumatic fever (I00-I02) ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	รวม	480	0.73	603	0.92
		ชาย	246	0.77	304	0.95
		หญิง	234	0.70	299	0.90
144	Chronic rheumatic heart disease (I05-I09) โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	รวม	24,026	36.65	24,693	37.75
		ชาย	9,480	29.54	9,959	31.08
		หญิง	14,546	43.47	14,734	44.16
145	Essential (primary) hypertension (I10) ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	รวม	1,556,403	2,374.12	1,458,678	2,230.18
		ชาย	687,626	2,142.47	640,150	1,997.74
		หญิง	868,777	2,596.30	818,528	2,453.43
146	Other hypertensive diseases (I11-I15) โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	รวม	9,649	14.72	9,755	14.91
		ชาย	4,516	14.07	4,477	13.97
		หญิง	5,133	15.34	5,278	15.82
147	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	รวม	92,659	141.34	88,945	135.99
		ชาย	54,014	168.29	51,713	161.38
		หญิง	38,645	115.49	37,232	111.60
148	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	รวม	258,263	393.95	248,496	379.93
		ชาย	151,140	470.92	143,240	447.01
		หญิง	107,123	320.13	105,256	315.49
149	Pulmonary embolism (I26) ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	รวม	8,556	13.05	7,630	11.67
		ชาย	3,232	10.07	2,808	8.76
		หญิง	5,324	15.91	4,822	14.45
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias (I44-I49) ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ	รวม	276,660	422.01	249,967	382.18
		ชาย	134,015	417.56	119,666	373.45
		หญิง	142,645	426.29	130,301	390.56

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
151	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	รวม	216,131	329.68	211,987	324.11
		ชาย	96,837	301.72	94,675	295.46
		หญิง	119,294	356.50	117,312	351.63
152	Other heart diseases (I27-I43, I51-I52) โรคหัวใจอื่น ๆ	รวม	129,214	197.10	125,145	191.33
		ชาย	65,795	205.00	62,673	195.59
		หญิง	63,419	189.52	62,472	187.25
153	Intracranial haemorrhage (I60-I62) เลือดออกในสมอง	รวม	64,769	98.80	62,163	95.04
		ชาย	38,376	119.57	36,990	115.44
		หญิง	26,393	78.87	25,173	75.45
154	Cerebral infarction (I63) เนื้อสมองตาย	รวม	130,726	199.41	121,634	185.97
		ชาย	70,680	220.22	65,433	204.20
		หญิง	60,046	179.44	56,201	168.46
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64) เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมอง หรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	รวม	29,193	44.53	28,579	43.69
		ชาย	15,475	48.22	15,289	47.71
		หญิง	13,718	41.00	13,290	39.84
156	Other cerebrovascular diseases (I65-I69) โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	รวม	130,983	199.80	118,710	181.50
		ชาย	72,280	225.21	65,511	204.44
		หญิง	58,703	175.43	53,199	159.46
157	Atherosclerosis (I70) ภาวะหลอดเลือดแข็ง	รวม	2,538	3.87	2,424	3.71
		ชาย	1,381	4.30	1,281	4.00
		หญิง	1,157	3.46	1,143	3.43
158	Other peripheral vascular diseases (I73) โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	รวม	2,597	3.96	2,611	3.99
		ชาย	1,439	4.48	1,417	4.42
		หญิง	1,158	3.46	1,194	3.58
159	Arterial embolism and thrombosis (I74) ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	รวม	6,520	9.95	6,878	10.52
		ชาย	3,747	11.67	3,820	11.92
		หญิง	2,773	8.29	3,058	9.17
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries (I71-I72, I77-I79) โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และแคปิลลารีอื่น ๆ	รวม	17,201	26.24	16,760	25.62
		ชาย	10,612	33.06	10,141	31.65
		หญิง	6,589	19.69	6,619	19.84

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis (I80-I82)	รวม	30,415	46.39	28,497	43.57
		ชาย	13,044	40.64	12,150	37.92
	หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือด ก้อนเลือดและลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ	หญิง	17,371	51.91	16,347	49.00
162	Varicose veins of lower extremities (I83)	รวม	1,565	2.39	1,396	2.13
	หลอดเลือดดำขอดของระยะส่วนล่าง	ชาย	614	1.91	573	1.79
		หญิง	951	2.84	823	2.47
163	Haemorrhoids (I84, K64)	รวม	23,511	35.86	20,652	31.57
	ริดสีดวงทวาร	ชาย	12,893	40.17	11,577	36.13
		หญิง	10,618	31.73	9,075	27.20
164	Other diseases of the circulatory system (I85-I99)	รวม	60,972	93.01	56,552	86.46
	โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	ชาย	37,077	115.52	34,535	107.77
		หญิง	23,895	71.41	22,017	65.99
โรกระบบหายใจ (J00 - J99)						
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03)	รวม	65,360	99.70	71,642	109.53
	คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	33,947	105.77	37,498	117.02
		หญิง	31,413	93.88	34,144	102.34
166	Acute laryngitis and tracheitis (J04)	รวม	1,081	1.65	1,062	1.62
	กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	ชาย	587	1.83	599	1.87
		หญิง	494	1.48	463	1.39
167	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06)	รวม	78,856	120.29	80,691	123.37
	การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	ชาย	42,297	131.79	43,456	135.61
		หญิง	36,559	109.25	37,235	111.61
168	Influenza (J10-J11)	รวม	106,618	162.63	59,829	91.47
	ไข้หวัดใหญ่	ชาย	55,220	172.05	31,278	97.61
		หญิง	51,398	153.60	28,551	85.58
169	Pneumonia (J12-J18)	รวม	523,336	798.29	561,712	858.80
	ปอดบวม	ชาย	296,074	922.49	317,107	989.61
		หญิง	227,262	679.16	244,605	733.17
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21)	รวม	175,042	267.01	198,812	303.96
	หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	ชาย	94,884	295.64	108,849	339.69
		หญิง	80,158	239.55	89,963	269.65

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
171	Chronic sinusitis (J32) ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	รวม	6,295	9.60	6,344	9.70
		ชาย	3,348	10.43	3,308	10.32
		หญิง	2,947	8.81	3,036	9.10
172	Other diseases of nose and nasal sinuses (J30-J31, J33-J34) โรคอื่นของจมูกและไซนัส	รวม	17,975	27.42	17,176	26.26
		ชาย	9,885	30.80	9,362	29.22
		หญิง	8,090	24.18	7,814	23.42
173	Chronic disease of tonsils and adenoids (J35) โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	รวม	10,221	15.59	11,329	17.32
		ชาย	5,650	17.60	6,369	19.88
		หญิง	4,571	13.66	4,960	14.87
174	Other diseases of upper respiratory tract (J36-J39) โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	รวม	10,397	15.86	9,784	14.96
		ชาย	5,848	18.22	5,491	17.14
		หญิง	4,549	13.59	4,293	12.87
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	รวม	253,159	386.17	254,396	388.95
		ชาย	189,498	590.43	189,703	592.01
		หญิง	63,661	190.25	64,693	193.91
176	Asthma (J45-J46) โรคหืด	รวม	130,458	199.00	135,090	206.54
		ชาย	49,129	153.07	51,943	162.10
		หญิง	81,329	243.05	83,147	249.22
177	Bronchioectasis (J47) โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	รวม	15,911	24.27	15,543	23.76
		ชาย	7,905	24.63	7,479	23.34
		หญิง	8,006	23.93	8,064	24.17
178	Pneumoconiosis (J60-J65) โรคฝุ่นสะสมในปอด	รวม	212	0.32	245	0.37
		ชาย	175	0.55	199	0.62
		หญิง	37	0.11	46	0.14
179	Other diseases of the respiratory system (J22, J66-J99) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	รวม	344,373	525.30	330,809	505.78
		ชาย	201,717	628.50	193,452	603.71
		หญิง	142,656	426.32	137,357	411.71
โรคระบบย่อยอาหาร (K00 - K93)						
180	Dental caries (K02) ฟันผุ	รวม	10,082	15.38	9,130	13.96
		ชาย	5,655	17.62	5,184	16.18
		หญิง	4,427	13.23	3,946	11.83

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
181	Other disorders of teeth and supporting structures (K00-K01, K03-K08) ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	รวม	20,684	31.55	20,384	31.17
		ชาย	11,261	35.09	11,410	35.61
		หญิง	9,423	28.16	8,974	26.90
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws (K09-K14) โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	รวม	21,379	32.61	21,198	32.41
		ชาย	10,820	33.71	10,926	34.10
		หญิง	10,559	31.56	10,272	30.79
183	Gastric and duodenal ulcer (K25-K27) แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารดูโอเดนิม	รวม	41,537	63.36	42,550	65.05
		ชาย	27,995	87.23	28,532	89.04
		หญิง	13,542	40.47	14,018	42.02
184	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ	รวม	97,811	149.20	94,068	143.82
		ชาย	51,304	159.85	49,635	154.90
		หญิง	46,507	138.98	44,433	133.18
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum (K20-K23, K28, K30-K31) โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนิม	รวม	132,214	201.68	157,500	240.80
		ชาย	59,000	183.83	69,254	216.12
		หญิง	73,214	218.80	88,246	264.51
186	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	รวม	85,726	130.77	90,352	138.14
		ชาย	40,626	126.58	42,787	133.53
		หญิง	45,100	134.78	47,565	142.57
187	Inguinal hernia (K40) ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	รวม	35,641	54.37	35,275	53.93
		ชาย	33,623	104.76	33,281	103.86
		หญิง	2,018	6.03	1,994	5.98
188	Other hernia (K41-K46) ไส้เลื่อนอื่น ๆ	รวม	7,251	11.06	6,775	10.36
		ชาย	3,371	10.50	3,178	9.92
		หญิง	3,880	11.60	3,597	10.78
189	Crohn's disease and ulcerative colitis (K50-K51) โรคโครนและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	รวม	1,492	2.28	1,322	2.02
		ชาย	788	2.46	631	1.97
		หญิง	704	2.10	691	2.07
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56) ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	รวม	40,501	61.78	39,862	60.95
		ชาย	24,649	76.80	24,315	75.88
		หญิง	15,852	47.37	15,547	46.60

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
191	Diverticular disease of intestine (K57)	รวม	12,061	18.40	10,779	16.48
	โรคดีงเนื้อของลำไส้	ชาย	6,299	19.63	5,583	17.42
		หญิง	5,762	17.22	5,196	15.57
192	Other diseases of intestines and peritoneum (K52-K55, K58-K63, K65-K67)	รวม	127,611	194.66	119,628	182.90
	โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	ชาย	69,541	216.67	65,439	204.22
		หญิง	58,070	173.54	54,189	162.42
193	Alcoholic liver disease (K70)	รวม	63,953	97.55	58,579	89.56
	โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	ชาย	50,942	158.72	46,852	146.21
		หญิง	13,011	38.88	11,727	35.15
194	Other diseases of liver (K71-K77)	รวม	157,270	239.90	152,062	232.49
	โรคอื่น ๆ ของตับ	ชาย	98,687	307.48	96,180	300.15
		หญิง	58,583	175.07	55,882	167.50
195	Cholelithiasis and cholecystitis (K80-K81)	รวม	78,995	120.50	76,330	116.70
	โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	ชาย	31,450	97.99	30,264	94.45
		หญิง	47,545	142.09	46,066	138.08
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas (K85-K86)	รวม	23,200	35.39	22,039	33.70
	ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	ชาย	16,283	50.73	15,651	48.84
		หญิง	6,917	20.67	6,388	19.15
197	Other diseases of the digestive system (K82-K83, K87-K93)	รวม	142,651	217.60	139,010	212.53
	โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	ชาย	87,443	272.45	86,375	269.55
		หญิง	55,208	164.99	52,635	157.77
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00 - L99)						
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08)	รวม	155,351	236.97	159,358	243.64
	โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	86,904	270.77	89,189	278.33
		หญิง	68,447	204.55	70,169	210.32
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue (L10-L99)	รวม	118,993	181.51	116,236	177.71
	โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	ชาย	62,878	195.91	61,683	192.50
		หญิง	56,115	167.70	54,553	163.52
โรคระบบกล้ามเนื้อเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00 - M99)						
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies (M05-M14)	รวม	189,919	289.70	175,441	268.23
	ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	ชาย	125,537	391.14	115,223	359.58
		หญิง	64,382	192.40	60,218	180.50

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
201	Arthrosis (M15-M19) โรคข้อเสื่อม	รวม	39,568	60.36	36,693	56.10
		ชาย	9,083	28.30	8,571	26.75
		หญิง	30,485	91.10	28,122	84.29
202	Acquired deformities of limbs (M20-M21) ความพิการของแขนขา	รวม	2,007	3.06	1,783	2.73
		ชาย	947	2.95	814	2.54
		หญิง	1,060	3.17	969	2.90
203	Other disorders of joints (M00-M03, M22-M25) ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	รวม	24,940	38.04	24,000	36.69
		ชาย	15,631	48.70	15,111	47.16
		หญิง	9,309	27.82	8,889	26.64
204	Systemic connective tissue disorders (M30-M36) ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	รวม	31,264	47.69	29,424	44.99
		ชาย	5,817	18.12	5,593	17.45
		หญิง	25,447	76.05	23,831	71.43
205	Cervical and other intervertebral disc disorders (M50-M51) กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	รวม	8,402	12.82	8,178	12.50
		ชาย	4,160	12.96	4,038	12.60
		หญิง	4,242	12.68	4,140	12.41
206	Other dorsopathies (M40-M49, M53-M54) พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	รวม	71,615	109.24	64,286	98.29
		ชาย	29,626	92.31	26,869	83.85
		หญิง	41,989	125.48	37,417	112.15
207	Soft tissue disorders (M60-M79) เนื้อเยื่อผิดปกติ	รวม	90,163	137.53	89,530	136.88
		ชาย	48,459	150.99	46,877	146.29
		หญิง	41,704	124.63	42,653	127.85
208	Disorders of bone density and structure (M80-M85) ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	รวม	16,257	24.80	15,859	24.25
		ชาย	5,250	16.36	5,169	16.13
		หญิง	11,007	32.89	10,690	32.04
209	Osteomyelitis (M86) กระดูกอักเสบ	รวม	12,492	19.06	11,999	18.35
		ชาย	7,739	24.11	7,424	23.17
		หญิง	4,753	14.20	4,575	13.71
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M87-M99) โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	รวม	13,537	20.65	13,269	20.29
		ชาย	7,007	21.83	6,884	21.48
		หญิง	6,530	19.51	6,385	19.14

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ (N00 - N99)						
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes (N00-N01) กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	รวม	3,371	5.14	3,708	5.67
		ชาย	1,938	6.04	2,152	6.72
		หญิง	1,433	4.28	1,556	4.66
212	Other glomerular diseases (N02-N08) โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	รวม	41,010	62.56	43,843	67.03
		ชาย	16,414	51.14	17,426	54.38
		หญิง	24,596	73.50	26,417	79.18
213	Renal tubulo-interstitial diseases (N10-N16) โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	รวม	101,429	154.72	102,644	156.93
		ชาย	38,509	119.98	38,123	118.97
		หญิง	62,920	188.03	64,521	193.39
214	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	รวม	855,419	1,304.85	787,124	1,203.44
		ชาย	426,362	1,328.44	390,075	1,217.32
		หญิง	429,057	1,282.22	397,049	1,190.10
215	Urolithiasis (N20-N23) นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	58,526	89.27	55,957	85.55
		ชาย	35,996	112.15	34,394	107.33
		หญิง	22,530	67.33	21,563	64.63
216	Cystitis (N30) กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	รวม	24,495	37.36	24,116	36.87
		ชาย	7,176	22.36	7,133	22.26
		หญิง	17,319	51.76	16,983	50.90
217	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	รวม	262,933	401.08	241,420	369.11
		ชาย	108,817	339.05	99,938	311.88
		หญิง	154,116	460.57	141,482	424.07
218	Hyperplasia of prostate (N40) ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	รวม	90,225	137.63	82,284	256.79
		ชาย	90,225	281.12	82,284	256.79
		หญิง	0	0.00	0	0.00
219	Other disorders of prostate (N41-N42) ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	รวม	814	1.24	838	2.62
		ชาย	814	2.54	838	2.62
		หญิง	0	0.00	0	0.00
220	Hydrocele and spermatocele (N43) ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อันทะ	รวม	3,201	4.88	3,200	9.99
		ชาย	3,201	9.97	3,200	9.99
		หญิง	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis (N47) หนังหุ้มปลายองคชาติยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้ หรือเปิดลำบาก	รวม	5,281	8.06	5,194	16.21
		ชาย	5,281	16.45	5,194	16.21
		หญิง	0	0.00	0	0.00
222	Other diseases of male genital organs (N44-N46, N48-N51) โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	รวม	12,053	18.39	11,597	36.19
		ชาย	12,053	37.55	11,597	36.19
		หญิง	0	0.00	0	0.00
223	Disorders of the breast (N60-N64) ความผิดปกติของเต้านม	รวม	9,182	14.01	9,521	14.56
		ชาย	515	1.60	515	1.61
		หญิง	8,667	25.90	9,006	26.99
224	Salpingitis and oophoritis (N70) ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	รวม	2,808	4.28	2,818	8.45
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,808	8.39	2,818	8.45
225	Inflammatory disease of cervix uteri (N72) ปากมดลูกอักเสบ	รวม	589	0.90	656	1.97
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	589	1.76	656	1.97
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs (N71, N73-N77) การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	รวม	20,889	31.86	20,864	62.54
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	20,889	62.43	20,864	62.54
227	Endometriosis (N80) เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	รวม	14,059	21.45	13,723	41.13
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	14,059	42.01	13,723	41.13
228	Female genital prolapse (N81) การหย่อนตัวของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	รวม	4,591	7.00	4,801	14.39
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,591	13.72	4,801	14.39
229	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament (N83) ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อนำไข่ และเอ็นยึดมดลูก	รวม	9,746	14.87	9,465	28.37
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,746	29.13	9,465	28.37
230	Disorders of menstruation (N91-N92) ความผิดปกติของระดู	รวม	10,190	15.54	10,107	30.29
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,190	30.45	10,107	30.29

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
231	Menopausal and other perimenopausal disorders (N95) การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่น ในระยะหมดประจำเดือน	รวม	4,394	6.70	4,452	13.34
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	4,394	13.13	4,452	13.34
232	Female infertility (N97) ภาวะมีบุตรยากในสตรี	รวม	301	0.46	300	0.90
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	301	0.90	300	0.90
233	Other disorders of genitourinary tract (N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99) ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	รวม	25,305	38.60	24,412	73.17
		ชาย	354	1.10	0	0.00
		หญิง	24,951	74.56	24,412	73.17
การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด (O00 - O99)						
234	Spontaneous abortion (O03) แท้งเอง	รวม	10,394	15.85	11,235	33.68
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	10,394	31.06	11,235	33.68
235	Medical abortion (O04) การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	รวม	2,306	3.52	2,513	7.53
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	2,306	6.89	2,513	7.53
236	Other pregnancies with abortive outcome (O00-O02, O05-O08) การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	รวม	25,558	38.99	27,334	81.93
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	25,558	76.38	27,334	81.93
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O16) การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด	รวม	26,123	39.85	26,631	79.82
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	26,123	78.07	26,631	79.82
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage (O44-O46) รกเกาะต่ำ รกออกตัวก่อนกำหนดและตกเลือดก่อนคลอด	รวม	5,265	8.03	5,615	16.83
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	5,265	15.73	5,615	16.83
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำและปัญหาที่อาจจะได้เกิดได้ในระยะคลอด	รวม	148,321	226.25	152,642	457.52
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	148,321	443.25	152,642	457.52
240	Obstructed labour (O64-O66) การคลอดติดขัด	รวม	16,805	25.63	19,843	59.48
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,805	50.22	19,843	59.48

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
241	Postpartum haemorrhage (O72) ตกเลือดหลังคลอด	รวม	9,911	15.12	11,456	34.34
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	9,911	29.62	11,456	34.34
242	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	รวม	280,033	427.16	290,717	871.39
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	280,033	836.87	290,717	871.39
243	Single spontaneous delivery (O80) การคลอดของครรภ์เดี่ยว	รวม	193,042	294.46	209,357	627.52
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	193,042	576.90	209,357	627.52
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด	รวม	71,070	108.41	70,413	211.05
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	71,070	212.39	70,413	211.05
ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด (P00 - P96)						
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labor and delivery (P00-P04) ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัย ทางมารดา และโรคแทรกในระยะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	รวม	27,595	42.09	29,629	45.30
		ชาย	14,532	45.28	15,669	48.90
		หญิง	13,063	39.04	13,960	41.84
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	รวม	61,598	93.96	64,542	98.68
		ชาย	31,013	96.63	32,408	101.14
		หญิง	30,585	91.40	32,134	96.32
247	Birth trauma (P10-P15) บาดเจ็บจากการคลอด	รวม	9,114	13.90	9,326	14.26
		ชาย	5,308	16.54	5,516	17.21
		หญิง	3,806	11.37	3,810	11.42
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (P20-P21) ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด	รวม	10,986	16.76	11,859	18.13
		ชาย	6,208	19.34	6,640	20.72
		หญิง	4,778	14.28	5,219	15.64
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	78,072	119.09	77,356	118.27
		ชาย	46,799	145.81	46,025	143.63
		หญิง	31,273	93.46	31,331	93.91

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรกระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
250	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	รวม	36,043	54.98	35,103	53.67
		ชาย	19,934	62.11	19,535	60.96
		หญิง	16,109	48.14	15,568	46.66
251	Other infections specific to the perinatal period (P38-P39) การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	4,896	7.47	5,022	7.68
		ชาย	2,816	8.77	2,855	8.91
		หญิง	2,080	6.22	2,167	6.50
252	Haemolytic disease of fetus and newborn (P55) โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	รวม	7,684	11.72	7,549	11.54
		ชาย	3,922	12.22	3,801	11.86
		หญิง	3,762	11.24	3,748	11.23
253	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	รวม	228,497	348.55	232,873	356.04
		ชาย	126,432	393.93	128,547	401.16
		หญิง	102,065	305.02	104,326	312.70
ความผิดปกติ ความพิการแต่กำเนิด และโครโมโซมผิดปกติ (Q00 - Q99)						
254	Spina bifida (Q05) กระดูกสันหลังแยก	รวม	662	1.01	619	0.95
		ชาย	323	1.01	304	0.95
		หญิง	339	1.01	315	0.94
255	Other congenital malformations of the nervous system (Q00-Q04, Q06-Q07) ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	รวม	3,480	5.31	3,380	5.17
		ชาย	1,730	5.39	1,706	5.32
		หญิง	1,750	5.23	1,674	5.02
256	Congenital malformations of the circulatory system (Q20-Q28) ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	รวม	34,387	52.45	34,232	52.34
		ชาย	17,232	53.69	17,070	53.27
		หญิง	17,155	51.27	17,162	51.44
257	Cleft lip and cleft palate (Q35-Q37) ปากแหว่งและเพดานโหว่	รวม	4,568	6.97	4,493	6.87
		ชาย	2,445	7.62	2,404	7.50
		หญิง	2,123	6.34	2,089	6.26
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine (Q41) ลำไส้เล็กไม่มี ตัน และตีบ	รวม	408	0.62	381	0.58
		ชาย	210	0.65	213	0.66
		หญิง	198	0.59	168	0.50
259	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	รวม	37,433	57.10	34,482	52.72
		ชาย	21,968	68.45	20,291	63.32
		หญิง	15,465	46.22	14,191	42.54

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
260	Undescended testicle (Q53) อัณฑะไม่ลงถุง	รวม	2,956	4.51	2,853	8.90
		ชาย	2,956	9.21	2,853	8.90
		หญิง	0	0.00	0	0.00
261	Other malformations of the genitourinary system (Q50-Q52, Q54-Q64) ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	รวม	5,451	8.31	5,225	7.99
		ชาย	3,498	10.90	3,413	10.65
		หญิง	1,953	5.84	1,812	5.43
262	Congenital deformities of hip (Q65) ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	รวม	355	0.54	334	0.51
		ชาย	134	0.42	140	0.44
		หญิง	221	0.66	194	0.58
263	Congenital deformities of feet (Q66) ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	รวม	2,467	3.76	2,717	4.15
		ชาย	1,240	3.86	1,400	4.37
		หญิง	1,227	3.67	1,317	3.95
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system (Q67-Q79) ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	รวม	5,708	8.71	5,771	8.82
		ชาย	3,206	9.99	3,238	10.10
		หญิง	2,502	7.48	2,533	7.59
265	Other congenital malformations (Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	รวม	11,654	17.78	11,410	17.44
		ชาย	6,192	19.29	6,123	19.11
		หญิง	5,462	16.32	5,287	15.85
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified (Q90-Q99) ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	6,871	10.48	6,870	10.50
		ชาย	3,651	11.38	3,605	11.25
		หญิง	3,220	9.62	3,265	9.79
อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น (R00 - R99)						
267	Abdominal and pelvic pain (R10) ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	รวม	61,557	93.90	38,063	58.19
		ชาย	25,604	79.78	15,472	48.28
		หญิง	35,953	107.44	22,591	67.71
268	Fever of unknown origin (R50) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	รวม	136,667	208.47	113,638	173.74
		ชาย	71,482	222.72	60,062	187.44
		หญิง	65,185	194.80	53,576	160.59
269	Senility (R54) ชราภาพ	รวม	1,184	1.81	1,223	1.87
		ชาย	509	1.59	492	1.54
		หญิง	675	2.02	731	2.19

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not Elsewhere classified (R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99) อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้	รวม	789,313	1,204.01	744,610	1,138.44
		ชาย	413,534	1,288.47	387,975	1,210.77
		หญิง	375,779	1,123.00	356,635	1,068.97
การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลติดตามจากเหตุภายนอก (S00 - T98)						
271	Fracture of skull and facial bones (S02) กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	รวม	41,438	63.21	37,804	57.80
		ชาย	32,605	101.59	30,025	93.70
		หญิง	8,833	26.40	7,779	23.32
272	Fracture of neck, thorax and pelvis (S12, S22, S32, T08) กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	รวม	37,607	57.37	34,771	53.16
		ชาย	25,287	78.79	23,369	72.93
		หญิง	12,320	36.82	11,402	34.18
273	Fracture of femur (S72) กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว	รวม	45,704	69.72	42,932	65.64
		ชาย	20,091	62.60	18,962	59.18
		หญิง	25,613	76.54	23,970	71.85
274	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	รวม	142,709	217.69	136,301	208.39
		ชาย	95,103	296.32	91,283	284.87
		หญิง	47,606	142.27	45,018	134.94
275	Fractures involving multiple body regions (T02) กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	78	0.12	88	0.13
		ชาย	59	0.18	59	0.18
		หญิง	19	0.06	29	0.09
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions (S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03) กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	22,482	34.29	21,164	32.36
		ชาย	15,227	47.44	14,229	44.40
		หญิง	7,255	21.68	6,935	20.79
277	Injury of the eye and orbit (S05) การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	รวม	11,004	16.79	11,185	17.10
		ชาย	8,575	26.72	8,638	26.96
		หญิง	2,429	7.26	2,547	7.63
278	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	รวม	116,006	176.95	100,179	153.16
		ชาย	79,493	247.68	70,088	218.73
		หญิง	36,513	109.12	30,091	90.19
279	Injury of other internal organs (S26-S27, S36-S37) การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	รวม	26,042	39.72	24,063	36.79
		ชาย	20,857	64.99	19,364	60.43
		หญิง	5,185	15.50	4,699	14.08

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions (S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05) การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	รวม	6,374	9.72	6,322	9.67
		ชาย	5,150	16.05	5,055	15.78
		หญิง	1,224	3.66	1,267	3.80
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	รวม	209,636	319.78	203,295	310.82
		ชาย	147,462	459.46	143,450	447.67
		หญิง	62,174	185.80	59,845	179.38
282	Effects of foreign body entering through natural orifice (T15-T19) ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	รวม	6,843	10.44	6,507	9.95
		ชาย	4,045	12.60	3,895	12.16
		หญิง	2,798	8.36	2,612	7.83
283	Burns and corrosions (T20-T32) แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	รวม	21,519	32.82	21,800	33.33
		ชาย	13,988	43.58	14,148	44.15
		หญิง	7,531	22.51	7,652	22.94
284	Poisoning by drugs and biological substances (T36-T50) การเป็นพิษจากยา เครื่องยา และชีววัตถุ	รวม	30,816	47.01	29,463	45.05
		ชาย	12,459	38.82	12,179	38.01
		หญิง	18,357	54.86	17,284	51.81
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source (T51-T65) การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	รวม	43,255	65.98	46,969	71.81
		ชาย	25,166	78.41	27,478	85.75
		หญิง	18,089	54.06	19,491	58.42
286	Maltreatment syndrome (T74) กลุ่มอาการจากการทารุณ	รวม	418	0.64	449	0.69
		ชาย	86	0.27	98	0.31
		หญิง	332	0.99	351	1.05
287	Other and unspecified effects of external causes (T33-T35, T66-T73, T75-T78) อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	รวม	38,244	58.34	38,730	59.21
		ชาย	20,797	64.80	21,285	66.42
		หญิง	17,447	52.14	17,445	52.29

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของ การบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทาง ศัลยกรรม และอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	รวม	155,993	237.95	152,966	233.87
		ชาย	88,391	275.40	86,699	270.56
		หญิง	67,602	202.03	66,267	198.63
289	Sequela of injuries, of poisoning and of other consequences of external causes (T90-T98) ผลระยะล่าช้าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	รวม	2,741	4.18	2,406	3.68
		ชาย	1,953	6.09	1,755	5.48
		หญิง	788	2.35	651	1.95
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการเข้ารับบริการสุขภาพ (Z00 - Z99)						
290	Persons encountering health services for examination and investigation (Z00-Z13) บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	รวม	73,595	112.26	69,584	106.39
		ชาย	33,669	104.90	31,216	97.42
		หญิง	39,926	119.32	38,368	115.00
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status (Z21) การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	รวม	7,954	12.13	6,281	9.60
		ชาย	4,193	13.06	3,312	10.34
		หญิง	3,761	11.24	2,969	8.90
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease (Z20, Z22-Z29) บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	รวม	55,916	85.29	69,335	106.01
		ชาย	28,608	89.14	36,180	112.91
		หญิง	27,308	81.61	33,155	99.38
293	Contraceptive management (Z30) การรับบริการคุมกำเนิด	รวม	90,174	137.55	88,602	135.46
		ชาย	83	0.26	97	0.30
		หญิง	90,091	269.23	88,505	265.28
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy (Z34-Z36) การตรวจคัดกรองก่อนการคลอดและการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	รวม	16,840	25.69	21,008	62.97
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	16,840	50.33	21,008	62.97
295	Liveborn infants according to place of birth (Z38) การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	รวม	506,427	772.50	531,067	811.95
		ชาย	261,130	813.62	274,472	856.55
		หญิง	245,297	733.06	256,595	769.11
296	Postpartum care and examination (Z39) การดูแลและการตรวจหลังคลอด	รวม	1,879	2.87	1,938	5.81
		ชาย	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1,879	5.62	1,938	5.81

ตารางที่ 36 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)

จำแนกตามเพศ และสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2561 – 2562

(ตารางการป่วยตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 298 กลุ่มโรค) (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

รหัส กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	2562		2561	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care (Z40-Z54, Z40-Z54) บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการ หรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	รวม	437,022	666.63	401,838	614.37
		ชาย	223,718	697.05	204,435	637.99
		หญิง	213,304	637.45	197,403	591.69
298	Persons encountering health services for other reasons (Z31-Z33, Z37, Z55-Z99) บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	รวม	490,892	748.80	494,589	756.18
		ชาย	97,411	303.51	85,063	265.46
		หญิง	393,481	1,175.90	409,526	1,227.50

ผู้ป่วยใน

จากสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ
จำแนกตามเพศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2562

ตารางที่ 37 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ
(ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : ราย

รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
	รวมทุกกลุ่ม	รวม	726,013	1,107.45	148,360	1,271.16	168,574	994.85	105,939	1,125.79	257,811	1,173.58	45,329	814.81
		ชาย	433,390	1,350.34	88,260	1,544.06	98,997	1,203.96	62,603	1,351.74	157,410	1,442.82	26,120	998.82
		หญิง	292,623	874.49	60,100	1,009.22	69,577	797.72	43,336	906.82	100,401	907.94	19,209	651.58
V01-V09	Pedestrian injured in transport accident คนเดินเท้าที่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	รวม	3,275	5.00	389	3.33	862	5.09	768	8.16	837	3.81	419	7.53
		ชาย	2,018	6.29	237	4.15	539	6.56	474	10.23	545	5.00	223	8.53
		หญิง	1,257	3.76	152	2.55	323	3.70	294	6.15	292	2.64	196	6.65
V10-V19	Pedal cyclist injured in transport accident ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	รวม	7,330	11.18	1,784	15.29	1,362	8.04	868	9.22	2,961	13.48	355	6.38
		ชาย	5,088	15.85	1,192	20.85	934	11.36	617	13.32	2,085	19.11	260	9.94
		หญิง	2,242	6.70	592	9.94	428	4.91	251	5.25	876	7.92	95	3.22
V20-V29	Motorcycle rider injured in transport accident คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	รวม	79,411	121.13	11,775	100.89	23,026	135.89	16,004	170.07	21,761	99.06	6,845	123.04
		ชาย	56,599	176.35	8,375	146.52	16,674	202.78	10,013	216.20	16,109	147.66	5,428	207.57
		หญิง	22,812	68.17	3,400	57.09	6,352	72.83	5,991	125.36	5,652	51.11	1,417	48.07
V30-V39	Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in transport accident ผู้ใช้สามล้อรถบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	รวม	920	1.40	243	2.08	204	1.20	175	1.86	257	1.17	41	0.74
		ชาย	592	1.84	163	2.85	121	1.47	114	2.46	167	1.53	27	1.03
		หญิง	328	0.98	80	1.34	83	0.95	61	1.28	90	0.81	14	0.47
V40-V49	Car occupant injured in transport accident ผู้โดยสารรถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	รวม	3,435	5.24	576	4.94	1,039	6.13	831	8.83	790	3.60	199	3.58
		ชาย	2,201	6.86	367	6.42	653	7.94	537	11.60	513	4.70	131	5.01
		หญิง	1,234	3.69	209	3.51	386	4.43	294	6.15	277	2.50	68	2.31

ตารางที่ 37 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ
(ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
V50-V59	Occupant of pick-up truck or van injured in transport accident ผู้โดยสารรถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	รวม	2,417	3.69	411	3.52	741	4.37	423	4.50	792	3.61	50	0.90
		ชาย	1,668	5.20	285	4.99	514	6.25	293	6.33	546	5.00	30	1.15
		หญิง	749	2.24	126	2.12	227	2.60	130	2.72	246	2.22	20	0.68
V60-V69	Occupant of heavy transport vehicle injured in transport accident ผู้โดยสารรถบรรทุกขนาดใหญ่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	รวม	356	0.54	62	0.53	119	0.70	48	0.51	104	0.47	23	0.41
		ชาย	291	0.91	47	0.82	98	1.19	38	0.82	86	0.79	22	0.84
		หญิง	65	0.19	15	0.25	21	0.24	10	0.21	18	0.16	1	0.03
V70-V79	Bus occupant injured in transport accident ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	รวม	68	0.10	7	0.06	20	0.12	5	0.05	22	0.10	14	0.25
		ชาย	34	0.11	2	0.03	14	0.17	3	0.06	9	0.08	6	0.23
		หญิง	34	0.10	5	0.08	6	0.07	2	0.04	13	0.12	8	0.27
V80-V89	Other land transport accidents อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกอื่น	รวม	1,484	2.26	501	4.29	172	1.02	28	0.30	767	3.49	16	0.29
		ชาย	1,240	3.86	417	7.30	140	1.70	24	0.52	647	5.93	12	0.46
		หญิง	244	0.73	84	1.41	32	0.37	4	0.08	120	1.09	4	0.14
V90-V94	Water transport accidents อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ	รวม	97	0.15	2	0.02	34	0.20	46	0.49	5	0.02	10	0.18
		ชาย	76	0.24	1	0.02	26	0.32	38	0.82	3	0.03	8	0.31
		หญิง	21	0.06	1	0.02	8	0.09	8	0.17	2	0.02	2	0.07
V95-V97	Air and space transport accidents อุบัติเหตุจากการขนส่งทางอากาศและอวกาศ	รวม	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		ชาย	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		หญิง	1	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00

ตารางที่ 37 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ
(ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
V98-V99	Other and unspecified transport accidents อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด	รวม	34	0.05	8	0.07	7	0.04	2	0.02	5	0.02	12	0.22
		ชาย	30	0.09	7	0.12	7	0.09	1	0.02	5	0.05	10	0.38
		หญิง	4	0.01	1	0.02	0	0.00	1	0.02	0	0.00	2	0.07
W00-W19	Falls การพลัดตกหกล้ม	รวม	138,345	211.03	30,014	257.16	31,885	188.17	18,351	195.01	50,014	227.67	8,081	145.26
		ชาย	75,923	236.56	16,689	291.97	16,675	202.79	9,838	212.42	28,708	263.14	4,013	153.46
		หญิง	62,422	186.55	13,325	223.76	15,210	174.39	8,513	178.14	21,306	192.67	4,068	137.99
W20-W49	Exposure to inanimate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	รวม	84,824	129.39	18,958	162.43	17,907	105.68	12,241	130.08	33,215	151.20	2,503	44.99
		ชาย	65,408	203.80	14,777	258.52	13,550	164.79	9,447	203.98	25,704	235.60	1,930	73.80
		หญิง	19,416	58.02	4,181	70.21	4,357	49.95	2,794	58.47	7,511	67.92	573	19.44
W50-W64	Exposure to animate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	รวม	19,495	29.74	3,352	28.72	4,877	28.78	3,579	38.03	7,213	32.83	474	8.52
		ชาย	11,534	35.94	1,951	34.13	2,708	32.93	2,198	47.46	4,402	40.35	275	10.52
		หญิง	7,961	23.79	1,401	23.53	2,169	24.87	1,381	28.90	2,811	25.42	199	6.75
W65-W74	Accidental drowning and submersion อุบัติเหตุจากการตกน้ำรวมถึงการจมน้ำ	รวม	582	0.89	66	0.57	199	1.17	109	1.16	175	0.80	33	0.59
		ชาย	396	1.23	50	0.87	137	1.67	61	1.32	122	1.12	26	0.99
		หญิง	186	0.56	16	0.27	62	0.71	48	1.00	53	0.48	7	0.24
W75-W84	Other accidental threats to breathing อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ	รวม	843	1.29	159	1.36	225	1.33	115	1.22	238	1.08	106	1.91
		ชาย	509	1.59	104	1.82	133	1.62	65	1.40	146	1.34	61	2.33
		หญิง	334	1.00	55	0.92	92	1.05	50	1.05	92	0.83	45	1.53

ตารางที่ 37 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ (ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
W85-W99	Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิอากาศ และความกดอากาศที่ผิดปกติ	รวม	5,040	7.69	632	5.42	1,236	7.29	799	8.49	2,215	10.08	158	2.84
		ชาย	3,418	10.65	485	8.48	858	10.43	531	11.47	1,416	12.98	128	4.89
		หญิง	1,622	4.85	147	2.47	378	4.33	268	5.61	799	7.23	30	1.02
X00-X09	Exposure to smoke, fire and flames การถูกควัน ไฟ และเปลวไฟ	รวม	1,289	1.97	264	2.26	256	1.51	159	1.69	562	2.56	48	0.86
		ชาย	901	2.81	178	3.11	170	2.07	115	2.48	406	3.72	32	1.22
		หญิง	388	1.16	86	1.44	86	0.99	44	0.92	156	1.41	16	0.54
X10-X19	Contact with heat and hot substances การถูกความร้อนและสารร้อน	รวม	5,198	7.93	1,109	9.50	1,132	6.68	766	8.14	1,963	8.94	228	4.10
		ชาย	2,930	9.13	620	10.85	622	7.56	432	9.33	1,130	10.36	126	4.82
		หญิง	2,268	6.78	489	8.21	510	5.85	334	6.99	833	7.53	102	3.46
X20-X29	Contact with venomous animals and plants สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	รวม	33,428	50.99	5,360	45.93	8,530	50.34	9,041	96.08	10,126	46.09	371	6.67
		ชาย	20,169	62.84	3,293	57.61	4,958	60.30	5,586	120.61	6,120	56.10	212	8.11
		หญิง	13,259	39.62	2,067	34.71	3,572	40.95	3,455	72.30	4,006	36.23	159	5.39
X30-X39	Exposure to forces of nature ภัยอันตรายจากพลังตามธรรมชาติ	รวม	724	1.10	164	1.41	200	1.18	88	0.94	235	1.07	37	0.67
		ชาย	582	1.81	137	2.40	172	2.09	56	1.21	190	1.74	27	1.03
		หญิง	142	0.42	27	0.45	28	0.32	32	0.67	45	0.41	10	0.34
X40-X49	Accidental poisoning by and exposure to noxious substances การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษ	รวม	5,886	8.98	1,241	10.63	1,622	9.57	927	9.85	1,830	8.33	266	4.78
		ชาย	3,282	10.23	760	13.30	882	10.73	501	10.82	1,030	9.44	109	4.17
		หญิง	2,604	7.78	481	8.08	740	8.48	426	8.91	800	7.23	157	5.33

ตารางที่ 37 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ
(ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
X50-X57	Overexertion, travel and privation การออกกำลังกายมากเกินไป การเดินทาง และการขาดแคลน	รวม	1,757	2.68	330	2.83	470	2.77	193	2.05	614	2.79	150	2.70
		ชาย	1,104	3.44	213	3.73	282	3.43	117	2.53	398	3.65	94	3.59
		หญิง	653	1.95	117	1.96	188	2.16	76	1.59	216	1.95	56	1.90
X58-X59	Accidental exposure to other and unspecified factors ภัยอันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดโดยบังเอิญ	รวม	2,399	3.66	440	3.77	679	4.01	171	1.82	983	4.47	126	2.26
		ชาย	1,428	4.45	254	4.44	381	4.63	112	2.42	616	5.65	65	2.49
		หญิง	971	2.90	186	3.12	298	3.42	59	1.23	367	3.32	61	2.07
X60-X84	Intentional self-harm การทำร้ายตัวเอง	รวม	19,490	29.73	4,546	38.95	6,043	35.66	2,366	25.14	5,436	24.75	1,099	19.76
		ชาย	8,320	25.92	2,136	37.37	2,390	29.07	940	20.30	2,437	22.34	417	15.95
		หญิง	11,170	33.38	2,410	40.47	3,653	41.88	1,426	29.84	2,999	27.12	682	23.13
X85-Y09	Assault การถูกทำร้าย	รวม	25,604	39.06	3,868	33.14	5,735	33.85	3,558	37.81	11,135	50.69	1,308	23.51
		ชาย	19,200	59.82	2,769	48.44	4,245	51.63	2,574	55.58	8,562	78.48	1,050	40.15
		หญิง	6,404	19.14	1,099	18.45	1,490	17.08	984	20.59	2,573	23.27	258	8.75
Y10-Y34	Event of undetermined intent เหตุการณ์ที่ไม่อาจจะระบุเจตนา	รวม	9,289	14.17	2,070	17.74	2,084	12.30	1,140	12.11	3,362	15.30	633	11.38
		ชาย	5,049	15.73	1,087	19.02	1,157	14.07	624	13.47	1,866	17.10	315	12.05
		หญิง	4,240	12.67	983	16.51	927	10.63	516	10.80	1,496	13.53	318	10.79
Y35-Y36	Legal intervention and operations of war ปฏิบัติการหรือการแทรกแซงทางกฎหมายและการทำสงคราม	รวม	12	0.02	1	0.01	1	0.01	5	0.05	2	0.01	3	0.05
		ชาย	9	0.03	1	0.02	1	0.01	3	0.06	1	0.01	3	0.11
		หญิง	3	0.01	0	0.00	0	0.00	2	0.04	1	0.01	0	0.00

ตารางที่ 37 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ (ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย

รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Y40-Y59	Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use ยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	รวม	74,625	113.83	17,493	149.88	15,490	91.42	7,044	74.86	28,776	130.99	5,822	104.65
		ชาย	33,434	104.17	8,191	143.30	6,624	80.56	3,089	66.70	12,925	118.47	2,605	99.61
		หญิง	41,191	123.10	9,302	156.20	8,866	101.65	3,955	82.76	15,851	143.34	3,217	109.12
Y60-Y69	Misadventures to patients during surgical and medical care ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะให้การรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรม	รวม	12,228	18.65	1,953	16.73	2,623	15.48	1,422	15.11	2,723	12.40	3,507	63.04
		ชาย	5,985	18.65	1,020	17.84	1,258	15.30	719	15.52	1,289	11.82	1,699	64.97
		หญิง	6,243	18.66	933	15.67	1,365	15.65	703	14.71	1,434	12.97	1,808	61.33
Y70-Y82	Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use ความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์	รวม	11,385	17.37	4,204	36.02	2,514	14.84	418	4.44	2,661	12.11	1,588	28.55
		ชาย	6,299	19.63	2,365	41.37	1,401	17.04	236	5.10	1,470	13.47	827	31.62
		หญิง	5,086	15.20	1,839	30.88	1,113	12.76	182	3.81	1,191	10.77	761	25.81
Y83-Y84	Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	รวม	30,085	45.89	6,379	54.66	6,171	36.42	3,531	37.52	9,893	45.03	4,111	73.90
		ชาย	16,954	52.82	3,621	63.35	3,521	42.82	1,947	42.04	5,658	51.86	2,207	84.40
		หญิง	13,131	39.24	2,758	46.31	2,650	30.38	1,584	33.15	4,235	38.30	1,904	64.58
Y85-Y89	Sequelae of external causes of morbidity and mortality ผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกการป่วยและตาย	รวม	3,891	5.94	841	7.21	1,039	6.13	560	5.95	1,136	5.17	315	5.66
		ชาย	2,649	8.25	573	10.02	699	8.50	386	8.33	784	7.19	207	7.92
		หญิง	1,242	3.71	268	4.50	340	3.90	174	3.64	352	3.18	108	3.66

ตารางที่ 37 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และกลุ่มสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ
(ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10: 35 กลุ่มสาเหตุ) ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : ราย														
รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (โรค/กลุ่มโรค)	เพศ	ทั้งประเทศ		เหนือ		กลาง(ไม่รวม กทม.)		ตะวันออกเฉียงเหนือ		ใต้		กรุงเทพฯ	
			จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
Y90-Y98	Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่มีได้ระบุไว้ที่อื่น	รวม	32,673	49.84	7,129	61.08	7,205	42.52	4,483	47.64	11,667	53.11	2,189	39.35
		ชาย	18,963	59.08	4,087	71.50	4,099	49.85	2,636	56.92	6,910	63.34	1,231	47.07
		หญิง	13,710	40.97	3,042	51.08	3,106	35.61	1,847	38.65	4,757	43.02	958	32.50

ส่วนที่ 2 รายงานเพิ่มเติม


รายงานการป่วยฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะทำงานได้เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลการป่วย ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จำแนกเป็นรายเขตสุขภาพนำเสนอเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2561 และเพิ่มการนำเสนอข้อมูลรายงาน ในปีปัจจุบัน เป็นรายจังหวัด เรียงลำดับตามกลุ่มโรคที่พบมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ที่มีรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนี้

ข้อมูลผู้ป่วยของผู้ป่วยนอก

จากข้อมูลผู้ป่วยนอกที่นำเสนอไว้ในส่วนที่ 1 ซึ่งวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบตารางสถิติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้นำชุดข้อมูลผู้ป่วยนอกรายภาค มานำเสนอด้วยรูปแบบกราฟเส้น เพื่อแสดงอัตราการเข้ารับการรักษาในประเภทผู้ป่วยนอก แสดงดังภาพที่ 1


สถานการณ์การป่วยของผู้ป่วยนอก

ภาพที่ 1 อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาค ปี พ.ศ.2558 – 2562




จากภาพที่ 1 ภาพแสดงอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รายภาคที่นำเสนอเปรียบเทียบทั้ง 4 ภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2562 เทียบกับอัตราผู้ป่วยนอกรวมทั้งประเทศ พบว่า อัตราผู้ป่วยนอกปี พ.ศ. 2562 สูงกว่าปีอื่น ๆ ยกเว้นในภาคกลาง ที่พบอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2559 สูงที่สุด เมื่อแยกอัตราผู้ป่วยนอก มาวิเคราะห์และนำเสนอ เป็นรายภาค แสดงได้ตามภาพที่ 2 พบว่า ในภาคกลาง พบอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุดในปี พ.ศ. 2559 รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2562 และ 2560 ตามลำดับ ดังนี้

ภาพที่ 2 อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายภาค



ภาพที่ 3 อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562



จากภาพที่ 3 แสดงข้อมูลอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562 พบว่า เขตสุขภาพที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ 1 อัตรา 5,028.04 รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 3 อัตรา 4,855.57 เขตสุขภาพที่ 5 อัตรา 4,528.27 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค และจัดอันดับ 10 อันดับ ของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1 - 12

ตารางที่ 1 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
 จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 1 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	908.65	1	762.32
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	748.69	2	601.01
3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	3	595.43	3	491.57
4	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	4	508.27	4	434.06
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	453.74	5	396.35
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	344.02	6	120.48
7	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	202.30	7	115.02
8	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	170.77	8	109.29
9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	132.99	9	108.57
10	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	10	127.68	10	101.15

จากตารางที่ 1 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 1 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบในปี พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 อันดับแรก หากพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 2 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	852.09	1	742.63
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม	2	777.03	2	662.95
3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	3	477.85	3	415.50
4	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	4	448.94	4	385.94
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	350.97	5	326.92
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	234.66	7	104.90
7	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	141.23	9	88.56
8	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	133.40	8	92.80
9	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	9	121.84	6	105.46
10	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	10	94.56	10	83.92

จากตารางที่ 2 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 2 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ ในปี พ.ศ.2562 คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 อันดับ หากพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
 จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	974.15	1	919.07
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม	2	880.43	2	812.47
3	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	597.71	3	566.86
4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	4	558.19	4	505.03
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	417.00	5	415.09
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	232.39	8	98.07
7	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	155.84	7	113.20
8	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	8	122.94	6	114.36
9	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	9	114.92	12	85.43
10	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	10	102.30	9	95.63

จากตารางที่ 3 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 3 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ ในปี พ.ศ. 2562 คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 อันดับ หากพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยนอก ใน ปีพ.ศ. 2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 4 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	663.81	1	663.72
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	657.51	2	659.18
3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	3	400.08	3	392.37
4	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	4	379.96	4	386.65
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	361.83	5	377.73
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	177.68	7	94.25
7	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	120.90	10	81.00
8	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	117.86	9	91.09
9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	101.68	6	102.38
10	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	10	92.81	8	91.56

จากตารางที่ 4 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 4 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อ ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 อันดับ หากพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 5 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 5 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	804.47	1	751.23
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	727.82	2	675.45
3	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	545.46	3	503.87
4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	4	511.44	4	450.42
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	449.45	5	424.58
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	221.52	8	99.52
7	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	7	138.45	6	128.22
8	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	137.41	9	90.98
9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	127.96	7	119.52
10	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	10	113.80	10	75.62

จากตารางที่ 5 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 5 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 อันดับ หากพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 6 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	591.25	1	520.62
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	555.26	2	489.54
3	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	399.87	3	356.61
4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	4	379.39	5	323.73
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	376.53	4	341.36
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	173.13	8	83.20
7	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	7	163.43	6	105.73
8	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	8	116.26	10	75.76
9	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	9	97.63	7	83.20
10	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	10	92.38	9	81.53

จากตารางที่ 6 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 6 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 อันดับ หากพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 7 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
 จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 7 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	1	617.28	1	543.73
2	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรกระบบไหลเวียนเลือด	2	607.44	2	524.85
3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	3	502.77	3	415.17
4	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	4	477.18	4	407.35
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรกระบบหายใจ	5	406.66	5	372.34
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	271.31	10	84.82
7	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	7	149.01	8	93.34
8	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	8	142.99	7	93.65
9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	113.30	6	97.30
10	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	10	111.82	9	88.27

จากตารางที่ 7 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 7 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ คือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม รองลงมาคือ โรกระบบไหลเวียนเลือด และโรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบ ทั้ง 3 อันดับ ในปี พ.ศ. 2561 หากพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยนอก ในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 8 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
 จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 8 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	1	580.60	1	555.40
2	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	2	574.70	2	543.87
3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	3	497.27	4	429.84
4	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	4	484.71	3	448.75
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	367.70	5	357.70
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	264.45	8	87.44
7	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	7	115.74	9	82.65
8	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	8	110.40	10	82.54
9	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	9	94.06	7	91.58
10	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	10	80.67	11	74.35

จากตารางที่ 8 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 8 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ คือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม ตามลำดับ สอดคล้องกับโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 เพียงแต่ลำดับในการจัดเรียงแตกต่างกัน คือ ในปี พ.ศ. 2561 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ

ตารางที่ 9 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
 จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 9 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	1	573.94	2	379.19
2	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรกระบบไหลเวียนเลือด	2	508.67	1	424.69
3	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	3	483.99	5	326.51
4	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	4	444.77	3	367.15
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรกระบบหายใจ	5	426.71	4	338.07
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	184.77	10	71.56
7	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	7	137.82	9	71.95
8	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	8	125.77	7	72.94
9	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	9	99.26	8	72.61
10	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	10	93.64	6	83.75

จากตารางที่ 9 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 9 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ คือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม รองลงมาคือ โรกระบบไหลเวียนเลือด และโรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม ตามลำดับ ส่วนโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรกระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ

ตารางที่ 10 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 10 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	583.58	1	535.93
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	578.87	2	529.74
3	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	452.91	4	409.99
4	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	4	446.07	5	392.93
5	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	5	439.60	3	431.41
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	240.32	10	86.21
7	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	174.81	7	104.06
8	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	148.74	8	100.88
9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	100.39	9	94.02
10	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	10	87.15	12	78.56

จากตารางที่ 10 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 10 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับ ในปี พ.ศ. 2562 คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ต่างจากโรคที่พบในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบหายใจ ตามลำดับ

ตารางที่ 11 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
 จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 11 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	673.15	1	603.68
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	659.13	2	582.50
3	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	403.30	4	361.21
4	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	4	400.89	3	372.97
5	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	5	373.09	5	321.84
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	202.25	7	104.20
7	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	7	160.56	6	114.15
8	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	8	123.85	10	81.60
9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	101.29	8	95.40
10	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	10	99.87	9	93.53

จากตารางที่ 11 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 11 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบหายใจ ตามลำดับ



ตารางที่ 12 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี พ.ศ. 2562
จำแนกตามสาเหตุการป่วย เขตสุขภาพที่ 12 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diseases of the circulatory system (I00-I99) โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	591.59	1	488.81
2	Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90) โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	2	487.70	4	394.92
3	Diseases of the digestive system (K00-K93) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	3	479.87	2	416.25
4	Diseases of the respiratory system (J00-J99) โรคระบบหายใจ	4	467.30	3	405.70
5	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	5	352.71	5	284.29
6	Diseases of the genitourinary system (N00-N99) โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	6	179.57	9	80.63
7	Mental and behavioral disorders (F00-F99) ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	7	168.51	8	93.92
8	Certain infectious and parasitic diseases (A00-A99, B00-B99) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	8	144.42	7	95.58
9	Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99) โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	123.71	6	108.92
10	Diseases of the eye and adnexa (H00-H59) โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	10	78.18	10	63.75

จากตารางที่ 12 10 อันดับแรกอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน รวมทุกการวินิจฉัยโรค เขตสุขภาพที่ 12 เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม และโรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก ตามลำดับ แตกต่างจากโรคที่พบ ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รองลงมาคือ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และโรคระบบหายใจ ตามลำดับ

จากจำนวนและอัตราผู้ป่วยนอก (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ต่อประชากร 1,000 คน ที่นำเสนอเป็นรายเขตสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตราผู้ป่วยนอกที่พบ โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด และนำเสนอเป็น 10 อันดับของจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน สูงที่สุด และต่ำที่สุด ดังภาพที่ 4 และแสดงเป็นตารางจำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกรายจังหวัดตามเขตสุขภาพ ในตารางที่ 13 ดังนี้

ภาพที่ 4 10 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน สูงและต่ำที่สุด ปี พ.ศ. 2562



ตารางที่ 13 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกรายเขตสุขภาพและ
รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : รายโรค

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา
1	ลำพูน	2,264,643	5,622.75
	เชียงใหม่	8,531,313	5,239.84
	น่าน	2,483,404	5,208.02
	แพร่	2,213,488	4,998.70
	พะเยา	2,325,526	4,933.20
	ลำปาง	3,609,582	4,891.53
	เชียงราย	5,607,295	4,779.21
	แม่ฮ่องสอน	987,991	4,112.86
2	พิษณุโลก	4,477,494	5,179.36
	อุตรดิตถ์	2,227,447	4,915.07
	สุโขทัย	2,692,290	4,521.10
	ตาก	2,175,602	4,012.98
	เพชรบูรณ์	3,371,789	3,400.53
3	อุทัยธานี	1,947,712	5,928.57
	ชัยนาท	1,894,490	5,792.06
	พิจิตร	2,647,569	4,928.27
	นครสวรรค์	4,886,658	4,610.37
	กำแพงเพชร	3,083,538	4,251.67
4	สิงห์บุรี	1,144,198	5,484.68
	อ่างทอง	1,363,349	4,871.92
	นครนายก	1,178,849	4,549.19
	สระบุรี	2,756,326	4,313.07
	พระนครศรีอยุธยา	3,196,222	3,913.54
	ลพบุรี	2,803,997	3,710.16
	นนทบุรี	4,109,252	3,297.93
	ปทุมธานี	2,896,222	2,527.95
5	สมุทรสงคราม	970,020	5,058.91
	เพชรบุรี	2,422,220	5,039.96
	สุพรรณบุรี	3,956,595	4,682.29
	นครปฐม	4,040,174	4,446.22
	กาญจนบุรี	3,623,940	4,421.03
	สมุทรสาคร	2,412,177	4,412.61
	ราชบุรี	3,740,103	4,412.59
	ประจวบคีรีขันธ์	2,288,590	4,242.67

ตารางที่ 13 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกรายเขตสุขภาพ
และรายจังหวัด ปี พ.ศ.2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา
6	ตราด	919,104	4,171.22
	ชลบุรี	6,239,622	4,086.98
	ปราจีนบุรี	2,010,859	4,084.89
	จันทบุรี	2,161,553	4,049.32
	ฉะเชิงเทรา	2,823,022	3,955.18
	ระยอง	2,487,998	3,446.32
	สระแก้ว	1,905,162	3,392.82
	สมุทรปราการ	3,215,594	2,441.71
7	ขอนแก่น	7,741,607	4,298.16
	ร้อยเอ็ด	5,298,395	4,059.76
	กาฬสินธุ์	3,931,891	3,997.65
	มหาสารคาม	3,360,529	3,492.51
8	เลย	2,756,371	4,314.39
	หนองคาย	2,051,034	3,963.64
	สกลนคร	4,517,336	3,921.82
	อุดรธานี	5,838,858	3,696.74
	บึงกาฬ	1,455,391	3,437.99
	นครพนม	2,432,712	3,391.36
	หนองบัวลำภู	1,662,325	3,247.18
9	นครราชสีมา	10,019,504	3,790.67
	บุรีรัมย์	5,877,663	3,688.68
	ชัยภูมิ	4,005,910	3,523.19
	สุรินทร์	4,832,961	3,462.01
10	อุบลราชธานี	7,606,008	4,070.07
	อำนาจเจริญ	1,499,456	3,969.57
	ศรีสะเกษ	5,628,325	3,824.15
	ยโสธร	2,001,972	3,723.28
	มุกดาหาร	1,205,362	3,442.97

ตารางที่ 13 จำนวนและอัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) จำแนกรายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด ปี พ.ศ.2562 (ต่อ)

หน่วยนับ : รายโรค


เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา
11	สุราษฎร์ธานี	4,582,445	4,329.44
	พังงา	1,093,659	4,135.86
	นครศรีธรรมราช	6,211,519	3,986.45
	ระนอง	684,856	3,851.70
	ภูเก็ต	1,516,484	3,771.31
	ชุมพร	1,847,135	3,644.64
	กระบี่	1,420,358	3,001.68
12	พัทลุง	2,506,208	4,777.24
	ตรัง	2,633,606	4,103.95
	สงขลา	5,564,108	3,907.01
	ยะลา	1,875,312	3,519.65
	สตูล	1,121,091	3,480.91
	นราธิวาส	2,667,654	3,318.16
	ปัตตานี	2,275,700	3,160.98

จากภาพที่ 4 และตารางที่ 13 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุดคือ จังหวัดอุทัยธานี รองลงมาคือ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลำพูน ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยนอกต่ำที่สุดคือ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดกระบี่ ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเขตสุขภาพว่ามีจังหวัดใดที่มีอัตราผู้ป่วยนอก สูงที่สุด พบว่า เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน อัตรา 5,622.75 เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อัตรา 5,179.36 เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี อัตรา 5,928.57 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี อัตรา 5,484.68 เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม อัตรา 5,058.91 เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดตราด อัตรา 4,171.22 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น อัตรา 4,298.16 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย อัตรา 4,314.39 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา อัตรา 3,790.67 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา 4,070.07 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตรา 4,329.44 และ เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุง อัตรา 4,777.24

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

สถานการณ์การป่วยของผู้ป่วยนอกจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ในปี พ.ศ.2562 เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราผู้ป่วยนอกสูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยนอกสูงกว่าเพศชาย ยกเว้น กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี ที่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยนอกสูงกว่าเพศหญิง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 อัตราผู้ป่วยนอกต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี พ.ศ.2562




ข้อมูลการป่วยของผู้ป่วยใน

สถานการณ์การป่วย พ.ศ.2562 ของผู้ป่วยใน จากที่มีการวิเคราะห์และได้นำเสนอสถิติการป่วยของผู้ป่วยใน รวมทุกการวินิจฉัยโรคข้างต้นแล้วในรายงานฉบับนี้ได้เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลผู้ป่วยใน จากการวินิจฉัยโรคหลัก โดยจำแนกและจัดลำดับโรคตาม กลุ่มอายุ เพศ ภูมิภาคต่าง ๆ เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต และจังหวัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถานการณ์การป่วยผู้ป่วยใน

ภาพที่ 6 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2558 - 2562



จากภาพที่ 5 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากการวินิจฉัยโรคหลัก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอัตราผู้ป่วยใน เมื่อเทียบกับอัตราการป่วยย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2558 - 2561 โดยรวม ซึ่งเมื่อจำแนกตามเพศแล้ว พบว่า เพศหญิงมีอัตราการป่วยสูงกว่า เพศชาย และเมื่อจำแนกตามกลุ่มโรคและ จัดอันดับ 10 อันดับ ปรากฏดังตารางที่ 14

ตารางที่ 14 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก)
จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

ลำดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ทั้งประเทศ		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	351,733	536.53	161,543	503.33	190,190	568.37
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	351,297	535.86	190,585	593.82	160,712	480.28
3	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	191,292	291.79	83,421	259.92	107,871	322.37
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	176,805	269.70	78,560	244.77	98,245	293.60
5	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	171,009	260.86	89,104	277.63	81,905	244.77
6	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	161,276	246.01	69,928	217.88	91,348	272.99
7	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	159,190	242.83	119,679	372.89	39,511	118.08
8	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	145,498	221.94	79,755	248.50	65,743	196.47
9	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	124,364	189.70	50,622	157.73	73,742	220.37
10	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด	120,588	183.94	0	0.00	120,588	360.37

หมายเหตุ: การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48) พบเฉพาะในเพศหญิง
อัตราป่วยเพศหญิงใช้จำนวนประชากรรวมเฉพาะเพศหญิงเป็นตัวหาร

จากตารางที่ 14 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน จากการวินิจฉัยโรคหลัก จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 ภาพรวมทั้งประเทศ พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ ปอดบวม และต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 - 2561 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ.2562 (การวินิจฉัยโรคหลัก) เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2558 – 2561


อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	2562		2561		2560		2559		2558	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	536.53	2	553.87	2	459.74	2	540.76	2	480.26
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	535.86	1	597.04	1	560.69	1	549.55	1	485.10
3	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	3	291.79	3	280.75	3	270.69	3	318.61	3	359.65
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	4	269.70	5	249.11	5	232.74	6	222.34	9	196.55
5	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	5	260.86	9	188.42					4	261.26
6	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	6	246.01	7	232.55	7	221.51	7	214.60	8	198.76
7	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	7	242.83	6	243.95	4	237.33	5	231.67	6	219.14
8	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	8	221.94	4	254.88	6	228.20	4	238.55	5	225.08
9	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	9	189.70								
10	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ในระยะคลอด	10	183.94	8	188.93	8	193.57	9	188.99	10	187.70

จากตารางที่ 15 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ. 2562 จากการวินิจฉัยโรคหลัก เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2558 – 2561 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเจ็บป่วยย้อนหลัง 5 ปี ในปี พ.ศ. 2558 – 2562 พบว่าในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ จากเดิมที่ปรากฏข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2561 กลุ่มโรคดังกล่าวอยู่ในอันดับ 2 รองลงมาคือ ปอดบวม และ ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ


สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน รายภาค

จากสถานการณ์การป่วยในปี พ.ศ. 2562 เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดอันดับรายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดคือ ภาคใต้ อัตรา 12,488.57 รองลงมาคือ ภาคเหนือ อัตรา 12,026.50 ภาคกลาง (ไม่รวม กรุงเทพมหานคร) อัตรา 9,713.73 และ กรุงเทพมหานคร อัตรา 9,261.05 ตามลำดับ (ภาพที่ 2)


ภาพที่ 7 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ภาพรวมทั้งประเทศ รายภาค กรุงเทพมหานคร และจำแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2562



ภาพที่ 8 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) เพศชาย จำแนกรายภาค กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2562



ภาพที่ 9 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) เพศหญิง จำแนกรายภาค กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2562



อัตราผู้ป่วยใน รายภาค และกรุงเทพมหานคร เมื่อนำมาวิเคราะห์โดยจำแนกรายเพศ ดังภาพที่ 8 และ 9 พบว่า อัตราผู้ป่วยในเพศชาย สูงที่สุดในภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ แต่เมื่อพิจารณาจากเพศหญิง พบว่า อัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดในภาคใต้ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลำดับ


เมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก ภาพรวมทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 จากการวินิจฉัยโรคหลัก พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ โดยเรียงลำดับจากภาคที่พบมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำดับ กลุ่มโรคที่พบรองลงมาคือ ปอดบวม มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดในภาคใต้ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ตามลำดับ ในขณะที่อัตราผู้ป่วยในที่พบเป็นอันดับ 3 คือ ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ พบมากที่สุด ในกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 16

ตารางที่ 16 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ทั้งประเทศ รายภาค และกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ทั้งประเทศ		ภาคเหนือ		ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ภาคใต้		กรุงเทพมหานคร	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	351,733	536.53	60,956	522.28	72,625	428.60	148,460	675.80	59,757	635.02	9,935	178.59
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	351,297	535.86	62,760	537.73	75,242	444.05	135,659	617.53	62,304	662.09	15,332	275.60
3	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	191,292	291.79	38,605	330.77	55,723	328.85	51,710	235.39	23,570	250.47	21,684	389.78
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	176,805	269.70	35,626	305.25	32,549	192.09	86,203	392.40	15,742	167.29	6,685	120.17
5	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	171,009	260.86	19,593	167.87	35,902	211.88	65,563	298.45	44,618	474.15	5,333	95.86
6	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	161,276	246.01	44,340	379.91	35,734	210.89	60,713	276.37	15,193	161.45	5,296	95.20
7	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถูกลมโป่งพองและปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	159,190	242.83	42,933	367.85	32,298	190.61	44,273	201.53	35,142	373.45	4,544	81.68
8	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	145,498	221.94	29,846	255.72	28,926	170.71	53,351	242.86	28,747	305.49	4,628	83.19
9	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	124,364	189.70	22,161	189.88	26,357	155.55	54,547	248.30	15,872	168.67	5,427	97.55
10	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะคลอด	120,588	183.94	19,335	165.66	26,244	154.88	40,001	182.09	28,744	305.46	6,264	112.60

สถานการณ์การป่วยของผู้ป่วยใน รายเขตสุขภาพ

ภาพที่ 10 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกรายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562



หากพิจารณาอัตราผู้ป่วยใน จำแนกรายเขตสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2562 จากการวินิจฉัยโรคหลัก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวพบว่า เขตสุขภาพที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 12 อัตรา 12,898.18 รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 10 อัตรา 12,875.36 เขตสุขภาพที่ 1 อัตรา 12,727.91 เขตสุขภาพที่ 7 อัตรา 12,417.98 เขตสุขภาพที่ 11 อัตรา 12,030.24 ตามลำดับ (ภาพที่ 3) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มโรค 298 กลุ่มโรค และจัดอันดับ 10 อันดับของอัตราผู้ป่วยใน เปรียบเทียบข้อมูลใน ปี พ.ศ. 2561 – 2562 รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 17 – 29

ตารางที่ 17 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 1

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	1	557.38	1	625.60
2	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	2	502.73	4	471.72
3	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	3	495.34	3	484.50
4	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	4	486.56	2	492.36
5	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	5	331.83		
6	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	6	317.60	5	321.75
7	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	7	236.14	9	207.22
8	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	8	225.14	7	259.94
9	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	9	216.78	8	207.86
10	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	10	195.45		

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ ปอดบวม รองลงมาคือ โลหิตจางอื่น ๆ และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผู้ป่วยในของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคที่พบใน 10 อันดับแรก มีความใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่มโรคไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ และโรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มีอัตราต่ำเกินการจัดเรียงไว้ใน 10 อันดับ

ตารางที่ 18 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 2

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	528.89	2	521.31
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	476.40	1	579.63
3	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	3	366.10	3	344.09
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	4	323.02	4	337.59
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	5	284.43	7	251.29
6	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	6	261.46	6	265.53
7	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	7	252.26	5	285.92
8	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	8	211.29		
9	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	204.85	8	208.46
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	10	195.83		

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ ปอดบวม และต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ สอดคล้องกับกลุ่มโรคที่พบอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ.2561 คือ ปอดบวม รองลงมาคือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ

ตารางที่ 19 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ.2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 3

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	582.23	1	579.57
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	573.54	2	545.03
3	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	3	329.85	3	346.17
4	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	4	305.91	4	302.49
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	5	268.00	6	233.10
6	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	6	255.47	5	246.52
7	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	7	248.22		
8	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	8	223.27	10	200.16
9	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	218.80	9	215.29
10	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	10	218.47	8	218.57

จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 3 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ ปอดบวม และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน ตามลำดับ เช่นเดียวกับ 3 อันดับแรกของโรคที่พบในปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ พบว่า อัตราผู้ป่วยในของโรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะมีอัตราสูงขึ้นเนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคนี้ไม่พบว่ามีอัตราสูงจนมาอยู่ใน 10 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 มีอัตราผู้ป่วยในที่มีสาเหตุจากกลุ่มโรคนี้สูงเป็นอันดับที่ 7

ตารางที่ 20 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 4

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	1	429.09	1	495.24
2	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	2	359.85	2	440.60
3	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	3	338.17	3	303.94
4	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	4	228.49	4	225.20
5	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	5	196.14	7	178.64
6	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	6	191.65	6	198.80
7	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	7	176.46	8	175.18
8	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	8	173.04	5	213.36
9	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	9	168.68		
10	Cerebral infarction (I63) เนื้องอกสมองตาย	10	161.13		

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 4 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ ปอดบวม รองลงมาคือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และ ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ เช่นเดียวกับกับ 3 อันดับแรกของกลุ่มโรคที่พบในปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 21 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 5

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	533.42	1	582.73
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	497.16	2	551.93
3	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	3	422.60	3	423.79
4	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	4	239.91	4	281.61
5	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	5	237.36	5	239.44
6	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	6	234.54	6	238.47
7	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	7	231.15	7	228.08
8	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	8	207.30	9	187.42
9	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	9	199.96	10	187.09
10	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	10	191.47		

จากตารางที่ 21 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดเขตสุขภาพที่ 5 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ ปอดบวม และต้อกระจก และความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับโรคที่พบในปี พ.ศ. 2561 ที่มีการจัดเรียงอันดับโรคที่พบอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด คือ 3 กลุ่มโรคนี้เช่นเดียวกัน

ตารางที่ 22 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 6

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	1	406.19	1	468.13
2	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	2	386.41	2	464.23
3	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	3	245.02	3	238.05
4	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	4	230.66		
5	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	5	221.43	4	235.24
6	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	6	198.81	6	175.22
7	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	7	188.66	8	166.96
8	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	8	177.16	5	181.22
9	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	9	173.51	7	168.67
10	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	10	169.75		

จากตารางที่ 22 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 6 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 เหมือนกันกับกลุ่มโรคที่พบในปี พ.ศ. 2561 คือ ปอดบวม รองลงมาคือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ ในขณะที่เดียวกันก็พบว่าโรคที่ไม่อยู่ใน 10 อันดับโรคแรกที่พบสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 คือ กลุ่มโรคไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ แต่มีอัตราสูงเป็นลำดับที่ 4 ในปี พ.ศ. 2562

ตารางที่ 23 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 7

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	1	715.95	1	815.02
2	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	2	691.53	2	681.86
3	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	3	481.49	3	457.27
4	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	4	308.85		
5	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	5	287.85	4	277.39
6	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	6	281.02	5	275.43
7	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	7	214.29	9	208.14
8	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	8	213.60	7	222.63
9	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	9	207.03	6	242.51
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	10	206.49		

จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 7 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 เหมือนกับกลุ่มโรคในปี พ.ศ. 2561 คือ ปอดบวม รองลงมาคือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และไตวาย ตามลำดับ และพบโรคไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ มีอัตราผู้ป่วยในสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่ถูกจัดเรียงไว้ใน 10 อันดับแรก

ตารางที่ 24 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 8

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง ภาวะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	595.08	2	554.09
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	522.58	1	636.88
3	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	3	369.91	4	328.28
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	4	352.12	3	340.09
5	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	5	259.65	5	243.07
6	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	6	241.89	28	98.93
7	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	7	229.99	7	223.00
8	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	8	219.02	6	241.34
9	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	9	186.85	9	190.77
10	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	10	180.99	10	183.27

จากตารางที่ 24 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 8 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ อาการท้องร่วง ภาวะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ และโลหิตจางอื่น ๆ ตามลำดับ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปอดบวม รองลงมาคือ อาการท้องร่วง ภาวะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และไตวาย ตามลำดับ และพบอัตราผู้ป่วยในจากกลุ่มโรคไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ มีอัตราผู้ป่วยในสูงเป็นอันดับ 6 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2561 โรคนี้มีอัตราผู้ป่วยในต่ำกว่าโรคอื่น ๆ จนไม่ถูกจัดเรียงไว้ใน 10 อันดับแรก

ตารางที่ 25 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 9

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	660.85	1	706.61
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	586.28	2	659.56
3	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	3	350.15		
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	4	297.47	4	266.29
5	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	5	268.24	3	336.38
6	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	6	257.52	5	250.23
7	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	7	237.06	8	231.22
8	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	8	236.08	7	231.63
9	Cerebral infarction (I63) เนื้อสมองตาย	9	226.26	9	217.97
10	Influenza (J10-J11) ไข้หวัดใหญ่	10	214.73		

จากตารางที่ 25 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 9 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ ปอดบวม และไข้ไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ ตามลำดับ แต่ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ ปอดบวม และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน ตามลำดับ

ตารางที่ 26 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 10

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	777.63	2	739.56
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	669.73	1	780.28
3	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	3	482.67	3	444.32
4	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	4	279.09		
5	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	5	273.53	4	314.10
6	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified (T79-T88) ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อน ของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	6	258.09	5	239.44
7	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	7	250.97	8	226.22
8	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	8	234.73	6	238.28
9	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	9	229.41	7	234.85
10	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	10	210.48		

จากตารางที่ 26 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 10 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ รองลงมาคือ ปอดบวม และไตวาย ตามลำดับ สอดคล้องกับกลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2561 คือ ปอดบวม รองลงมาคือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และไตวาย ตามลำดับ

ตารางที่ 27 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 11

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	1	602.51	1	576.97
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	533.06	2	546.45
3	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	3	438.96	3	460.04
4	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	4	380.39	5	359.82
5	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	5	344.36	4	373.19
6	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	6	271.43	8	267.31
7	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	7	210.43	9	209.53
8	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	8	208.65	10	195.45
9	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	9	194.96		
10	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	10	192.32		

จากตารางที่ 27 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 11 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2561 เหมือนกันทั้ง 3 อันดับ คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อมีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด รองลงมาคือ ปอดบวม และไข้ไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ ตามลำดับ ปี พ.ศ. 2561 กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ (A09) อัตรา 576.97 รองลงมาคือ ปอดบวม (J12 – J18) อัตรา 546.45 ไข้ไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ (A90 – A94, A96 – A99) อัตรา 460.04 ตามลำดับ

ตารางที่ 28 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 12

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	1	777.40	1	782.05
2	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	2	664.08	2	686.10
3	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจาก ไวรัสอื่น ๆ	3	505.59	3	327.24
4	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดอุดกั้น แบบเรื้อรังอื่น	4	367.24	4	361.32
5	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	5	270.75	7	300.16
6	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	6	231.75	10	212.42
7	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	7	223.66	9	215.21
8	Infections of the skin and subcutaneous tissue (L00-L08) โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	8	216.35	8	219.41
9	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	9	202.14		
10	Cerebral infarction (I63) เนื้องอกสมองตาย	10	193.83		

จากตารางที่ 28 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 12 3 อันดับแรก ในปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ. 2561 เหมือนกันทั้ง 3 อันดับ คือ ปอดบวม มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด รองลงมาคือ อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ และไข้ไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ ตามลำดับ

ตารางที่ 29 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) ปี พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 จำแนกรายเขต เขตสุขภาพที่ 13

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	ปี 2562		ปี 2561	
		อันดับ	อัตรา	อันดับ	อัตรา
1	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	1	389.78	1	358.06
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	2	275.60	2	297.00
3	Other ischaemic heart diseases (I20, I23-I25) โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	3	251.98	3	232.28
4	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	4	192.89	5	190.63
5	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	5	178.59	4	217.20
6	Malignant neoplasm of colon (C18) เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	6	167.60	6	158.08
7	Cerebral infarction (I63) เนื้องอกร้ายของสมองตาย	7	157.18	8	146.90
8	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	8	147.40	9	140.41
9	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	9	140.95	10	135.67
10	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	10	140.33	15	123.07

จากตารางที่ 29 10 พบว่า กลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 13 3 อันดับแรกในปี พ.ศ.2562 และปี พ.ศ. 2561 เหมือนกันทั้ง 3 อันดับ คือ ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด รองลงมาคือ ปอดบวม และโรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ ตามลำดับ

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน รายจังหวัด

จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 2562 นอกจากการวิเคราะห์และอภิปรายในรายเขตสุขภาพแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้นำข้อมูลมาแสดงจำนวนและอัตราผู้ป่วยใน รายจังหวัดในเขตสุขภาพตามตารางที่ 30

ตารางที่ 30 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกรายเขตสุขภาพและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : รายโรค

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา
1	น่าน	69,548	14,585.12
	แพร่	60,260	13,608.45
	เชียงใหม่	219,834	13,501.96
	ลำปาง	98,369	13,330.49
	ลำพูน	53,563	13,298.85
	พะเยา	57,238	12,142.05
	แม่ฮ่องสอน	27,146	11,300.47
	เชียงราย	123,355	10,513.80
2	พิษณุโลก	111,885	12,942.34
	อุตรดิตถ์	57,448	12,676.44
	เพชรบูรณ์	107,145	10,805.82
	ตาก	56,516	10,424.59
	สุโขทัย	58,349	9,798.42
3	อุทัยธานี	48,414	14,736.55
	กำแพงเพชร	81,290	11,208.50
	พิจิตร	56,625	10,540.35
	ชัยนาท	34,140	10,437.69
	นครสวรรค์	109,860	10,364.86
4	นครนายก	40,114	15,480.02
	อ่างทอง	36,981	13,215.15
	สิงห์บุรี	75,452	11,806.66
	สระบุรี	75,452	11,806.66
	ลพบุรี	78,543	10,392.56
	พระนครศรีอยุธยา	65,944	8,074.36
	นนทบุรี	80,409	6,453.33
	ปทุมธานี	72,635	6,339.90

ตารางที่ 30 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกรายเขตสุขภาพ
และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : รายโรค

เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา
5	สมุทรสาคร	64,584	11,814.38
	กาญจนบุรี	95,929	11,702.88
	ราชบุรี	95,964	11,321.86
	สมุทรสงคราม	21,058	10,982.29
	สุพรรณบุรี	90,527	10,713.10
	ประจวบคีรีขันธ์	57,777	10,710.91
	เพชรบุรี	48,661	10,124.99
	นครปฐม	90,072	9,912.44
6	จันทบุรี	72,780	13,634.17
	ตราด	23,512	10,670.59
	ปราจีนบุรี	48,963	9,946.41
	ชลบุรี	151,743	9,939.24
	ฉะเชิงเทรา	68,707	9,626.15
	สระแก้ว	53,415	9,512.45
	ระยอง	65,449	9,065.85
	สมุทรปราการ	86,516	6,569.45
7	ขอนแก่น	256,516	14,241.84
	กาฬสินธุ์	124,594	12,667.79
	มหาสารคาม	108,540	11,280.28
	ร้อยเอ็ด	137,616	10,544.48
8	เลย	88,002	13,774.44
	หนองคาย	63,990	12,366.13
	สกลนคร	128,281	11,136.98
	อุดรธานี	175,339	11,101.19
	บึงกาฬ	42,464	10,031.04
	หนองบัวลำภู	46,731	9,128.41
	นครพนม	64,371	8,973.74
9	สุรินทร์	188,115	13,475.30
	บุรีรัมย์	199,306	12,507.95
	นครราชสีมา	310,427	11,744.35
	ชัยภูมิ	114,472	10,067.80

ตารางที่ 30 จำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกรายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

หน่วยนับ : รายโรค


เขตสุขภาพ	จังหวัด	จำนวน	อัตรา
10	อุบลราชธานี	269,540	14,423.44
	ยโสธร	73,819	13,728.91
	มุกดาหาร	47,694	13,623.20
	อำนาจเจริญ	41,806	11,067.46
	ศรีสะเกษ	160,164	10,882.31
11	สุราษฎร์ธานี	137,994	13,037.51
	นครศรีธรรมราช	193,529	12,420.36
	กระบี่	56,143	11,864.87
	ชุมพร	59,293	11,699.30
	พังงา	29,201	11,042.87
	ภูเก็ต	41,437	10,304.87
	ระนอง	16,649	9,363.58
12	ยะลา	81,097	15,220.57
	ตรัง	97,304	15,162.88
	นราธิวาส	109,320	13,597.78
	พัทลุง	70,739	13,484.01
	สงขลา	172,412	12,106.43
	สตูล	36,030	11,187.08
	ปัตตานี	73,993	10,277.73
13	กรุงเทพมหานคร	515,192	9,260.82

จากตารางที่ 30 เมื่อเรียงลำดับอัตราผู้ป่วยในจากทุกจังหวัดทั่วประเทศใน ปี พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดในประเทศ คือ จังหวัดนครนายก เขตสุขภาพที่ 4 มีอัตรา 15,480.02 ต่อประชากร 100,000 คน รองลงมาคือจังหวัด ยะลา เขตสุขภาพที่ 12 มีอัตรา 15,220.57 ต่อประชากร 100,000 คน และ จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ 12 มีอัตรา 15,162.88 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อวิเคราะห์รายเขตสุขภาพ พบว่า จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน สูงที่สุด เรียงลำดับรายเขต ดังนี้ เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน อัตรา 14,585.12 เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก อัตรา 12,942.34 เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี อัตรา 14,736.55 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนครนายก อัตรา 15,480.02 เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 11,814.38 เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดจันทบุรี อัตรา 13,634.17 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น อัตรา 14,241.84 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย อัตรา 13,774.44 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ อัตรา 13,475.30 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา 14,423.44 เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตรา 12,420.36 เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดยะลา อัตรา 15,220.57 และเขตสุขภาพที่ 13 จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา 9,260.82


สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มอายุ

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุ ในปี พ.ศ.2562 จากการวินิจฉัยโรคหลัก เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี ตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบอัตราผู้ป่วยในย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยในสูงที่สุดสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 5 ปี แสดงดังภาพที่ 11


ภาพที่ 11 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2562



ภาพที่ 12 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามกลุ่มอายุ เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2558 - 2562



ภาพที่ 13 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ
เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2558 - 2562



จากภาพที่ 12 เมื่อพิจารณากลุ่มอายุ ตามเพศ เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2562 พบว่า ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง ส่วนกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี เพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศชายทั้ง 5 ปี

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยใน เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดจากการวินิจฉัยโรคหลัก ปี พ.ศ.2562 ดังปรากฏตารางที่ 31

ตารางที่ 31 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก)
กลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	114,233	18,947.22	61,564	19,857.50	52,669	17,983.62
2	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	55,767	9,249.78	27,921	9,005.93	27,846	9,507.91
3	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	37,458	6,212.96	23,548	7,595.42	13,910	4,749.52
4	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	33,788	5,604.24	20,633	6,655.18	13,155	4,491.72
5	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	31,350	5,199.86	18,387	5,930.74	12,963	4,426.17
6	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	23,726	3,935.31	15,213	4,906.96	8,513	2,906.73
7	Congenital infectious and parasitic diseases (P35-P37) การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	18,685	3,099.18	10,062	3,245.50	8,623	2,944.29
8	Other congenital malformations of the digestive system (Q38-Q40, Q42-Q45) ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	17,843	2,959.52	10,466	3,375.81	7,377	2,518.85
9	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	7,106	1,178.63	4,260	1,374.07	2,846	971.76
10	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	6,871	1,139.66	3,865	1,246.66	3,006	1,026.39

จากตารางที่ 31 พบว่า กลุ่มโรคที่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด รองลงมาคือ ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และ น้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย และปอดบวม ตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศ พบว่า เพศชาย มีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้น ในกลุ่มโรคทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีอัตราป่วยสูงกว่าเพศชาย

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุเด็กแรกเกิด - 4 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโดยการจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุเด็กแรกเกิด - 4 ปี และจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดจากการวินิจฉัยโรคหลัก ปี พ.ศ.2562 ปรากฏดังตารางที่ 32

ตารางที่ 32 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก)

กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	124,150	3,765.66	72,936	4,302.64	51,214	3,197.38
2	Other conditions originating in the perinatal period (P08, P29, P50-P54, P56-P96) ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	114,233	3,464.87	61,564	3,631.78	52,669	3,288.22
3	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	109,558	3,323.07	63,137	3,724.58	46,421	2,898.14
4	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	86,192	2,614.34	52,442	3,093.66	33,750	2,107.07
5	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight (P05-P07) ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	55,767	1,691.50	27,921	1,647.11	27,846	1,738.47
6	Other respiratory disorders originating in the perinatal period (P22-P28) ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	33,788	1,024.84	20,633	1,217.18	13,155	821.29
7	Influenza (J09-J11) ไข้หวัดใหญ่	31,683	960.99	17,685	1,043.27	13,998	873.92

ตารางที่ 32 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก)
กลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
8	Other acute upper respiratory infections (J00-J01, J05-J06) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน แบบเฉียบพลันอื่น ๆ	26,285	797.27	16,137	951.95	10,148	633.56
9	Other viral diseases (A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34) โรคจากไวรัสอื่น	24,800	752.22	13,958	823.41	10,842	676.88
10	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลัน และต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	21,376	648.37	12,198	719.58	9,178	573.00

จากตารางที่ 32 พบว่า ในกลุ่มอายุแรกเกิด - 4 ปี อัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปอดบวม รองลงมาคือ ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศจาก 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยใน พบว่า ส่วนใหญ่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้น ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ระยะสั้น และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย ซึ่งพบว่าเพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศชาย

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 5 - 14 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโดยการจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยในกลุ่มอายุระหว่าง 5 - 14 ปี และจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดจากการวินิจฉัยโรคหลัก ปี พ.ศ. 2562 ปรากฏดังตารางที่ 33

ตารางที่ 33 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	76,242	975.27	40,404	1,005.33	35,838	943.46
2	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	52,921	676.95	26,718	664.79	26,203	689.81
3	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	45,986	588.24	25,165	626.15	20,821	548.13
4	Influenza (J09-J11) ไข้หวัดใหญ่	28,945	370.26	16,018	398.56	12,927	340.31
5	Acute bronchitis and acute bronchiolitis (J20-J21) หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	20,538	262.72	12,062	300.12	8,476	223.14
6	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	20,255	259.10	11,166	277.83	9,089	239.27
7	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	17,153	219.42	9,556	237.77	7,597	200.00
8	Gastritis and duodenitis (K29) กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอดีนัมอักเสบ	16,026	205.00	8,184	203.63	7,842	206.45
9	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	15,428	197.35	11,698	291.07	3,730	98.19
10	Acute pharyngitis and acute tonsillitis (J02-J03) คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	14,436	184.66	7,983	198.63	6,453	169.88

จากตารางที่ 33 พบว่า อัตราผู้ป่วยในของกลุ่มอายุ 5 -14 ปี สูงที่สุด คือ กลุ่มโรคไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ รองลงมาคือ โลหิตจางอื่น ๆ และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ ตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศจาก 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยใน พบว่า ส่วนใหญ่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง ยกเว้น โลหิตจางอื่น ๆ และกระเพาะอาหารอักเสบ และดูโอดีนัมอักเสบ ที่เพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศชาย

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโดยการจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 14 ปี และจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดจากการวินิจฉัยโรคหลัก ปี พ.ศ. 2562 ปรากฏดังตารางที่ 34

ตารางที่ 34 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	45,156	515.22	0	0.00	45,156	1,054.92
2	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	43,701	498.62	24,255	540.94	19,446	454.29
3	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะคลอด	41,308	471.32	0	0.00	41,308	965.02
4	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	20,920	238.69	7,395	164.93	13,525	315.97
5	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	18,088	206.38	8,251	184.02	9,837	229.81
6	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	17,055	194.60	7,618	169.90	9,437	220.46
7	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified (O85-O99) ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบใน ระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด	14,351	163.74	0	0.00	14,351	335.26

ตารางที่ 34 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก)
กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
8	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	13,749	156.87	11,044	246.31	2,705	63.19
9	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ, ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	12,822	146.30	9,633	214.84	3,189	74.50
10	Intracranial injury (S06) การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	9,465	107.99	7,062	157.50	2,403	56.14

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)
ลำดับที่ 3 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48)
ลำดับที่ 7 ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอด และภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด (O85-O99)
พบเฉพาะในเพศหญิงอัตราป่วยเพศหญิงใช้จำนวนประชากรรวมเฉพาะเพศหญิงเป็นตัวหาร

จากตารางที่ 34 พบว่า กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น พบอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุด คือ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด รองลงมาคือ ใช้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและใช้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ และการดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด ตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศจาก 10 อันดับแรกของอัตราผู้ป่วยใน พบว่า ในกลุ่มโรคที่สามารถพบได้ในทั้ง 2 เพศ ส่วนใหญ่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง โดยเรียงลำดับจากโรคที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด คือ ใช้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและใช้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ รองลงมาคือ กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ และการบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณใน ตามลำดับ

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 - 59 ปี ตามการวินิจฉัยโรคหลัก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโดยการจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงาน และจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยในสูงที่สุดจากการวินิจฉัยโรคหลัก ปี พ.ศ. 2562 ปรากฏดังตารางที่ 35

ตารางที่ 35 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก)

กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O43, O47-O48) การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด	120,051	277.59	0	0.00	120,051	549.56
2	Other complications of pregnancy and delivery (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84) ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด	105,978	245.05	0	0.00	105,978	485.14
3	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	96,598	223.36	37,404	174.76	59,194	270.98
4	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers (A90-A94, A96-A99) ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	76,591	177.10	39,828	186.09	36,763	168.29
5	Fractures of other limb bones (S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12) กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	64,165	148.37	44,665	208.69	19,500	89.27
6	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions (S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14) การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	58,844	136.06	43,136	201.55	15,708	71.91
7	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	58,079	134.29	33,414	156.12	24,665	112.91

ตารางที่ 35 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก)
กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562 (ต่อ)

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
8	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	56,105	129.73	28,399	132.69	27,706	126.83
9	Other anaemias (D51-D64) โลหิตจางอื่น ๆ	53,752	124.29	22,046	103.01	31,706	145.14
10	Diseases of appendix (K35-K38) โรคของไส้ติ่ง	51,169	118.32	23,365	109.17	27,804	127.28

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด (O30-O43, O47-O48)

ลำดับที่ 2 ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด (O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84)

พบเฉพาะในเพศหญิงอัตราป่วยเพศหญิงใช้จำนวนประชากรรวมเฉพาะเพศหญิงเป็นตัวหาร

จากตารางที่ 35 พบว่า ในกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี อัตราผู้ป่วยในสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะคลอด รองลงมาคือ ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์ และการคลอด และอาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อตามลำดับ เมื่อจำแนกสถานการณ์การเจ็บป่วยตามเพศ พบว่า กลุ่มโรคที่เพศชายมีอัตราผู้ป่วยในสูงกว่าเพศหญิง คือ ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ รองลงมาคือ กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ และการบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย ตามลำดับ

สถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามการวินิจฉัยโรคหลัก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในโดยการจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของผู้ป่วยใน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และจัดอันดับ 10 อันดับแรกที่มีอัตราผู้ป่วยในมากที่สุดจากการวินิจฉัยโรคหลัก ปี พ.ศ. 2562 ปรากฏดังตารางที่ 36


ตารางที่ 36 10 อันดับแรกของจำนวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 (การวินิจฉัยโรคหลัก)
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2562

อันดับ	กลุ่มโรค/ รหัสกลุ่มโรค	รวม		ชาย		หญิง	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	Cataract and other disorders of lens (H25-H28) ต้อกระจก และความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	156,488	1,397.81	65,510	1,315.94	90,978	1,463.36
2	Pneumonia (J12-J18) ปอดบวม	148,813	1,329.25	73,069	1,467.78	75,744	1,218.33
3	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases (J40-J44) โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	132,721	1,185.51	99,616	2,001.05	33,105	532.49
4	Renal failure (N17-N19) ไตวาย	120,283	1,074.41	49,904	1,002.45	70,379	1,132.03
5	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	99,591	889.58	35,837	719.88	63,754	1,025.47
6	Heart failure (I50) หัวใจล้มเหลว	84,662	756.23	33,593	674.80	51,069	821.44
7	Cerebral infarction (I63) เนื้องอกสมองตาย	80,501	719.06	42,238	848.46	38,263	615.45
8	Other diseases of the urinary system (N25-N29, N31-N39) โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	75,557	674.90	30,084	604.32	45,473	731.42
9	Diabetes mellitus (E10-E14) เบาหวาน	72,665	649.07	25,726	516.77	46,939	755.00
10	Acute myocardial infarction (I21-I22) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	51,979	464.30	28,446	571.41	23,533	378.52

จากตารางที่ 36 พบว่า อัตราผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ รองลงมาคือ ปอดบวม และโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง ตามลำดับ เมื่อจำแนกตามสถานการณ์การป่วยตามเพศ พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอัตราผู้ป่วยในใกล้เคียงกัน ยกเว้นในกลุ่มโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรัง จะมีอัตราผู้ป่วยในเพศชายสูงถึง 2,001.05 ต่อประชากร 100,000 คน ในขณะที่พบอัตราผู้ป่วยในเพศหญิงเพียง 532.49 ต่อประชากร 100,000 คน หรือพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า

หากแยกพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มโรครายเพศ พบว่า เพศหญิง มีอัตราผู้ป่วยในด้วยโรคต่อกระดูกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ สูงที่สุด รองลงมาคือ ปอดบวม และไตวาย ตามลำดับ ในขณะที่เพศชาย พบอัตราผู้ป่วยในสูงสุดด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ถูกลมโป่งพองและปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น รองลงมาคือ ปอดบวม และต่อกระดูกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ ตามลำดับ

ภาพที่ 14 อัตราผู้ป่วยในต่อประชากร 100,000 คน (การวินิจฉัยโรคหลัก) จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ ปี พ.ศ. 2558 – 2562



จากภาพที่ 13 อัตราผู้ป่วยใน จำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี พ.ศ. 2558 - 2562 จากการวินิจฉัยโรคหลัก พบอัตราผู้ป่วยในที่มีสาเหตุจาก โรคมะเร็ง สูงที่สุด รองลงมาคือ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยในสูงสุดจะพบว่าเกือบทุกกลุ่มโรคที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในสูงขึ้นเป็นทิศทางเดียวกัน ยกเว้นในโรคหลอดเลือดสมอง ถูกลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นเรื้อรังอื่น มีอัตราผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2562 ลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2561 และในโรคความดันโลหิตสูงที่พบอัตราผู้ป่วยในสูงสุดในปี พ.ศ. 2558 และอัตราผู้ป่วยในเมื่อเปรียบเทียบ 5 ปี มีอัตราใกล้เคียงกัน

ภาคผนวก 1

ตารางสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค
(ผู้ป่วยนอก)

ตารางสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (ผู้ป่วยนอก)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
01	Certain infectious and parasitic diseases โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	A00-A99 B00-B99
02	Neoplasms เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	C00-C97 D00-D48
03	Diseases of the blood and blood forming organs and certain disorders involving the immune mechanism โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	D50-D89
04	Endocrine, nutritional and metabolic diseases โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	E00-E90
05	Mental and behavioral disorders ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	F00-F99
06	Diseases of the nervous system โรคระบบประสาท	G00-G99
07	Diseases of the eye and adnexa โรคตา รวมส่วนประกอบของตา	H00-H59
08	Diseases of the ear and mastoid process โรคหูและปุ่มกกหู	H60-H95
09	Diseases of the circulatory system โรคระบบไหลเวียนเลือด	I00-I99
10	Diseases of the respiratory system โรคระบบหายใจ	J00-J99
11	Diseases of the digestive system โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	K00-K93
12	Diseases of the skin and subcutaneous tissue โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	L00-L99
13	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อเยื่อเสริม	M00-M99
14	Diseases of the genitourinary system โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	N00-N99
15	Complication of pregnancy, childbirth and the puerperium ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	O00-O99 ยกเว้น O80-O84

ตารางสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค (ผู้ป่วยนอก)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
16	Certain conditions originating in the perinatal period ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)	P00-P96
17	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	Q00-Q99
18	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น ๆ ได้	R00-R99
19	Poisoning, toxic effect, and their sequelae การเป็นพิษและผลที่ตามมา	X40-X49 X60-X69 X85-X90 Y10-Y19
20	Transport accidents and their sequelae อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา	V01-V99, Y85
21	Other external causes of morbidity and mortality (eg: accidents, injuries, intentional self-harm, assault, animals and plants, complications of medical and surgical care and other unspecified causes) สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	W00-W99 X00-X19 X20-X29 X30-X39 X50-X59 X70-X84 X91-X99 Y00-Y09 Y20-Y36 Y40-Y84 Y86-Y89

ภาคผนวก 2

ตารางสาเหตุการป่วย 298 กลุ่มโรค
(ผู้ป่วยใน)

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
001	Cholera อหิวาตกโรค	A00
002	Typhoid and paratyphoid fevers ไข้รากสาดน้อยและไข้รากสาดเทียม	A01
003	Shigellosis โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา	A03
004	Amoebiasis โรคบิดมีตัว	A06
005	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin อาการท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อ	A09
006	Other intestinal infectious diseases โรคลำไส้อักเสบอื่น ๆ	A02, A04-A05, A07-A08
007	Respiratory tuberculosis วัณโรคทางเดินหายใจ	A15-A16
008	Other tuberculosis วัณโรคอื่น ๆ	A17-A19
009	Plague กาฬโรค	A20
010	Brucellosis โรคติดเชื้อบรูเซลลา	A23
011	Leprosy โรคเรื้อน	A30
012	Tetanus neonatorum บาดทะยักในเด็กแรกเกิด	A33
013	Other tetanus บาดทะยักอื่น ๆ	A34-A35
014	Diphtheria โรคคอตีบ	A36
015	Whooping cough โรคไอกรน	A37
016	Meningococcal infection การติดเชื้อเมนิงโกคอคคัส	A39

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
017	Septicaemia โลหิตเป็นพิษ	A40-A41
018	Other bacterial diseases โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ	A21-A22, A24-A28, A31-A32, A38, A42-A49
019	Congenital syphilis ซิฟิลิสแต่กำเนิด	A50
020	Early syphilis ซิฟิลิสระยะเริ่ม	A51
021	Other syphilis ซิฟิลิสอื่น ๆ	A52-A53
022	Gonococcal infection การติดเชื้อหนองใน	A54
023	Sexually transmitted chlamydial diseases โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อคลามัยเดีย	A55-A56
024	Other infections with a predominantly sexual mode of transmission โรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่	A57-A64
025	Relapsing fevers โรคไขกลับซ้ำ	A68
026	Trachoma โรคตาแดง	A71
027	Typhus fever ไข้รากสาดใหญ่	A75
028	Acute poliomyelitis โรคโปลิโอเฉียบพลัน	A80
029	Rabies โรคพิษสุนัขบ้า	A82
030	Viral encephalitis สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส	A83-A86
031	Yellow fever ไข้เหลือง	A95

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
032	Other arthropod-borne viral fevers and viral haemorrhagic fevers ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ	A90-A94, A96-A99
033	Herpesviral infections เริม	B00
034	Varicella and zoster อีสุกอีใสและงูสวัด	B01-B02
035	Measles หัด	B05
036	Rubella หัดเยอรมัน	B06
037	Acute hepatitis B ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี	B16
038	Other viral hepatitis ตับอักเสบจากไวรัสอื่น ๆ	B15, B17-B19
039	Human immunodeficiency virus [HIV] disease ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	B20-B24
040	Mumps คางทูม	B26
041	Other viral diseases โรคจากไวรัสอื่น	A81, A87-A89, B03-B04, B07-B09, B25, B27-B34
042	Mycoses โรคติดเชื้อรา	B35-B49
043	Malaria มาลาเรีย	B50-B54
044	Leishmaniasis โรคไลชมาเนีย	B55
045	Trypanosomiasis โรคทริพาโนโซม	B56-B57
046	Schistosomiasis โรคติดเชื้อซิสโตโซม	B65

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
047	Other fluke infections โรคพยาธิใบไม้อื่น ๆ	B66
048	Echinococcosis โรคพยาธิเอคคิโนคอกคัส	B67
049	Dracunculiasis โรคพยาธิตราคันคุลัส	B72
050	Onchocerciasis โรคพยาธิออนโคเชอร์คา	B73
051	Filariasis โรคพยาธิฟิลาเรีย	B74
052	Hookworm diseases โรคพยาธิปากขอ	B76
053	Other helminthiasis โรคพยาธิตัวสัตว์อื่น ๆ	B68-B71, B75, B77-B83
054	Sequelae of tuberculosis ผลตามหลังวัณโรค	B90
055	Sequelae of poliomyelitis ผลตามหลังโรคโปลิโอ	B91
056	Sequelae of leprosy ผลตามหลังโรคเรื้อน	B92
057	Other infectious and parasitic diseases โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	A65-A67, A69-A70, A74, A77-A79, B58-B64, B85-B89, B94, B99
058	Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx เนื้องอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย	C00-C14
059	Malignant neoplasm of oesophagus เนื้องอกร้ายที่หลอดอาหาร	C15
060	Malignant neoplasm of stomach เนื้องอกร้ายที่กระเพาะอาหาร	C16
061	Malignant neoplasm of colon เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	C18

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
062	Malignant neoplasm of rectosigmoid junction, rectum, anus and anal canal เนื้องอกร้ายที่รอยต่อลำไส้ใหญ่เร็กตัมและซิกมอยด์ เร็กตัม ทวารหนักและช่องทวารหนัก	C19-C21
063	Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ำดีในตับ	C22
064	Malignant neoplasm of pancreas เนื้องอกร้ายที่ตับอ่อน	C25
065	Other malignant neoplasms of digestive organs เนื้องอกร้ายที่อวัยวะย่อยอาหารอื่น ๆ	C17, C23-C24, C26
066	Malignant neoplasm of larynx เนื้องอกร้ายที่กล่องเสียง	C32
067	Malignant neoplasm of trachea, bronchus and lung เนื้องอกร้ายที่หลอดคอ หลอดลม และปอด	C33-C34
068	Other malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs เนื้องอกร้ายที่อวัยวะหายใจและอวัยวะที่ช่องอก	C30-C31, C37-C39
069	Malignant neoplasms of bone and articular cartilage เนื้องอกร้ายที่กระดูกและกระดูกอ่อนผิวข้อ	C40-C41
070	Malignant melanoma of skin เนื้องอกร้ายที่เมลานินมาของผิวหนัง	C43
071	Other malignant neoplasms of skin เนื้องอกร้ายที่ผิวหนังอื่น ๆ	C44
072	Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue เนื้องอกร้ายที่เมโสธีเรียลและเนื้อเยื่ออ่อน	C45-C49
073	Malignant neoplasm of breast เนื้องอกร้ายที่เต้านม	C50
074	Malignant neoplasm of cervix uteri เนื้องอกร้ายที่ปากมดลูก	C53
075	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่มีได้ระบุส่วนของมดลูก	C54-C55
076	Other malignant neoplasms of female genital organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์หญิง	C51-C52, C56-C58

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
077	Malignant neoplasm of prostate เนื้องอกร้ายที่ต่อมลูกหมาก	C61
078	Other malignant neoplasms of male genital organs เนื้องอกร้ายของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	C60, C62-C63
079	Malignant neoplasm of bladder เนื้องอกร้ายที่กระเพาะปัสสาวะ	C67
080	Other malignant neoplasm of urinary tract เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ที่ท่อปัสสาวะ	C64-C66, C68
081	Malignant neoplasm of the eye and adnexa เนื้องอกร้ายของตาและส่วนประกอบ	C69
082	Malignant neoplasm of brain เนื้องอกร้ายของสมอง	C71
083	Malignant neoplasm of other parts of central nervous system เนื้องอกร้ายที่ส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาทส่วนกลาง	C70, C72
084	Malignant neoplasm of other, ill-defined, secondary, unspecified and multiple sites เนื้องอกอื่น ๆ และที่ไม่ทราบสาเหตุ เนื้องอกทุติยภูมิที่มีได้ระบุรายละเอียด และเกิดขึ้นหลายแห่ง	C73-C80, C97
085	Hodgkin's disease โรคฮอดจกิน	C81
086	Non-Hodgkin's lymphoma เนื้องอกร้ายลิมโฟมาที่มีไขโรคฮอดจกิน	C82-C85
087	Leukaemia ลิวคีเมีย	C91-C95
088	Other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue เนื้องอกร้ายอื่น ๆ ของลิมโฟยด์ ระบบสร้างเม็ดเลือด และเนื้อเยื่อ	C88-C90, C96
089	Carcinoma in situ of cervix uteri มะเร็งจำกัดเฉพาะที่ของปากมดลูก	D06
090	Benign neoplasm of skin เนื้องอกไม่ร้ายของผิวหนัง	D22-D23

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
091	Benign neoplasm of breast เนื้องอกไม่ร้ายของเต้านม	D24
092	Leiomyoma of uterus ไลโอไมโอมาที่มดลูก	D25
093	Benign neoplasm of ovary เนื้องอกไม่ร้ายที่รังไข่	D27
094	Benign neoplasm of urinary organs เนื้องอกไม่ร้ายที่ระบบปัสสาวะ	D30
095	Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system เนื้องอกไม่ร้ายของสมองและส่วนอื่นของระบบประสาทส่วนกลาง	D33
096	Other in situ and benign neoplasms and neoplasms of uncertain and unknown behaviour เนื้องอกไม่ร้ายจำกัดเฉพาะที่อื่น ๆ และเนื้องอกบางชนิดที่ไม่ทราบพฤติกรรม	D00-D05, D07-D21, D26, D28-D29, D31-D32, D34-D48
097	Iron deficiency anaemia โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	D50
098	Other anaemias โลหิตจางอื่น ๆ	D51-D64
099	Haemorrhagic conditions and other diseases of blood and blood-forming organs ภาวะเลือดออกอื่น ๆ โรคเลือดและอวัยวะที่สร้างเลือด	D65-D77
100	Certain disorders involving the immune mechanism ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับกลไกของภูมิคุ้มกัน	D80-D89
101	Iodine-deficiency-related thyroid disorders การขาดไอโอดีนที่มีความสัมพันธ์กับต่อมไทรอยด์	E00-E02
102	Thyrotoxicosis โรคพิษไทรอยด์	E05
103	Other disorders of thyroid ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อื่น ๆ	E03-E04, E06-E07
104	Diabetes mellitus เบาหวาน	E10-E14

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
105	Malnutrition ทุพโภชนาการ	E40-E46
106	Vitamin A deficiency การขาดวิตามินเอ	E50
107	Other vitamin deficiencies การขาดวิตามินอื่น ๆ	E51-E56
108	Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies ผลที่ตามมาของภาวะทุพโภชนาการและภาวะพร่องโภชนาการอื่น ๆ	E64
109	Obesity โรคอ้วน	E66
110	Volume depletion การขาดปริมาณของเหลวในร่างกาย	E86
111	Other endocrine, nutritional and metabolic disorders ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	E15-E35, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E90
112	Dementia สมองเสื่อม	F00-F03
113	Mental and behavioral disorders due to use of alcohol ความผิดปกติของพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการเสพแอลกอฮอล์	F10
114	Mental and behavioral disorders due to other psychoactive substance use ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทที่เกิดจากการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น ๆ	F11-F19
115	Schizophrenia, schizotypal, and delusional disorders จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	F20-F29
116	Mood [affective] disorders ความผิดปกติทางอารมณ์	F30-F39
117	Neurotic, stress-related, and somatoform disorders โรคประสาท อากาทางกายที่เกิดจากจิตใจและความเครียด	F40-F48
118	Mental retardation ภาวะปัญญาอ่อน	F70-F79

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
119	Other mental and behavioral disorders ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	F04-F09, F50-F69, F80-F99
120	Inflammatory diseases of the central nervous system การอักเสบของระบบประสาทส่วนกลาง	G00-G09
121	Parkinson's disease โรคพาร์กินสัน	G20
122	Alzheimer's disease โรคอัลไซเมอร์	G30
123	Multiple sclerosis โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	G35
124	Epilepsy ลมบ้าหมู	G40-G41
125	Migraine and other headache syndromes โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	G43-G44
126	Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes โรคเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชั่วคราวและกลุ่มอาการต่อเนื่อง	G45
127	Nerve, nerve root and plexus disorders ความผิดปกติของเส้นประสาท รากประสาท และปมประสาท	G50-G59
128	Cerebral palsy and other paralytic syndromes สมองพิการและกลุ่มอาการอัมพาตอื่น ๆ	G80-G83
129	Other diseases of the nervous system โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	G10-G13, G21-G26, G31-G32, G36-G37, G46-G47, G60-G73, G90-G99
130	Inflammation of eyelid การอักเสบของหนังตา	H00-H01
131	Conjunctivitis and other disorders of conjunctiva เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อตาอื่น ๆ	H10-H13
132	Keratitis and other disorders of sclera and cornea กระจกตาอักเสบและความผิดปกติของตาขาวและกระจกตาอื่น ๆ	H15-H19
133	Cataract and other disorders of lens ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ	H25-H28

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
134	Retinal detachments and breaks จอประสาทตาหลุดออกและรอยฉีกของจอประสาทตา	H33
135	Glaucoma ต้อหิน	H40-H42
136	Strabismus ตาเหล่	H49-H50
137	Disorders of refraction and accommodation ความผิดปกติของสายตาและการเพ่งมอง	H52
138	Blindness and low vision ตาบอดและสายตาเลือนราง	H54
139	Other diseases of the eye and adnexa โรคของตาและส่วนประกอบของตาอื่น ๆ	H02-H06, H20-H22, H30-H32, H34-H36, H43-H48, H51, H53, H55-H59
140	Otitis media and other disorders of middle ear and mastoid หูชั้นกลางอักเสบและความผิดปกติของหูชั้นกลางและปุ่มกกหูอื่น ๆ	H65-H75
141	Hearing loss การสูญเสียการได้ยิน	H90-H91
142	Other diseases of the ear and mastoid process โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ	H60-H62, H80-H83, H92-H95
143	Acute rheumatic fever ไข้รูมาติกเฉียบพลัน	I00-I02
144	Chronic rheumatic heart disease โรคหัวใจรูมาติกเรื้อรัง	I05-I09
145	Essential (primary) hypertension ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ	I10
146	Other hypertensive diseases โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	I11-I15
147	Acute myocardial infarction กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	I21-I22
148	Other ischaemic heart diseases โรคหัวใจขาดเลือดอื่น ๆ	I20, I23-I25

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
149	Pulmonary embolism ก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดใหญ่ของปอด	I26
150	Conduction disorders and cardiac arrhythmias ความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าหัวใจและหัวใจเต้นผิดจังหวะ	I44-I49
151	Heart failure หัวใจล้มเหลว	I50
152	Other heart diseases โรคหัวใจอื่น ๆ	I27-I43, I51-I52
153	Intracranial haemorrhage เลือดออกในสมอง	I60-I62
154	Cerebral infarction เนื้อสมองตาย	I63
155	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction เป็นลมหมดสติที่ไม่จัดกลุ่มว่าเป็นจากเลือดออกในสมองหรือเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด	I64
156	Other cerebrovascular diseases โรคหลอดเลือดในสมองอื่น ๆ	I65-I69
157	Atherosclerosis ภาวะหลอดเลือดแข็ง	I70
158	Other peripheral vascular diseases โรคหลอดเลือดส่วนปลายอื่น ๆ	I73
159	Arterial embolism and thrombosis ลิ่มเลือดและก้อนเลือดอุดตันที่หลอดเลือดแดง	I74
160	Other diseases of arteries, arterioles and capillaries โรคของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงย่อย และแคปิลารีอื่น ๆ	I71-I72, I77-I79
161	Phlebitis, thrombophlebitis, venous embolism and thrombosis หลอดเลือดดำอักเสบ หลอดเลือดดำอักเสบมีลิ่มเลือดก้อนเลือด และลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ	I80-I82
162	Varicose veins of lower extremities หลอดเลือดดำขอดของระยางส่วนล่าง	I83
163	Haemorrhoids ริดสีดวงทวาร	I84, K64

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
164	Other diseases of the circulatory system โรคอื่น ๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต	I85-I99
165	Acute pharyngitis and acute tonsillitis คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	J02-J03
166	Acute laryngitis and tracheitis กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบเฉียบพลัน	J04
167	Other acute upper respiratory infections การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	J00-J01, J05-J06
168	Influenza ไข้หวัดใหญ่	J10-J11
169	Pneumonia ปอดบวม	J12-J18
170	Acute bronchitis and acute bronchiolitis หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน	J20-J21
171	Chronic sinusitis ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	J32
172	Other diseases of nose and nasal sinuses โรคอื่นของจมูกและไซนัส	J30-J31, J33-J34
173	Chronic disease of tonsils and adenoids โรคเรื้อรังของต่อมทอนซิลและต่อมน้ำเหลืองในคอ	J35
174	Other diseases of upper respiratory tract โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจส่วนบน	J36-J39
175	Bronchitis, emphysema and other chronic obstructive pulmonary diseases โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง และปอดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น	J40-J44
176	Asthma โรคหืด	J45-J46
177	Bronchiectasis โรคหลอดลมเล็กโป่งพอง	J47
178	Pneumoconiosis โรคฝุ่นสะสมในปอด	J60-J65
179	Other diseases of the respiratory system โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินหายใจ	J22, J66-J99

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
180	Dental caries ฟันผุ	K02
181	Other disorders of teeth and supporting structures ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	K00-K01, K03-K08
182	Other diseases of the oral cavity, salivary glands and jaws โรคอื่น ๆ ของช่องปาก ต่อมน้ำลายและขากรรไกร	K09-K14
183	Gastric and duodenal ulcer แผลเปื่อยของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น	K25-K27
184	Gastritis and duodenitis กระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ	K29
185	Other diseases of oesophagus, stomach and duodenum โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้น	K20-K23, K28, K30-K31
186	Diseases of appendix โรคของไส้ติ่ง	K35-K38
187	Inguinal hernia ไส้เลื่อนที่บริเวณขาหนีบ	K40
188	Other hernia ไส้เลื่อนอื่น ๆ	K41-K46
189	Crohn's disease and ulcerative colitis โรคโครห์นและลำไส้ใหญ่อักเสบแผลเปื่อย	K50-K51
190	Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia ลำไส้ไม่ทำงานและลำไส้เกิดอุดตันแบบไม่มีไส้เลื่อน	K56
191	Diverticular disease of intestine โรคติ่งเนื้อของลำไส้	K57
192	Other diseases of intestines and peritoneum โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	K52-K55, K58-K63, K65-K67
193	Alcoholic liver disease โรคตับเกี่ยวกับแอลกอฮอล์	K70
194	Other diseases of liver โรคอื่น ๆ ของตับ	K71-K77
195	Cholelithiasis and cholecystitis โรคนิ่วในระบบน้ำดีและถุงน้ำดีอักเสบ	K80-K81

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
196	Acute pancreatitis and other diseases of the pancreas ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและโรคอื่น ๆ ของตับอ่อน	K85-K86
197	Other diseases of the digestive system โรคอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	K82-K83, K87-K93
198	Infections of the skin and subcutaneous tissue โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	L00-L08
199	Other diseases of the skin and subcutaneous tissue โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	L10-L99
200	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies ข้ออักเสบรูมาตอยและข้ออักเสบหลายข้อ	M05-M14
201	Arthrosis โรคข้อเสื่อม	M15-M19
202	Acquired deformities of limbs ความพิการของแขนขา	M20-M21
203	Other disorders of joints ความผิดปกติอื่น ๆ ของข้อ	M00-M03, M22-M25
204	Systemic connective tissue disorders ความผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อประสาน	M30-M36
205	Cervical and other intervertebral disc disorders กระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังอื่น ๆ ผิดปกติ	M50-M51
206	Other dorsopathies พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	M40-M49, M53-M54
207	Soft tissue disorders เนื้อเยื่อผิดปกติ	M60-M79
208	Disorders of bone density and structure ความผิดปกติของความหนาแน่นของเนื้อกระดูกและโครงสร้าง	M80-M85
209	Osteomyelitis กระดูกอักเสบ	M86
210	Other diseases of the musculoskeletal system and connective tissue โรคอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาน	M87-M99
211	Acute and rapidly progressive nephritic syndromes กลุ่มอาการไตอักเสบเฉียบพลันและชนิดกำเริบเร็ว	N00-N01

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
212	Other glomerular diseases โรคของหน่วยไตอื่น ๆ	N02-N08
213	Renal tubulo-interstitial diseases โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต	N10-N16
214	Renal failure ไตวาย	N17-N19
215	Urolithiasis นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ	N20-N23
216	Cystitis กระเพาะปัสสาวะอักเสบ	N30
217	Other diseases of the urinary system โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ	N25-N29, N31-N39
218	Hyperplasia of prostate ต่อมลูกหมากโตจากการเพิ่มจำนวนเซลล์	N40
219	Other disorders of prostate ความผิดปกติอื่น ๆ ของต่อมลูกหมาก	N41-N42
220	Hydrocele and spermatocele ถุงน้ำและถุงที่มีอสุจิที่อัณฑะ	N43
221	Redundant prepuce, phimosis and paraphimosis หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกินไป ปลายตีบรูเปิดไม่ได้หรือเปิดลำบาก	N47
222	Other diseases of male genital organs โรคอื่น ๆ ของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย	N44-N46, N48-N51
223	Disorders of the breast ความผิดปกติของเต้านม	N60-N64
224	Salpingitis and oophoritis ปีกมดลูกและรังไข่อักเสบ	N70
225	Inflammatory disease of cervix uteri ปากมดลูกอักเสบ	N72
226	Other inflammatory diseases of female pelvic organs การอักเสบอื่น ๆ ของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี	N71, N73-N77
227	Endometriosis เยื่อบุมดลูกอยู่ผิดที่	N80

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
228	Female genital prolapse การหย่อนตัวออกมาของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี	N81
229	Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube and broad ligament ความผิดปกติอื่นที่ไม่ใช่การอักเสบของรังไข่ ท่อรังไข่ และเอ็นยึดมดลูก	N83
230	Disorders of menstruation ความผิดปกติของระดู	N91-N92
231	Menopausal and other perimenopausal disorders การหมดประจำเดือนและความผิดปกติอื่นในระยะหมดประจำเดือน	N95
232	Female infertility ภาวะมีบุตรยากในสตรี	N97
233	Other disorders of genitourinary tract ความผิดปกติอื่น ๆ ของท่อทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์	N82, N84-N90, N93-N94, N96, N98-N99
234	Spontaneous abortion แท้งเอง	O03
235	Medical abortion การทำแท้งโดยเหตุผลทางการแพทย์	O04
236	Other pregnancies with abortive outcome การตั้งครรภ์อื่น ๆ ที่สิ้นสุดโดยการแท้ง	O00-O02, O05-O08
237	Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and the puerperium การบวม การมีโปรตีนในปัสสาวะ และความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอด	O10-O16
238	Placenta praevia, premature separation of placenta and antepartum haemorrhage รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด และตกเลือดก่อนคลอด	O44-O46
239	Other maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะคลอด	O30-O43, O47-O48

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
240	Obstructed labour การคลอดติดขัด	O64-O66
241	Postpartum haemorrhage ตกเลือดหลังคลอด	O72
242	Other complications of pregnancy and delivery ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของการตั้งครรภ์และการคลอด	O20-O29, O60-O63, O67-O71, O73-O75, O81-O84
243	Single spontaneous delivery การคลอดของครรภ์เดียว	O80
244	Complications predominantly related to the puerperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified ภาวะแทรกซ้อนที่ส่วนใหญ่พบในระยะหลังคลอดและภาวะทางสูติกรรมอื่น ๆ ที่มีได้ระบุรายละเอียด	O85-O99
245	Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery ทารกในครรภ์และแรกเกิดที่ได้รับผลจากปัจจัยทางมารดา และโรคแทรกในระยะ ตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์ และคลอด	P00-P04
246	Slow fetal growth, fetal malnutrition and disorders related to short gestation and low birth weight ทารกในครรภ์โตช้า ทารกในครรภ์ขาดสารอาหาร และความผิดปกติเกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์ระยะสั้นและน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย	P05-P07
247	Birth trauma บาดเจ็บจากการคลอด	P10-P15
248	Intrauterine hypoxia and birth asphyxia ขาดออกซิเจนขณะอยู่ในโพรงมดลูก และภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด	P20-P21
249	Other respiratory disorders originating in the perinatal period ภาวะหายใจผิดปกติอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	P22-P28
250	Congenital infectious and parasitic diseases การติดเชื้อแต่กำเนิดและโรคปรสิต	P35-P37
251	Other infections specific to the perinatal period การติดเชื้อเฉพาะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	P38-P39

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
252	Haemolytic disease of fetus and newborn โรคเม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์และแรกเกิด	P55
253	Other conditions originating in the perinatal period ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกำเนิด	P08, P29, P50-P54, P56-P96
254	Spina bifida กระดูกสันหลังแยก	Q05
255	Other congenital malformations of the nervous system ความผิดปกติอื่น ๆ แต่กำเนิดของระบบประสาท	Q00-Q04, Q06-Q07
256	Congenital malformations of the circulatory system ความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบไหลเวียนโลหิต	Q20-Q28
257	Cleft lip and cleft palate ปากแหว่งและเพดานโหว่	Q35-Q37
258	Absence, atresia and stenosis of small intestine ลำไส้เล็กไม่มี ตัน และตีบ	Q41
259	Other congenital malformations of the digestive system ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบย่อยอาหาร	Q38-Q40, Q42-Q45
260	Undescended testicle อัณฑะไม่ลงถุง	Q53
261	Other malformations of the genitourinary system ความผิดปกติอื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	Q50-Q52, Q54-Q64
262	Congenital deformities of hip ความพิการแต่กำเนิดของสะโพก	Q65
263	Congenital deformities of feet ความพิการแต่กำเนิดของเท้า	Q66
264	Other congenital malformations and deformations of the musculoskeletal system ความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	Q67-Q79
265	Other congenital malformations ความผิดปกติแต่กำเนิดอื่น ๆ	Q10-Q18, Q30-Q34, Q80-Q89
266	Chromosomal abnormalities, not elsewhere classified ความผิดปกติของโครโมโซมที่ไม่ได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	Q90-Q99

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
267	Abdominal and pelvic pain ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	R10
268	Fever of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	R50
269	Senility ชราภาพ	R54
270	Other symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีได้มีรหัสระบุไว้	R00-R09, R11-R49, R51-R53, R55-R99
271	Fracture of skull and facial bones กระดูกแตกหักบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้า	S02
272	Fracture of neck, thorax or pelvis กระดูกคอ กระดูกซี่โครง หรือกระดูกเชิงกรานหัก	S12, S22, S32, T08
273	Fracture of femur กระดูกต้นขา แตก หัก ร้าว	S72
274	Fractures of other limb bones กระดูกแตกหักของแขนขาอื่น ๆ	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
275	Fractures involving multiple body regions กระดูกแตกหักหลายบริเวณในร่างกาย	T02
276	Dislocations, sprains and strains of specified and multiple body regions กระดูกเคลื่อน เคล็ด ชัด บริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
277	Injury of the eye and orbit การบาดเจ็บของตาและเบ้าตา	S05
278	Intracranial injury การบาดเจ็บภายในกะโหลกศีรษะ	S06
279	Injury of other internal organs การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอื่น ๆ	S26-S27, S36-S37

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
280	Crushing injuries and traumatic amputations of specified and multiple body regions การบาดเจ็บจากการบดอัดและการบาดเจ็บที่เกิดจากตัดขาดบริเวณร่างกายหลายแห่งที่ระบุเฉพาะ	S07-S08, S17-S18, S28, S38, S47-S48, S57-S58, S67-S68, S77-S78, S87-S88, S97-S98, T04-T05
281	Other injuries of specified, unspecified and multiple body regions การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	S00-S01, S04, S09-S11, S14-S16, S19-S21, S24-S25, S29-S31, S34-S35, S39-S41, S44-S46, S49-S51, S54-S56, S59-S61, S64-S66, S69-S71, S74-S76, S79-S81, S84-S86, S89-S91, S94-S96, S99, T00-T01, T06-T07, T09, T11, T13-T14
282	Effects of foreign body entering through natural orifice ผลของวัตถุแปลกปลอมผ่านเข้าทางทวารธรรมชาติของร่างกาย	T15-T19
283	Burns and corrosions แผลถูกความร้อนและถูกสารกัดกร่อน	T20-T32
284	Poisoning by drugs and biological substances การเป็นพิษจากยา เครื่องยา และชีววัตถุ	T36-T50
285	Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source การเป็นพิษจากสารที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ใช้เป็นยา	T51-T65
286	Maltreatment syndrome กลุ่มอาการจากการทารุณ	T74
287	Other and unspecified effects of external causes อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	T33-T35, T66-T73, T75-T78
288	Certain early complications of trauma and complications of surgical and medical care, not elsewhere classified ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิด และภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น	T79-T88

ตารางสาเหตุการป่วย (Tabulation list for morbidity) 298 กลุ่มโรค (ต่อ)

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
289	Sequelae of injuries, poisoning and of other consequences of external causes ผลระยะล่าช้าของการบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกอื่น ๆ	T90-T98
290	Persons encountering health services for examination and investigation บุคคลขอรับบริการเพื่อการตรวจและชันสูตร	Z00-Z13
291	Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status การติดเชื้อไวรัสโดยไม่มีอาการ	Z21
292	Other persons with potential health hazards related to communicable disease บุคคลที่มีอาการที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ	Z20, Z22-Z29
293	Contraceptive management การรับบริการคุมกำเนิด	Z30
294	Antenatal screening and other supervision of pregnancy การตรวจคัดกรองก่อนการคลอด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์อื่น ๆ	Z34-Z36
295	Liveborn infants according to place of birth การเกิดของทารกตามสถานที่เกิด	Z38
296	Postpartum care and examination การดูแลและการตรวจหลังคลอด	Z39
297	Persons encountering health services for specific procedures and health care บุคคลขอรับบริการสุขภาพ เพื่อหัตถการหรือการบริการสุขภาพที่ระบุเฉพาะ	Z40-Z54
298	Persons encountering health services for other reasons บุคคลขอรับบริการสุขภาพด้วยเหตุผลอื่น	Z51-Z53, Z57, Z55-Z59

ภาคผนวก 3

ตารางสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ

35 กลุ่มสาเหตุ

(ผู้ป่วยใน)

ตารางสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ 35 กลุ่มสาเหตุ

สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
Pedestrian injured in transport accident คนเดินเท้าที่บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	V01-V09
Pedal cyclist injured in transport accident ผู้ขี่จักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	V10-V19
Motorcycle rider injured in transport accident คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนส่ง	V20-V29
Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in transport accident ผู้ใช้สามล้อเครื่องบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	V30-V39
Car occupant injured in transport accident ผู้โดยสารรถยนต์บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	V40-V49
Occupant of pick-up truck or van injured in transport accident ผู้โดยสารบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	V50-V59
Occupant of heavy transport vehicle injured in transport accident ผู้โดยสารบรรทุกขนาดใหญ่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	V60-V69
Bus occupant injured in transport accident ผู้โดยสารโดยสารบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการขนส่ง	V70-V79
Other land transport accidents อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบกอื่น	V80-V89
Water transport accidents อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ	V90-V94
Air and space transport accidents อุบัติเหตุจากการขนส่งทางอากาศและอวกาศ	V95-V97
Other and unspecified transport accidents อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและไม่ระบุรายละเอียด	V98-V99
Falls การพลัดตกหกล้ม	W00-W19
Exposure to inanimate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกวัตถุกลไกที่ไม่มีชีวิต	W20-W49
Exposure to animate mechanical forces บาดเจ็บจากการถูกกระทำจากสิ่งมีชีวิต	W50-W64
Accidental drowning and submersion อุบัติเหตุจากการตกน้ำรวมถึงการจมน้ำ	W65-W74

ตารางสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ 35 กลุ่มสาเหตุ (ต่อ)

สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
Other accidental threats to breathing อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามต่อการหายใจ	W75-W84
Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิอากาศ และความกดอากาศที่ผิดปกติ	W85-W99
Exposure to smoke, fire and flames การถูกควัน ไฟ และเปลวไฟ	X00-X09
Contact with heat and hot substances การถูกความร้อนและสารร้อน	X10-X19
Contact with venomous animals and plants สัมผัสกับสัตว์หรือพืชมีพิษ	X20-X29
Exposure to forces of nature ภัยอันตรายจากพลังตามธรรมชาติ	X30-X39
Accidental poisoning by and exposure to noxious substances การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษ	X40-X49
Overexertion, travel and privation การออกกำลังกายมากเกินไป การเดินทาง และการขาดแคลน	X50-X57
Accidental exposure to other and unspecified factors ภัยอันตรายจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยที่มีได้ระบุรายละเอียดโดยบังเอิญ	X58-X59
Intentional self-harm การทำร้ายตัวเอง	X60-X84
Assault การถูกทำร้าย	X85-Y09
Event of undetermined intent เหตุการณ์ที่ไม่อาจระบุเจตนา	Y10-Y34
Legal intervention and operations of war ปฏิบัติการหรือการแทรกแซงทางกฎหมายและการทำสงคราม	Y35-Y36
Drugs, medicaments and biological substances causing adverse effects in therapeutic use ยา เครื่องยา และชีววัตถุที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนเมื่อใช้ในการรักษา	Y40-Y59
Misadventures to patients during surgical and medical care ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยขณะให้การรักษาทันทีและอายุรกรรม	Y60-Y69
Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use ความผิดพลาดในการวินิจฉัยและการรักษาเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์	Y70-Y82

ตารางสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ 35 กลุ่มสาเหตุ (ต่อ)

สาเหตุการป่วย (ชื่อโรค)	รหัสโรค
Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure วิธีการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติของผู้ป่วย	Y83-Y84
Sequelae of external causes of morbidity and mortality ผลที่ตามมาจากสาเหตุภายนอกการป่วยและตาย	Y85-Y89
Supplementary factors related to causes of morbidity and mortality classified elsewhere ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุการป่วยและตายที่มีได้ระบุไว้ที่อื่น	Y90-Y98



สรุปรายงานการป่วย **พ.ศ. 2562**

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

